

اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه گوجه فرنگی (*Lycopersicon esculentum* Mill.)

رمضانعلی خاوری نژاد^{۱*}، فرزانه نجفی^{۱*} و اخلاص رحیمی^۱

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران و ^۲گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۲)

چکیده:

سلنیوم در برخی موجودات به عنوان عنصر ضروری محسوب می‌شود اما غلظت‌های بالای آن منجر به ایجاد سمیت در گیاهان می‌گردد. در این پژوهش تأثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان رشد، محتوای رنگیزه‌های فتوستتری، فل و آنتوسیانین گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بذرها برای جوانه زدن در پتری دیش‌های استریل قرار گرفتند، بعد از جوانه‌زنی به گلدان‌های حاوی ماسه مرتبط منتقل شده و بعد از ایجاد برگ دوم تحت تیمار سلنات سدیم (۰، ۳۰ و ۶۰ میکرومولا) و متیل جاسمونات (۰ و ۱۰۰ میکرومولا) قرار گرفتند. بعد از بیست روز گیاهان برداشت شدند و سنجش‌های مورد نظر انجام شد. در تیمار بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم افزایش رشد مشاهده شد که در مقایسه با مقادیر بدست آمده برای هر یک از تیمارهای فوق به تهایی معنی‌دار است. غلظت کلروفیل‌های *a* و *b* در همه تیمارها کاهش نشان می‌دهد و محتوای کاروتینوئیدها فقط در تیمار ۶۰ میکرومولا سلنات سدیم افزایش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها دارد. با افزودن متیل جاسمونات به محیط کشت محتوی سلنات سدیم، محتوای فل و آنتوسیانین گیاهان تحت تیمار در مقایسه با تیمار سلنات به تهایی افزایش معنی‌داری نشان می‌دهند. متیل جاسمونات تأثیر معنی‌داری بر تجمع پرولین ندارد، در حالی که سلنات سدیم به تهایی و در تیمار بر هم کنش با متیل جاسمونات موجب افزایش پرولین برگ و ریشه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که تیمار تؤمن سلنات سدیم و متیل جاسمونات در گیاه گوجه فرنگی جهت بهبود اثرات مخرب سلنات سدیم مفید می‌باشد.

کلمات کلیدی: آنتوسیانین، رنگیزه‌های فتوستتری، سلنات سدیم، فل، متیل جاسمونات.

یافت نشده است (Stintzi *et al.*, 2001). گیاهان سلنیوم را به صورت سلنات سدیم و سلنیت سدیم جذب می‌کنند. سلنیوم شباهت متابولیکی با سولفور دارد و می‌تواند به وسیله مسیر متابولیکی سولفور متابولیزه شود (Launchli 1993). به علت شباهت متابولیکی سلنیوم و سولفور گیاهان سلنات را از طریق ناقلین سولفور از خاک جذب می‌کنند و این امر منجر به

مقدمه:

سلنیوم یک ماده ضروری برای موجودات زنده مثل پستانداران، تعدادی از باکتری‌ها و جلبک‌های سبز است (Birringer *et al.*, 2002). این موجودات زنده حاوی سلنیو پروتئین‌ها هستند که در جایگاه فعال خود نیاز به سلنوسیستئین دارند اما تاکنون شواهدی مبنی بر نیاز گیاهان عالی به سلنیوم

ایجاد شده در گیاه نیز موثر است و موجب تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) می شود، از جمله تولید آب اکسیژنه و رادیکال های آزاد هیدروکسیل را می توان نام برد (Faurie *et al.*, 2009; Parra- Lobao *et al.*, 2009). گونه های فعال اکسیژن با بیشتر ترکیبات سلولی واکنش داده و موجب خسارت هایی در غشاء و سایر قسمت های سلول می شوند. گیاهانی که دارای سیستم های دفاعی آنتی اکسیدانی از جمله ترکیبات آنزیمی و غیر آنزیمی هستند موجب توازن سطح ROS ها در سلول ها می شوند (Jubany- Mari *et al.*, 2010). با تیمار گیاهان کرچک (*Ricinus communis*) توسط متیل جاسمونات تجمع گونه های فعال اکسیژن در گیاهان افزایش یافته که به دنبال آن افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مشاهده می شود (Soares *et al.*, 2010).

گیاه گوجه فرنگی دارای انواع ویتامین ها و املاح معدنی است و برای تقویت سیستم گوارشی و مبتلایان به ورم مفاصل و رماتیسم از آن استفاده می شود (Xie *et al.*, 2007). به علت اهمیت اقتصادی این گیاه و آلودگی محیط زیست که به عنوان یکی از مباحث مهم زندگی بشر مطرح است، پژوهش فوق انجام شد. سمعیت ناشی از غلظت های بالای سلنیوم از یک سو و ضرورت وجود آن در انسان از سوی دیگر نشان دهنده اهمیت شناخت علائم مسمومیت این عنصر در گیاه است.

مواد و روش ها:

بذر های گیاه گوجه فرنگی از موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج تهیه شد. تعداد ۵۰۰ عدد بذر یکنواخت و همگن انتخاب شدند و برای جلوگیری از آلودگی قارچی توسط هیپوکلریت سدیم ۰.۱٪ به مدت ده دقیقه ضد عفونی شدند. سپس بذرها چندین بار با آب مقطر شستشو داده شدند. پس از این مرحله ۲۰ عدد بذر درون ظروف پتی دیش حاوی یک لایه کاغذ صافی قرار داده شدند. سپس ظروف پتی با فویل آلومینیومی پوشانده شدند. بعد از چهار روز بذرها جوانه زدند و اساس جوانه زنی آنها خروج ریشه چه و ساقه چه از بذرها بود. سپس پتی ها به گلخانه منتقل شدند. بعد از این مرحله گیاه کها به گلدان های حاوی ماسه مربوط شده با آب مقطر منتقل

تشکیل آنالوگ متیونین و سیستئین یعنی سلنومتیونین و سلنیو سیستئین می شود. وقتی گیاه در معرض مقدار زیادی از سلنیوم قرار می گیرد سنتز پروتئین با مشکل مواجه می شود و باعث ایجاد نشانه هایی مثل کلروز، کاهش رشد، پلاسیده شدن، خشک شدن برگ ها و مرگ زود رس می گردد (Terry *et al.*, 2000). محتوای سلنیوم در گیاه از راه های مختلفی از جمله اضافه کردن سلنیوم به خاک، غوطه ور کردن دانه در محلول سلنیوم قبل از کاشت، محیط کشت هیدروپونیک حاوی سلنیوم و محلول پاشی گیاه با سلنیوم می تواند افزایش یابد (Wu and Huang, 1991) یابد و در حضور کلسیم افزایش می یابد در حالی که سولفات مانع جذب سلنیوم می شود (Hyun *et al.*, 2006). ریشه های بسیاری از گیاهان زراعی سولفات و سلنات سدیم را به وسیله ناقلین غشای سلولی منتقل می کنند و آنیون ها برای اتصال به این جایگاه با هم رقابت می کنند در نتیجه این تضاد جذب سلنیوم توسط سولفات مهار می شود (Grieve *et al.*, 2001).

از زمان اولین جداسازی متیل جاسمونات به عنوان ترکیبی از روغن گیاه *Jasminum grandiflorum* ترکیبات متعددی از جاسمونات ها در گیاهان شناخته شده است. جاسمونات ها در جلبک ها، خزه ها، قارچ ها، بازدانگان و نهاندانگان وجود دارند. اصطلاح جاسمونات به جاسمونیک اسید و استر متیله شده آن گفته می شود و فعالیت آن به داشتن زنجیره اسیدهای چرب مربوط می شود. بسیاری از ترکیبات مثل پیش ساز جاسمونات ها و مشتقات آن که دارای ساختار حلقوی هستند و از اسیدهای چرب اشباع نشده سنتز شده باشند، فعالیت بیولوژیکی شیوه جاسمونات را نشان می دهند (Stintzi *et al.*, 2001).

جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات (MJ) به عنوان یک تنظیم کننده درونی گیاه است که نقش مهمی در رشد و نمو و پاسخ گیاه به تنش های محیطی دارد و به عنوان یک ملکول علامت رسان در برخی از سیستم های انتقال علامت درگیر می باشد. متیل جاسمونات موجب فعال شدن پاسخ های دفاعی گیاهی از طریق القای بیان ژن های دفاعی می شود (Creelman and Mullet, 1997) متیل جاسمونات نه تنها در پاسخ به نمو گیاه عمل می کند بلکه در بیماری ها و زخم های

فنول و آنتوسیانین نیز استفاده شد. برای تعیین میزان آنتوسیانین شدت جذب محلول حاصل توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 530 نانومتر تعیین و جذب ناویژه در 600 نانومتر از آن کسر شد. برای تعیین مقدار فنول، جذب عصاره‌ها در طول موج 280 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد (Dai et al., 2006).

سنجهش پرولین: برگ تازه‌ی گیاهان پس از توزین با اسید سولفورسالیسیلیک سه درصد به صورت هموژن در آمد. سپس هموژن حاصل به فالکون 15 میلی لیتری منتقل شده و با اسید سولفورسالیسیلیک سه درصد حجم آن‌ها به 10 میلی لیتر رسانیده شد و با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره‌ی دو صاف گردید. دو میلی لیتر از عصاره حاصل، دو میلی لیتر معرف نین هیدرین و دو میلی لیتر اسید استیک خالص را در یک لوله‌ی آزمایش مخلوط کرده و به مدت یک ساعت جوشانیده شدند، جهت توقف واکنش نمونه‌ها سریعاً به ظرف محتوی آب و یخ منتقل شدند (به مدت 20 دقیقه) سپس به هر نمونه چهار میلی لیتر تولوئن اضافه شد و مخلوط گردید. در نهایت جذب بخش رویی در طول موج 520 نانومترخوانده شد. غلاظت پرولین نمونه‌ها با استفاده از منحنی استاندارد پرولین بر اساس میکروگرم بر گرم وزن تر ارزیابی گردید (Bates et al., 1973).

آنالیز آماری: این پژوهش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد و برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد.

نتایج:


با افزایش میزان سلنات سدیم وزن تر خشک برگ، ساقه و ریشه کاهش یافت که بیشترین کاهش در وزن خشک برگ مشاهده شد. کاهش پارامترهای فوق در تیمار متل جاسمونات نسبت به گیاهان تحت تیمار سلنات سدیم کمتر می‌باشد. در تیمار توازن متل جاسمونات و سلنات سدیم میزان وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه نسبت به تیمار سلنات به تهایی افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد (شکل‌های 1 ، 2 و 3).

شدند. در کف گلدان‌ها چندین منفذ کوچک وجود داشت تا آب ماسه در حد ظرفیت مزروعه باشد. گلدان‌ها به شرایط نوری مناسب منتقل شدند و به مدت 10 روز با محلول هوگلند رقیق شده ($1/2$) آبیاری شدند. سپس بعد از تشکیل برگ اول به گیاهان محلول هوگلند کامل داده شد. گیاهان 20 روزه تحت تیمار سلنات سدیم (صفرا، 30 و 60 میکرو مولار) و تیمار متل جاسمونات (صفرا، 50 و 100 میکرو مولار) و تیمار توازن سلنات سدیم و متل جاسمونات قرار گرفتند. بعد از بیست روز گیاهان جهت برخی سنجهش‌های فیزیولوژیکی برداشت شدند.


سنجهش شاخص‌های رشد: بلافاصله بعد از برداشت گیاهان وزن تر اندام‌های گیاهی اندازه گرفته شد و وزن خشک برگ و ریشه گیاهان بعد از اینکه 24 ساعت در دمای 10°C درجه سانتی گراد خشک شدند سنجهش شد (Evans and Hughes., 1962).

سنجهش و نگیزه‌های فتوستنتزی: برای سنجهش میزان کلروفیل‌ها، ابتدا برگ‌های جوان و هم سن تکرار‌های مختلف جدا و پس از توزین و تکه تکه شدن همراه با استن 80% در داخل هاون چینی به صورت هموژن در آمدند. سپس هموژن حاصل از برگ‌ها از کاغذ صافی واتمن شماره‌ی 2 عبور داده و جذب محلول حاصل با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر، در طول موج‌های 470 ، $646/8$ و $663/2$ نانومتر اندازه گیری شد. از استن 80% به عنوان محلول شاهد برای تنظیم صفر جذب نوری توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده شد (Lichtenthaler , 1987).


سنجهش فل و آنتوسیانین: به منظور سنجهش آنتوسیانین‌ها و فل‌ها، 0.3 گرم از بافت تر برگ به دقت توزین و در هاونی که حاوی 3 میلی لیتر متانول اسیدی (متانول $99/5$ ٪ و اسید کلریدریک 1 ٪ به نسبت 99 به 1) بود، به خوبی ساییده شد. عصاره‌ها در فالکون ریخته شد و به مدت 24 ساعت در تاریکی و در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. پس از 24 ساعت، عصاره حاصل به مدت 10 دقیقه در 8 g سانتریفیوژ گردید. سپس محلول رویی جدا شد و 2 میلی لیتر اتر جهت حذف کلروفیل باقی‌مانده به آن اضافه گردید. محلول زیری توسط دکانتور جدا شد. از این محلول برای تعیین مقدار




شکل ۱- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان وزن تر(a) و خشک (b) برگ. کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.001$, mean \pm SE) .




شکل ۲- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان وزن تر(a) و خشک (b) ساقه. کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.001$, mean \pm SE) .



شکل ۳- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان وزن تر(a) و خشک (b) ریشه. کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.001$, mean \pm SE) .



شکل ۴- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان کلروفیل (a) و (b). کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.001$, mean \pm SE).



شکل ۵- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان کلروفیل کل (a) و کاروتونوئیدها (b). کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.001$, mean \pm SE).


در برگ و ریشه در گیاهان تحت تیمار ۶۰ میکرومولار سلنات سدیم و ۱۰۰ میکرومولار متیل جاسمونات می‌باشد که در مقایسه با سایر تیمارها معنی دارد.

بحث:


نتایج این پژوهش نشان داد که سلنات سدیم در غلظت‌های به کار گرفته شده (۳۰ و ۶۰ میکرومولار) باعث کاهش میزان وزن تر و خشک برگ، ریشه و ساقه گیاه گوجه فرنگی شده است، که با نتایج بسیاری از محققین مطابقت دارد. وزن تر و خشک

با افزایش میزان سلنات سدیم میزان کلروفیل های a و b کاهش یافت. در گیاهان تحت تیمار متیل جاسمونات و تیمارهای حاصل از برهم کنش آنها نیز میزان کلروفیل ها کاهش یافت. غلظت کاروتونوئیدها در غلظت ۶۰ میکرومولار سلنات سدیم به تنها یکی و در همراهی با ۱۰۰ میکرومولار متیل جاسمونات در مقایسه با سایر تیمارها افزایش نشان می‌دهد (شکل های ۴ و ۵).


همان طور که در شکل های ۷، ۶ و ۸ مشاهده می‌شود، بیشترین مقدار آنتوسیانین و فنل برگ و ساقه و تجمع پرولین



شکل ۶- تاثیر بر هم کش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان آنتوسیانین برگ (a) و ساقه (b). کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند (P≤0.001, mean±SE).



شکل ۷- تاثیر بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان فتل برگ (a) و ساقه (b). کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند (P≤0.001, mean±SE).



شکل ۸- تاثیر بر هم کش متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر میزان پرولین برگ (a) و ریشه (b). کلیه میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند (P≤0.001, mean±SE).

(Chen *et al.*, 2005). برخی از ترکیبات فنلی از قبیل فوماریک اسید و کوماریک اسید که ستنز آنها در پاسخ به سلنیوم افزایش می‌یابد فعالیت آنزیم کلروفیلاز را تحیریک می‌کند که به نظر می‌رسد در پژوهش حاضر افزایش فنل در برگ و ساقه می‌تواند تأثیر ترکیبات فنلی بر ستنز رنگیزه‌های فتوستتری را نشان دهد. آنزیم کلروفیلاز با جدا کردن فیتول از کلروفیل و همچنین منزیم از کلروفیلید و تشکیل فئوفورید و در نهایت متلاشی شدن حلقه پیروولی باعث تجزیه کلروفیل می‌شود (Zhu *et al.*, 2004). این دو ترکیب فنلی هم چنین موجب مهار مسیر تبدیل پروتوبورفیرین به Mg-پروتوبورفیرین می‌شود (Yang *et al.*, 2002). احتمالاً سلنیوم از طریق ستنز ترکیبات فنلی موجب کاهش ستنز کلروفیل شده است. حدود یک درصد غشاها کلروفیلاست را سولفو لیپیدها تشکیل می‌دهند. احتمالاً جایگزینی سلنیوم به جای گوگرد نیز باعث تعییر ساختمان و عمل این ترکیبات شده ستنز غشاها تیلاکوئیدی و در نتیجه فتوستتر را مهار می‌کند. کمبود گوگرد باعث تجزیه آنزیم رویسکو و مهار ستنز کلروفیل می‌گردد (Wu and Huang., 1991).

کاهش میزان کلروفیل و رویسکو در برگ‌های جو تحت تیمار با متیل جاسمونات گزارش شده است (Weidhase *et al.*, 1987). مطالعات انجام شده توسط Jung (Jung ۲۰۰۴) در گیاه آراییدوپسیس نشان داد که ۷ روز بعد از تیمار با متیل جاسمونات محتوای کلروفیل‌های *a*، *b* و کاروتونوئیدها کاهش می‌یابد. متیل جاسمونات به سرعت باعث القای ژن کلروفیلاز می‌شود که باعث پیری و تخریب کلروفیل در گیاهان می‌گردد (Tsuchiya *et al.*, 1999).

محتوای آنتوسیانین ساقه در تیمار برهم کنش متیل جاسمونات (۱۰۰ میکرومولار) و سلنات سدیم (۶۰ میکرومولار) در مقایسه با سایر تیمارها افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد، در حالی که محتوای آنتوسیانین برگ در همه تیمارها افزایش دارد. متیل جاسمونات باعث افزایش mRNA آنالین آمونیالیاز (آنزیم کلیدی در ستنز آنتوسیانین) در گیاه لاله (Ludwica *et al.*, 2003) و آراییدوپسیس (Loreti, *et al.*, 2008) شده است و نتایج کار حاضر حاکی از

گیاهان ارزن مروارید، جو دوسر، شبدر (Bawa *et al.*, 1992) گیاهان قهوه (Mazzafera, 1998) تحت تیمار با سلنیوم کاهش یافته است. Ruiz و همکاران (۲۰۰۷) در مقایسه بین سمتیت سلنات با آلمینیوم و مولیبدن نشان دادند که تیمار سلنات باعث بیشترین کاهش در وزن خشک ریشه، ساقه و برگ نسبت به گیاهان شاهد شد. کاهش رشد گیاه در طی تنش می‌تواند به دلیل کمبود پتانسیل آب، مختل شدن جذب مواد غذایی و تنش‌های ثانویه‌ای مثل تنش اکسیداتیو باشد (John *et al.*, 2009).

با افزایش متیل جاسمونات کاهش وزن خشک مشاهده شد که بیشترین تأثیر آن بر وزن خشک برگ می‌باشد و در ساقه و ریشه کاهش قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد. غلظت‌های پائین جاسمونات در محیط کشت تعداد ریشه‌های فرعی و رشد آنها را تسريع می‌کند در حالی که در غلظت‌های بالا باعث کاهش رشد ریشه می‌شود (Tung *et al.*, 1996). متیل جاسمونات می‌تواند حرکات روزنها را تغییر داده و باعث بسته شدن روزنها و کاهش فتوستتر شود (Wang *et al.*, 1996). مطالعات Klerk و Jasik (۲۰۰۶) نشان داد که متیل جاسمونات باعث کاهش وزن تر برگ‌های گیاه زنبق و حشی می‌شود. به نظر می‌رسد غلظت‌های متیل جاسمونات در کار حاضر می‌تواند اثرات سلنات سدیم بر وزن خشک اندام‌های مختلف گیاه گوجه فرنگی را تعدیل کنند.

نتایج حاضر نشان می‌دهد، تیمار سلنات سدیم باعث کاهش میزان رنگیزه‌های فتوستتری شده که با نتایج بسیاری از محققین مطابقت دارد. تیمار با سلنیوم باعث کاهش کلروفیل و کاروتونوئیدها در ذرت و قهوه شده است (Jain and Gadre., 1998; Mazzafera., 1998). تأثیر منفی سلنیوم بر آنزیم پورفوبلینوژن ستاز آنزیم ضروری برای ستنز کلروفیل در *Sinapis alba* L. (Fargasova *et al.*, 2006) کاهش میزان کلروفیل شده اما میزان کاروتونوئید و گرانتوفیل را افزایش داده است. احتمالاً جایگزینی سلنیوم به جای منزیم یکی از راههای آسیب به کلروفیل می‌باشد.

فلاؤنئیدها و اسید های فنولیک را باعث می شوند (Moglia *et al.*, 2008).

تجمع ترکیبات فنلی در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی از جمله فلزات سنگین و پاتوژن ها گزارش شده است (Bruni and Sacchetti, 2009). سلنات سدیم باعث تجمع فنل ها در کاهوی دریابی شده است (Schiavon *et al.*, 2012). فنل ها به طور موقتی به عناصر سنگین کلات می شوند و گونه های اکسیژن فعال را جاروب کرده و یا موجب به دام انداختن الکوکسی لیپیدها می شوند (Arora *et al.*, 2000). در گزارشی که توسط Basilio و Cisneros-Zevallos (۲۰۰۹) ارائه شده است کاربرد متیل جاسمونات میزان ترکیبات فنلی را در گیاهانی مثل سیب زمینی، سیب قرمه، مارچوبه و لوبيا افزایش داده است. این محققین افزایش میزان ترکیبات فنلی را به دلیل افزایش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز که آنزیم کلیدی در ستر فنل می باشد، دانسته اند.

در سلول های گیاهی ترکیبات فینوفنلیک به ویژه پلی فنل ها در سم زدایی پراکسید هیدروژن بسیار مؤثر عمل کرده و به عنوان سیستم پشتیبان چرخه آسکوربات گلوتاتیون در دفع رادیکال های پراکسید هیدروژن عمل می کنند. وقتی فنل ها به عنوان آنتی اکسیدان در این واکنش ها شرکت می کنند به رادیکال فنوکسید اکسید می شوند. رادیکال های فنوکسیل از طریق واکنش با آسکوربات به حالت اولیه بر می گردند (Sakihama *et al.*, 2002).

غلظت پرولین در تیمارهای متیل جاسمونات تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد، در حالی که با افزایش سلنات سدیم میزان پرولین در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری دارد. در تیمارهای بر هم کنش متیل جاسمونات و سلنات سدیم افزایش معنی دار پرولین در مقایسه با تیمار سلنات سدیم به تنها مشاهده می شود.

در نتیجه تأثیر متیل جاسمونات بر تجمع پرولین و پوترسین در گیاه برنج، مشاهده شد که متیل جاسمونات موجب افزایش پoterسين می شود و بر غلظت پرولین تأثیر ندارد (Chen *et al.*, 2005). با آزمایشی که Salwa (2012) بر روی ذرت خوشه ای انجام داد افزایش پرولین را در غلظت

افزایش آنتوسیانین در گیاه گوجه فرنگی تجت تیمار متیل جاسمونات می باشد. با توجه به این که سلنات سدیم نیز باعث افزایش ستر آنتوسیانین می شود (Hawrylak- Nowak, 2008) در گیاهان تحت تیمار برهم کنش سلنات سدیم و متیل جاسمونات میزان آنتوسیانین در مقایسه با تیمارهای دیگر افزایش قابل ملاحظه نشان می دهد.

آنتوسیانین دارای قدرت بالای جاروب کنندگی ملکول های اکسید کننده به ویژه رادیکال های آزاد هستند (Kong *et.al.*, 2003). قدرت آنتی اکسیدانی بالای آنتوسیانین به دلیل اتم اکسونیوم در حلقه C می باشد (Michalak, 2006). رادیکال های پراکسید در سیتوزول به سرعت پروتونه می شوند تا رادیکال های هیدرو پرواکسیل را تشکیل دهند یا توسط سوپراکسید دیسموتاز به H_2O_2 تبدیل می شوند و بعد به درون واکوئل آزاد می شوند و توسط آنتوسیانین جاروب می شوند (Yamamura *et al.*, 1998). آنتوسیانین قدرت کلات شدگی زیادی برای اتصال با عناصر سنگین دارد. شواهد زیادی وجود دارد که آنتوسیانین ها قادرند یک کمپلکس قوی با یون های فلزی مثل کادمیوم، روی، آهن و مولیبدن تشکیل دهند (Shiono *et al.*, 2005). اگرچه مکانیسم اتصال آنتوسیانین به عناصر سنگین ناشناخته مانده است اما به نظر می رسد که داشتن گروه های هیدروکسیل در حلقه B توانایی ایجاد کمپلکس با عناصر سنگین را به آنتوسیانین می دهد (Boulton, 2001).

متیل جاسمونات سیستم دفاعی گیاه را در پاسخ به تنش های محیطی افزایش داده و موجب تجمع متابولیت های ثانویه می شود (Horbowicz, *et al.*, 2011). ترکیبات فنلی یکی از متابولیت های ثانویه اصلی در گیاه هستند که به علت عملکرد بیولوژیکی آنها اهمیت زیادی دارند. از جمله گیاهان را در مقابل پرتوهای UV حفاظت کرده و فعالیت ضد میکروبی را موجب می شوند (Steyn *et al.*, 2002; Winkel- Shirley 2002). همان طور که در شکل ۷ مشاهده می شود با افزایش سلنات سدیم تجمع فنل ها در برگ و ساقه افزایش می باید و تیمار گیاهان فرق با متیل جاسمونات موجب افزایش معنی داری در غلظت فنل ها می شود. به نظر می رسد که متیل جاسمونات بیوستر

نتیجه گیری کلی:

تنش عناصر سنگین یکی از تنش‌های محیطی است که گیاه با آن مواجه می‌شود. تنش عناصر سنگین باعث تغییراتی در صفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه می‌شود. البته گیاهان برای مقابله با تنش‌ها راهکارهایی دارند که یکی از آنها افزایش میزان هورمون‌هاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که گیاه گوجه فرنگی حساس به فلز سنگین سلنیوم است. عنصر سلنیوم باعث کاهش وزن تر و خشک و میزان رنگیزه‌ها در گیاه گوجه فرنگی شد. البته کاربرد متیل جاسمونات نیز باعث کاهش وزن تر و خشک شد که می‌تواند یک راهکار دفاعی برای حفظ گیاه در برابر تنش باشد. در گیاهان تحت تنش سلنات سدیم افزایش میزان فنل، آنتوسبیانین و پرولین مشاهده شد و با افزودن متیل جاسمونات به محیط کشت محبوی سلنات سدیم افزایش معنی دار برخی از آنتی اکسیدان‌های غیر آنزیمی مانند فنل، آنتوسبیانین و پرولین مشاهده شد. به نظر می‌رسد که غلظت بکار گرفته شده متیل جاسمونات در نقش حفاظتی آن بر اثرات مخرب حاصل از سلنات سدیم حائز اهمیت است.

های پایین سلنات (۳ و ۶ میلی گرم بر لیتر) گزارش کرده است ولی در غلظت‌های بالای سلنات (۱۲ میلی گرم بر لیتر) اثرات سمی و کاهش پرولین مشاهده شد. به نظر می‌رسد که غلظت‌های بکار گرفته شده متیل جاسمونات بر سنتز پرولین موثر نمی‌باشد در حالی که سلنات سدیم به تنها و در مجاورت متیل جاسمونات موجب القای سنتز پرولین می‌شود. پرولین نه تنها به عنوان یک تنظیم کننده اسمزی بلکه به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و بازدارنده مرگ سلولی شناخته می‌شود. بنابراین پرولین می‌تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان غیر آنزیمی در گیاهان، جانوران و میکروب‌ها در نظر گرفته شود تا اثرات نا مطلوب ناشی از گونه‌های فعال اکسیژن را کاهش دهد (Chen and Dickman, 2005). عناصر سنگین باعث القای تجمع پرولین می‌شوند که می‌تواند به عنوان مارکر بیوشیمیایی برای آلودگی عناصر سنگین به کار رود (Alia and Saradhi, 1991). متیل جاسمونات به گیاهان کمک می‌کند تا از طریق تنظیم اسمزی و افزایش پرولین (Fedina and Tsonev, 1997) و سنتز پروتئین‌های تنشی (Alia et al., 1997) با تنش مقابله کنند.

منابع:

- Boulton, R. (2001) The copigmentation of anthocyanins and its role in the color of red wine: a critical review. American Journal of Enology and Viticulture 52: 67-87.
- Birringer M, Pilawa S, Flohe L. (2002) Trends in selenium biochemistry. Natural Production Reports 19: 693-718.
- Bruni, R. and Sacchetti, G. (2009). Factors affecting polyphenol biosynthesis in wild and field grown St. John's Wort (*Hypericum perforatum* L. Hypericaceae/Guttiferae). Molecules: 14: 682-725.
- Chen, T. F., Zheng, W. J., Luo, Y., Yang, F., Bai, Y. and Tu, F. (2005) Effects of selenium stress on photosynthetic pigment contents and growth of *Chlorella vulgaris*. Journal of Plant Physiology and Molecular Biology 31: 369 -373.
- Chen, C. and Dickman, M. B. (2005) Proline suppresses apoptosis in the fungal pathogen *Colletotrichum trifolii*. Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America 102: 3459-3464.
- Creelman, R. A. and Mullet, J. E. (1997) Biosynthesis and action of jasmonate in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 48: 355-381.
- Alia, S. and Saradhi, P. P. (1991) Proline accumulation under heavy metal stress. Journal of Plant Physiology. 138, 554-558.
- Alia, S., Saradhi, P. and Mohanty, P. (1997) Involvement of proline in protecting thylakoid membranes against free radical-induced photodamage. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 38 :253-257.
- Arora, A., Byrem, T. M., Nair, M. and Strasburg, G. M. (2000) Modulation of liposomal membrane fluidity by flavonoids and isoflavonoids. Archives of Biochemistry and Biophysics 373:102-109.
- Basilio ,J and Cisneros-Zevallos, L. (2009) The effects of exogenous ethylene and methyl jasmonate on the accumulation of phenolic antioxidants in selected whole and wounded fresh produce. Food Chemistry 115: 1500-1508.
- Bates, L.S., Waldren, R. P. and Teare I. D. (1973) Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil 39: 205-207.
- Bawa, S. S., Dhillon, K. S. and Dhillon, S. K. (1992) Screening of different fodders for selenium absorption capacity. Indian Journal of Dairy Science 45:457-460.

- Mediterranean shrub *Cistus albidus* L. Environmental and Experimental Botany 69: 47- 55.
- Jung, S. (2004) Effect of chlorophyll reduction in *Arabidopsis thaliana* by methyl jasmonate or norflurazon on antioxidant systems. Plant Physiology and Biochemistry 42: 225-231.
- Kong, J. M., Chia, L. S., Goh, N. K., Chia, T. F. and Brouillard, R. (2003) Analysis and biological of activities of anthocyanins. Phytochemistry 64: 923- 933.
- Launchli, A. (1993) Selenium in plants: uptake, functions, and environmental toxicity. Botanica Acta 106: 455-468.
- Lichtenthaler, H. K. (1987) Chlorophyll and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology 148:350- 382.
- Loreti, E., Povero, G., Novi, G., Solfanelli, C., Alpi, A and Perata, P. (2008) Gibberellin, jasmonate and abscisic acid modulate the sucrose-induced expression of anthocyanin biosynthetic genes in *Arabidopsis*. New Phytology 13: 1004-1016.
- Ludwica, M., Miszczak, A. and Saniewski, M. (2003) Effect of methyl jasmonate and ethylene of leaf growth, anthocyanin accumulation and CO₂ evolution in *Tulips Bulbs*. Fruit and Ornamental Plant Research 11:59-68.
- Mazzafera, P. (1998) Growth and biochemical alterations in coffee due to selenite toxicity. Plant and Soil 201: 189 -196.
- Michalak, A. (2006) Phenolic compounds and their antioxidant activity in plants growing under heavy metal Stress. Polish Journal of Environmental Studies 15: 523-530.
- Moglia, A. A., Lanteri, S., Domino, C., Acquadro, A., DE Vos R., Beekwilder, J. (2008) Stress-induced biosynthesis of dicaffeoylquinic acids in globe artichoke. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56: 8641- 8649.
- Parra-Lobato, M. C., Fernandez-Garcia, N., Olmos, E., Alvarez-Tinaut, M.C., Gomez- Jimenez M.C. (2009) Methyl jasmonate-induced antioxidant defence in root apoplast from sunflower seedlings. Environmental and Experimental Botany 66:9-17.
- Ruiz, J. M., Rivero, R. M. and Romero, L. (2007) Comparative effect of Al, Se, and Mo toxicity on NO₃ assimilation in sunflower (*Helianthus annuus* L.) plants. Journal of Environmental Management 83:207-212.
- Sakihama, Y., Cohen, M. F., Grace, S. C. and Yamasaki, H. (2002) Plant phenolics antioxidant and pro oxidant activity: Phenolics-induced oxidative damage mediated by metal in plants. Toxicology 177: 67-80.
- Salwa, M. A. (2012) Effects of low temperature and selenium application on growth and the physiological changes in sorghum seedlings. Journal of Stress Physiology and Biochemistry. 8: 268- 286.
- Dai, L. P., Xiong, Z. T., Huang, Y., Li, M.J. (2006) Cadmium induced change in pigments, total phenolics, and phenilalanin ammonia-lyas activity in fronds of *Azolla imbricata*. Environmental Toxicology 21: 505-512.
- Evans, G. C. and Hughes, A. P. (1962) Plant growth and the aerial environment. III. On the computation of unite leaf rate. New Phytologist 61:322-327.
- Fargasova, A., Pastierova, J. and Svetkova, K. (2006) Effect of Se-metal pair combinations (Cd, Zn, Cu, Pb) on photosynthetic pigments production and metal accumulation in *Sinapis alba* L. seedlings. Plant Soil and Environment 52: 8-15.
- Faurie, B., Cluzet, S., Merillon, J.M. (2009) Implication of signaling pathways involving calcium, phosphorylation and active oxygen species in methyl jasmonate- induced defense responses in grapevine cell cultures. Journal of Plant Physiology 166: 1863- 1877.
- Fedina, I. S. and Tsonev, T. D. (1997) Effect of pretreatment with methyl jasmonate on the response of *Pisum sativum* to salt stress. Journal of Plant Physiology 151: 735-740.
- Grieve, C. M., Poss, J. A., Suarez, D. L. and Dierig, D. A. (2001) Lesquerella growth and selenium uptake affected by saline irrigation water composition. Industrial Crops and Products 13: 57-65.
- Hawrylak-Nowak, B. (2008) Changes in anthocyanin content as indicator of maize sensitivity to selenium. Journal of Plant Nutrition 31: 1232- 1242.
- Horbowicz, M., Chrzanowski, G., Koczkodaj, D., Mitrus, J. (2011) The effect of methyljasmonate vapors on content of phenolic compounds in seedlings of common buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 5-9.
- Hyun, S., Burns, P. E., Murarka, I and Lee, L. S. (2006) Selenium (IV) and (VI) sorption by soils surrounding fly ash management facilities. Vadose Zone Journal 5: 1110-1118.
- Jain, M. and Gadre, R. P. (1998) Inhibition of chlorophyll synthesis and enzymes of nitrogen assimilation by selenite in excised maize leaf segments during greening. Water, Air and Soil Pollution 104:161- 166.
- Jasik, J. and de Klerk, G. J. (2006) Effect of Methyl Jasmonate on Morphology and Dormancy Development in Lily Bulblets Regenerated *In Vitro*. Journal of Plant Growth Regulation 25:45-51.
- John, R., Ahmad, P., Gadgil, K. and Sharma, S. (2009) Heavy metal toxicity: Effect plant growth, biochemical parameters and metal accumulation by *Brassica juncea* L. International of Journal of Plant Production 3: 65-75.
- Jubany- Mari, T., Prinsen, E., Munne- Bosch, S., Alegre, L. (2010) The timing of methyl jasmonate, hydrogen peroxide and ascorbate accumulation during water deficit and subsequent recovery in the

- Tung, P., Hooker, T. S., Tampe, P. A., Reid, D.M. and Thorpe, T. A. (1996) Jasmonic acid: effects on growth and development of isolated tomato roots cultured in vitro. International Journal of Plant Sciences 157: 713- 721.
- Wang, H., Cao, G. and Prior, R. (1996) Total antioxidant capacity of fruits. Agriculture Food Chemistry 44: 701-705.
- Weidhase, R. A., Kramell, H., Lehmann, J., Liebisch, H., Lerbs, W. and Parthier, B. (1987) Methyljasmonate-induced changes in the polypeptide pattern of senescing barley leaf segments. Plant Science 51: 177-186.
- Winkel- Shirley B. (2002) Biosynthesis of flavonoids and effects of stress. Current Opinion in Plant Biology. 5: 218- 223.
- Wu, L. and Huang, Z. Z. (1991) Chloride and sulfate salinity effects on selenium accumulation by tall fescue. Crop Science 31:114-118.
- Xie, L., Ying, Y. and Ying, T (2007) Combination and comparison of chemometrics method for indentification of transgenic tomatoes using visible and near-infrared diffuse transmittance technique. Journal of Food Engineering 82: 395- 401.
- Yamamura, S., Ozawa, K., Ohtani, K., Kasai, R. and Yamasaki, K. (1998) Antihistaminic flavones and aliphatic glycosides from *Mentha spicata*. Phytochemistry 48: 131-136.
- Yang, C. M., Lee, C. N. and Chou, C. H. (2002) Effect of three allelopathic phenol on chlorophyll accumulation of rice (*Oryza sativa* L.) seedling: I. inhabitation of supply orientation. Botanical Bulletin of Academia Sinica 43: 299-304.
- Zhu, Y. G., Huang, Y., Hu, Y., Liu, Y. and Christie, P. (2004) Interactions between selenium and iodine uptake by spinach (*Spinacia oleracea* L.) in solution culture. Plant and Soil 261: 99-105.
- Schiavon, M., Moro, I., Pilon-Smits, E. A. H., Matozzo, V., Malagoli, M. and Vecchia, F. D. (2010) Accumulation of selenium in *Ulva* sp. and effects on morphology, ultrastructure and antioxidant enzymes and metabolites, Aquatic Toxicology 122- 123: 222- 231.
- Soares, A. M. S., Souza, T. F., Jacinto, T., Machado, O. L. T. (2010) Effect of methyl jasmonate on antioxidative enzyme activities and on the contents of ROS and H₂O₂ in *Ricinus communis* leaves. Brazilian Journal of Plant Phsyiology 22: 151- 158.
- Shiono, M., Matsugaki, N. and Takeda, K. (2005) Phytochemistry: Structure of the blue cornflower pigment. Nature 436: 791.
- Steyn, W. J., Wand, S. J. E., Holcroft, D.M., Jacobs, G. (2002) Anthocyanins in vegetative tissues: a proposed unified function in photoprotection. New Phytologist 155: 349- 361.
- Stintzi, A., Weber, H., Reymond, P., Browne, J. and Farmer, E. E. (2001) Plant defense in the absence of jasmonic acid: the role of cyclopentenones. Proceeding of the National Academy Science USA. 98:12837-12842.
- Stintzi, A., Weber, H., Reymond, P., Browne, J. and Farmer, E. E. (2001) Plant defense in the absence of jasmonic acid: the role of cyclopentenones. Proceeding of The National Academy of Sciences of the United States of America. 98:12837-12842.
- Terry, N., Zayed, A. M., De Souza, M. P. and Tarun, A.S. (2000) Selenium in higher plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 51:401-432.
- Tsuchiya, T., Ohta, H., Okawa, K., Iwamatsu, A., Shimada, H., Masuda, T. and Takamiya, K. (1999) Cloning of chlorophyllase, the key enzyme in chlorophyll degradation: finding of a lipase motif and the induction by methyl jasmonate. Proceeding of The National Academy of Sciences of the United States of America 96: 15362-15367.