

اثر کم آبیاری (تکنیک PRD و SDI) و محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم در گیاه

پرچینی برگ نو (*Ligustrum vulgare* L.)

سلاح ورزی یحیی^{۱*}، کمالی مریم^۲، شور محمود^۳، ال واوی زینت محمد عباس^۴

۱- استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۰۵۷۹۰،

رایانامه: Selahvarzi@um.ac.ir

۲- دانش آموخته دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ۰۹۱۵۷۳۳۵۷۳۸،

رایانامه: m.kamali57@yahoo.com

۳- دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۰۵۷۵۴،

رایانامه Shoor@um.ac.ir

۴- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ۹۶۴۷۸۲۶۳۱۱۸۷۰

*مسئول مکاتبات: Selahvarzi@um.ac.ir

چکیده

امروزه تنش خشکی یکی از موارد محدود کننده توسعه فضای سبز محسوب می شود. یکی از راهکارها برای کاهش اثرات تنش خشکی برای گیاهان محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم است. به منظور بررسی کاهش اثرات نامطلوب کم آبیاری با کاربرد سیلیکات پتاسیم بر گیاه پرچینی برگ نو (*Ligustrum vulgare* L.) در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ انجام شد. آزمایش به صورت کشت گلدانی در ۳ سطح کم آبیاری (شاهد (۱۰۰٪ ظرفیت زراعی)، ۵۰٪ ظرفیت زراعی (SDI)، ۵۰٪ ظرفیت زراعی با تکنیک PRD و ۳ سطح محلول پاشی برگی با سیلیکات پتاسیم (۰، ۲ و ۴٪) در ۴ تکرار انجام شد. طبق نتایج بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار عدم تنش خشکی و محلول پاشی برگی با سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۶۸/۵ سانتی متر) در گیاه و کمترین ارتفاع گیاه در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون محلول پاشی (۲۹ سانتی متر) بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیداتی در تیمارهای تنش خشکی ۵۰ و محلول پاشی سیلیکات پتاسیم ۲٪ در گیاه (۶۷٪)، همچنین در تنش خشکی PRD 50 و بدون محلول پاشی سیلیکات پتاسیم (۶۹٪) و در محلول پاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۷۲٪) و بیشترین فنل کل در تیمارهای تنش خشکی PRD50 و محلول پاشی این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۱۱/۱۶ mg/gfw) در گیاه بود. کربوهیدرات کل در تیمارهای تنش خشکی ۵۰ و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۰/۹۳ mg/g fw) در گیاه و پرولین در تیمارهای تنش خشکی PRD 50 و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم (۴/۰۶ mg/g fw) از بقیه تیمارها بیشتر بود. نتایج نشان داد تنش خشکی با ۵۰٪ ظرفیت زراعی با تکنیک PRD نسبت به تنش خشکی با ۵۰٪ ظرفیت زراعی رشد بهینه گیاه را مختل کرده اما در ترکیب با محلول پاشی سیلیکات پتاسیم رشد و بقای گیاه بهبود یافت. بر اساس نتایج این آزمایش، در تیمار آبیاری با ۵۰٪ ظرفیت زراعی، وضعیت گیاه با محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها: تنش خشکی، فنل کل، کربوهیدرات، گیاه پرچینی

مقدمه

برگ نو یا ترون با نام علمی *Ligustrum vulgare L.* متعلق به تیره Oleaceae می‌باشد. این گیاه بومی مناطق گرم، کشورهای اروپایی، آفریقا، استرالیا و آسیای از جمله ایران است (Starr et al., 2003). برگ نو به صورت درختچه‌ای با ارتفاع دو الی چهار متر و دارای برگ‌های خزان کننده می‌باشد، اما به دلیل آنکه در فصل زمستان همواره تعدادی از برگ‌ها روی تنه گیاه، باقی می‌ماند، گیاه ظاهری همیشه سبز از خود نشان می‌دهد. رنگ برگ‌ها در فصل زمستان قرمز - قهوه‌ای بوده که از این نظر، ظاهری زیبا به گیاه می‌دهد. لذا به لحاظ زیبایی فرم و شکل کاربرد زیادی در فضای سبز شهری دارد (Feyzi et al., 2014). برگ نو توانایی رشد در خاک‌های متفاوت را دارد و قادر به حفظ بقای خود می‌باشد و به راحتی از طریق گل‌های سفید رنگ قابل شناسایی‌اند (Selahvarzi et al., 2020). معمولاً این گیاه به دلیل هرس‌پذیری، شکل‌پذیری، زیبایی و دوام از ارزش بالایی در فضای سبز برخوردار است (Ghasemi, 2014).

با وجود اهمیت فضای سبز شهری، به دلیل کمبود منابع آب کافی امکان توسعه این فضاها وجود ندارد. در کشور ما، بخش‌های کشاورزی و فضای سبز، مهمترین مصرف‌کنندگان منابع آبی کشور بوده و حدود ۹۰٪ حجم آب در ایران در این دو بخش مصرف می‌شود، در حالیکه بیشترین تلفات آب هم در این دو بخش گزارش می‌شود. شهر مشهد با ۳۳۵۹ هکتار فضای سبز تحت مدیریت یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ آب می‌باشد (Ghanadzade et al., 2015). هم‌اکنون بخش زیادی از این آب بوسیله منابع آبی و مابقی توسط شبکه آب شرب شهری تامین می‌شود. علیرغم تلاش‌های انجام شده به منظور تامین آب مورد نیاز فضای سبز، هنوز برای آبیاری، بیش از ۱۳۱ لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد که بارش‌های کم آبیاری مدیریتی تا حدی قابل جبران می‌باشد. با توجه به سیستم‌های تصمیم‌گیری در خصوص میزان افزایش سرانه فضای سبز به ۱۵ متر مربع تا

سال ۱۴۱۵ بنظر می‌رسد نیاز آبی به بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد (Ghanadzade *et al.*, 2015). در شرایط بحران آب، به کارگیری تکنیک‌های جدید آبیاری جهت استفاده موثر و کارآمد از منابع آبی موجود، ضرورت دارد. کم آبیاری یک روش سودمند اقتصادی در وضعیت موجود و با هدف حداکثر استفاده از واحد آب مصرفی، مطرح می‌باشد. تکنیک‌های کم آبیاری عبارتند از: کم آبیاری تنظیم شده (Regulated Deficit irrigation (RDI)) و خشک شدن جزئی ریشه (Partial Root Drying (PRD)). این تکنیک‌ها بر اساس واکنش گیاهان به خشکی انتخاب می‌شود (FAO, 2002). خشک شدن جزئی ریشه (PRD) یک شکل اصلاح شده برای کاهش نقص کم آبیاری است (English *et al.*, 1990). PRD یک راهبرد جدید آبیاری است که در آن، ریشه به دو قسمت تقسیم شده و در هر نوبت تنها یک قسمت از ناحیه ریشه آبیاری می‌شود (Ahmadi *et al.*, 2010). به این طریق بخشی از ریشه که خشک مانده است، به عنوان یک پاسخ فیزیولوژیکی در برابر خشکی، مقداری هورمون شیمیایی به نام آبسسیک اسید تولید می‌کند که انتقال این ماده به ریشه گیاه باعث قلیایی شدن آن و کاهش میزان باز شدن روزنه شده و موجبات کاهش هدر رفت آب را فراهم می‌آورد (Gong *et al.*, 2005). اثرات آبیاری محدود (RDI) و خشک شدن جزئی ریشه (PRD) بر رشد و فعالیت دیواره سلولی پراکسیداز مورد بررسی قرار گرفت. RDI به طور قابل توجهی قطر میوه را کاهش داد، اگرچه PRD وزن تازه را کاهش داد ولی تأثیر قابل توجهی بر قطر میوه نداشت. فعالیت پراکسیداز در گیاهان تحت تیماردهی RDI و PRD به طور قابل توجهی بیشتر از گیاهان شاهد بود (Savić *et al.*, 2008). در زرشک زینتی با افزایش شدت خشکی ارتفاع بوته کاهش یافت اما بین ۱۰۰ و ۸۰ درصد نیاز آبی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک و ارتفاع بلندترین شاخه در ۶۰ درصد نیاز آبی اختلاف معنی دار با ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی نداشت (Setayesh *et al.*, 2017).

در مطالعه مربوط به چهار گونه فضای سبز (چمن لولیوم، فرانکینیا، شبدر سفید، پتنتیلا) نتایج نشان داد در تیمار ۷۵٪ ظرفیت زراعی گونه فرانکینیا بیشترین محتوای پرولین و گونه های لولیوم پرنه و شبدر سفید به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر کربوهیدرات را داشتند. دو گونه فرانکینیا و پتنتیلا توانستند با تولید پرولین بیشتر تحت شرایط تنش خشکی نسبت به سایر گونه ها پتانسیل اسمزی خود را پایین نگه داشته و نسبت به خشکی تحمل بیشتری را نشان دهند (Samieiani *et al.*, 2013).

تغذیه مطلوب گیاهی یکی دیگر از روش‌های مؤثر بر تواناسازی گیاهان در مقابله با شرایط خشکی معرفی شده است. سیلیسیم بعد از اکسیژن، دومین عنصر فراوان در خاک است. در بافت ریشه همه گیاهان در خاک، مقداری سیلیکون وجود دارد. با وجود اینکه این عنصر در کره زمین فراوان است، همراه بودن آن با سایر عناصر علت خارج شدن این ماده از

دسترس گیاه بوده و گیاهان قادر به استفاده از فرم سیلیسیک می‌باشند و به علت این که در زمره عناصر ضروری برای رشد گیاهان قرار ندارد توجه زیادی به نقش بیولوژیکی آن در گیاه نمی‌شود (Hajiboland, 2013). جداره یاخته‌های اپیدرمی که با لایه محکمی از سیلیکون آغشته می‌شود از دست دادن آب به وسیله تعرق کوتیکولی و نیز در برابر بیماری‌های قارچی جلوگیری می‌کنند (Broadly et al., 2012).

پتاسیم نیز به عنوان یک عنصر ضروری در گیاه برای افزایش تولید و بهبود کیفیت گیاه محسوب می‌شود. پتاسیم هم از نظر حضور در بافت‌های گیاهی و هم از نظر وظایف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عنصر مهمی است. پتاسیم در داخل بافت‌های گیاهی فعال بوده و جهت عمده حرکت آن به سمت بافت‌های مریستمی گیاه می‌باشد (Hajiboland, 2013). علاوه بر تحرک پتاسیم در گیاه، غلظت فراوان آن در داخل گیاه این امکان را به پتاسیم می‌دهد که در فیزیولوژی گیاهی مؤثر باشد (Hajiboland, 2013). مطالعات متعدد نشان داده است که این عناصر آثار مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه دارد. سیلیسیم توسط گیاه به شکل باردار $Si(OH)_4$ جذب و در نهایت به صورت رسوب حل‌نشده (سالیسیلیک اسید) در گیاه تجمع می‌یابد. از اثرات مثبت این عنصر می‌توان به ایجاد مقاومت در گیاهان در برابر تنش‌های خشکی، شوری، فلزات سنگین، اشعه UV و پاتوژن‌ها اشاره کرد. علاوه بر این عنصر به استقرار عمودی برگ‌ها و جلوگیری از سایه اندازی گیاه، قابلیت ارتجاعی و استحکام جدار سلولی و کاهش تعرقی کوتیکولی نیز کمک می‌کند (Hajiboland, 2013). تأثیر سیلیسیم در کاهش آثار خشکی، روی ژنوتیپ‌های «برگ موجی» و «برگ صاف» گیاه آلترنانتر (*Alternanthera repens L.*) بررسی شد (Mehrgan et al., 2017). تیمار سیلیسیم در سه سطح صفر، ۱ و ۲ میلی‌مولار و تنش خشکی در سه سطح ۹۰، ۷۵ و ۵۵ درصد ظرفیت زراعی اعمال شد. نتایج نشان داد افزایش خشکی به طور معناداری بر تمامی صفات مورفولوژیکی (ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر ریشه)، رویشی و فیزیولوژیکی (نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه) و بیوشیمیایی (کلروفیل a, b و کل، پرولین و آنتوسیانین) تأثیر داشت. در حالی که کاربرد سیلیسیم آثار تنش را تعدیل کرد، به طوری که در همه سطوح خشکی تیمار سیلیسیم به‌ویژه با غلظت دو میلی‌مولار باعث افزایش رشد، وزن خشک گیاه و شاخص مقاومت به تنش شد. در این مطالعه نشت یونی که شاخصی از یکپارچگی غشاء سلولی است با کاربرد سیلیسیم در سطوح بالای تنش خشکی کاهش یافت. طی مطالعه‌ای بر روی نقش سیلیسیم در تنظیم فتوسنتز و رویدادهای متابولیک مرتبط با آن در کنتاکی بلوگرس تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی در چهار سطح (۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) و سیلیسیم (Na₂SiO₃.9H₂O) بر گیاهان یک‌ساله‌ای که از مزرعه حذف شده و در گلخانه کشت داده شدند اعمال شد. پس از ۲۰ روز تنش

خشکی، گیاهان مجددا آبیاری شدند تا به ظرفیت زراعی خاک برای بررسی بهبود در روزهای دوم و هفتم برسند. هدایت روزنه‌ای، محتویات کلروفیل، فعالیت روبیسکو و حالت فعال سازی روبیسکو در بلوگراس کنتاکی ۷۸، ۶۱ و ۴۸ درصد افزایش فوتوسنتز، فعالیت اولیه روبیسکو و فعالیت کلی روبیسکو به ترتیب در ۲۰ روز خشکسالی ثبت شد (Saud et al., 2016). اثر سیلیکون بر هدایت روزنه ای در سورگوم نشان داد این ماده سبب افزایش پتانسیل آبی برگ از طریق افزایش هدایت هیدرولیکی در شرایط تنش آبی می‌گردد (Hattori et al., 2007). گیاهانی که از مقدار پتاسیم کافی برخوردارند برای ساخت ترکیبات آلی پیچیده به مقدار آب کمتری نیاز دارند. در گیاهان دارای مقدار پتاسیم کافی میزان تعرق به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. نقش اصلی در این خصوص تنظیم باز و بسته شدن روزنه‌هاست. از طرف دیگر با افزایش پتاسیم در برگ‌ها میزان نگهداری آب افزایش پیدا می‌کند. پتاسیم باعث افزایش هیدراسیون پروتوپلاسم شده و افزایش هیدراسیون باعث مقاومت گیاه به خشکی می‌شود. در صورت کمبود پتاسیم، میزان نیتروژن محلول در گیاه افزایش پیدا کرده و تقسیم سلولی و رشد گیاه متوقف می‌شود. بنابراین هرچه میزان نیتروژن محلول در گیاه زیاد باشد نشان دهنده عدم تعادل غذایی بیشتر می‌باشد. کاهش تقسیم سلولی و عدم رشد گیاه در حضور ناکافی پتاسیم نتیجه عدم ساخت پروتئین و هیدرات‌های کربن در این شرایط است (Karimi Moridani, 2014). در آزمایش میدانی، اثر سیلیکات پتاسیم بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل رز در شرایط تنش کمبود آب مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها در چهار سطح کاربرد آب آبیاری شامل ۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و ۲۵ درصد نیاز به آب گیاه (PWR) و سیلیکات پتاسیم با سه میزان صفر درصد (فقط آب خالص)، ۰/۲ و ۰/۴ درصد، یک‌بار در (بهار یا تابستان) یا دو بار (یک بار در بهار و یک بار در تابستان) در طول رشد گیاه اعمال شدند. نتایج این بررسی نشان داد که با آبیاری ۷۵ درصد آب مورد نیاز گیاه، غلظت کلروفیل a (۱۷۰ درصد)، کلروفیل b (۱۶۳ درصد) و کاروتنوئیدها (۹۱ درصد)، میزان نسبی آب برگ (۱۴/۸ درصد)، عملکرد کل گل (۲۰ درصد) در مقایسه با شاهد شد. در پاسخ به استرس اکسیداتیو ناشی از تنش کمبود آب، فعالیت کاتالاز برگ (۵۹/۵ درصد) و غلظت پرولین (۶۴/۸ درصد) در مقایسه با شاهد افزایش یافت. محلول‌پاشی سیلیسیم در دو غلظت ۰/۲ و ۰/۴ درصد در بهار و تابستان منجر به غلظت بالاتری از کلروفیل a (۵۷/۳ و ۶۱/۷ درصد) کلروفیل b (۳۱ و ۲۴/۶ درصد) و مقدار کاروتنوئید در مقایسه با شاهد شد. به ترتیب افزایش غلظت پرولین و فعالیت بیشتر CAT در گیاهان عرضه شده با سیلیسیم منجر به افزایش RWC برگ و شدت کمتر آسیب اکسیداتیو، یعنی نشت یون شد. با توجه به نتایج، با پاشش سیلیکات پتاسیم در ۰/۲ یا ۰/۴ درصد هم در فصل بهار و تابستان در سطح آبیاری معادل ۵۰ درصد، عملکرد مطلوب گل حاصل شد (Farahani et al., 2020). با توجه به تاثیر سیلیکات پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش و با هدف مقایسه دو

تیمار آبیاری کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری به شیوه خشک شدن جزئی ریشه در گیاه برگ نو آزمایش فوق طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کم آبیاری با کاربرد سیلیکات پتاسیم بر گیاه پرچینی برگ نو (*Ligustrum vulgare L.*) در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل دو عاملی (کم آبیاری و سیلیکات پتاسیم) در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ انجام شد. میانگین دمای روز و شب گلخانه به ترتیب ۱۸ و ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰-۶۵٪ بود. آزمایش به صورت کشت گلدانی با بستر ۵۰ درصد خاک و ۵۰ درصد ماسه در ۳ سطح کم آبیاری (شاهد (۱۰۰٪ ظرفیت زراعی)، ۵۰٪ ظرفیت زراعی (SDI) و ۵۰٪ ظرفیت زراعی با تکنیک PRD روز در میان، و ۳ سطح محلول پاشی برگ با سیلیکات پتاسیم (۰، ۲ و ۴٪) در ۴ تکرار در گلدان سایز ۴ کشت شد. گلدان‌های مورد استفاده برای آزمایش PRD با تیغه‌های نازک کارتن پلاست به دو قسمت مساوی تقسیم شد. ته گلدان‌ها (ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر با دهانه ۱۲ سانتی‌متر)، به ارتفاع ۲ سانتی‌متر شن ریز به‌عنوان فیلتر زهکش ریخته شد. ۵ سانتی‌متر بالای گلدان‌ها برای اعمال آبیاری، خالی در نظر گرفته شد. برای جلوگیری از نشست آب از دیواره‌ها، داخل گلدان‌ها با پلاستیک نازک پوشانده شد. بعد از پر شدن گلدان‌ها با خاک، به منظور رفع شوری خاک، دو دفعه با آب اشباع شد و اجازه داده شد تا زهکشی انجام شود. به منظور تعیین نیاز آبی، قبل از هر آبیاری از عمق موثر ریشه، نمونه خاک تهیه و رطوبت وزنی آن تعیین شد. سپس حجم آب برای رسانیدن خاک به حد ظرفیت زراعی محاسبه گردید. برای آبیاری تیمارهای PRD با تیغه و بدون تیغه، ۵۰٪ حجم آب تیمار کامل در هر نوبت آبیاری در نظر گرفته شد.

کاربرد محلول پاشی سیلیکات پتاسیم به شیوه محلول پاشی برگ در ۴ نوبت به فواصل هفت روز یکبار، دو نوبت قبل از اعمال تنش خشکی و دو نوبت پس از شروع تنش بود.

نمونه برداری از خاک مورد استفاده برای تحقیق انجام و به آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، منتقل شد و ویژگی‌های خاک در جدول یک ارائه گردیده است:

جدول ۱. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک گلدان‌ها

بافت خاک	رس (%)	لی (%)	شن (%)	اسیدیته کل اشباع	هدایت الکتریکی (dS/m)
لومی رسی	۴۱	۳۰	۲۹	۷/۹	۱/۲

صفات مورد بررسی در این آزمایش به شرح زیر می‌باشند:

اندازه‌گیری صفات مورفولوژیکی

صفات مورفولوژیک مورد نظر شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، طول شاخه جانبی، تعداد برگ، سطح برگ، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام‌های هوایی، وزن خشک ریشه، طول ریشه اصلی و حجم ریشه اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری این صفات مثل ارتفاع گیاهان با استفاده از خط‌کش و قطر ساقه با کولیس دیجیتال، سطح برگ با دستگاه سطح برگ سنج و حجم ریشه‌ها به روش ارشمیدس اندازه‌گیری شد. قبل از اندازه‌گیری وزن ریشه، خاک و گل‌لای اطراف ریشه شسته شد. وزن تر و خشک گیاهان با ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۱ اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

رنگیزه‌های فتوسنتزی: برای اندازه‌گیری میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل در گیاهان، ابتدا ۰/۲۵ گرم برگ تازه خرد شد و در ۱۰ میلی‌لیتر استون ۸۰ درصد با یک هاون چینی ساییده تا یک توده به صورت یکنواخت به دست آمد. سپس مخلوط حاصله در لوله‌های فالكون ۲۰ میلی‌لیتر ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۵۰۰ rpm سانتریفیوژ شد. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر میزان جذب نور محلول رویی در طول موج‌های ۴۸۰، ۵۱۰، ۶۵۲، ۶۶۳ و ۶۴۵ نانومتر خوانده شد و در نهایت با استفاده از روابط زیر غلظت کلروفیل محاسبه شد (Arnon, 1949).

Total Chlorophyll: $[20.2(A645) + 8.02(A663)] \times [V/1000 \times W]$

Chlorophyll a: $[12.7(A663) - 2.69(A645)] \times [V/1000 \times W]$

Chlorophyll b: $[22.9(A645) - 4.68(A663)] \times [V/1000 \times W]$

= حجم استون مصرف شده (۱۰ میلی‌لیتر)، W = حجم نمونه استفاده شده (۰/۲۵ گرم)

تهیه عصاره متانولی: از برگ‌های جوان کاملاً توسعه‌یافته ۰/۲ گرم (۲۰۰ میلی‌گرم) برگ تازه جدا شد و در هاون چینی عصاره‌گیری با ۲۰ میلی‌لیتر متانول ۹۹ درصد انجام شد و به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه عمل سانتریفیوژ انجام شد. برای اندازه‌گیری صفات بیوشیمیایی، عصاره شفاف قسمت فوقانی آن جدا شد.

کربوهیدرات محلول: برای اندازه‌گیری کربوهیدرات‌های محلول، از عصاره تهیه شده ۰/۲ میلی‌لیتر با ۳ میلی‌لیتر معرف آنترون مخلوط و در حمام آب گرم با دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفت. هر یک از نمونه‌ها پس از سرد شدن در طول موج ۶۲۰ نانومتر، میزان جذب نور آن‌ها اندازه‌گیری شد (Sadasivam and Manickam, 2008).

تعیین میزان فنل کل: میزان فنل کل با استفاده از ۰/۵ میلی‌لیتر عصاره متانولی تهیه شده با ۲/۵ میلی‌لیتر معرف فولین سیکالتو اندازه‌گیری شد (Singleton and Rossi, 1965). با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج ۷۶۵ نانومتر مقدار جذب محلول خوانده شد. برای استاندارد از اسید گالیک استفاده شد و مقدار ترکیبات فنلی کل بر اساس معادل میلی‌گرم اسیدگالیک در ۱۰۰ گرم وزن خشک محاسبه گردید.

فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل: فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل عصاره‌ها به روش فسفومولیدات DPPH آنالیز شد (Singh et al., 2002). ۰/۳ میلی‌لیتر عصاره با ۳ میلی‌لیتر معرف (سدیم فسفات ۲۸ میلی‌مولار، سولفوریک اسید ۰/۶ مولار و آمونیوم مولیدات ۴ میلی‌مولار) ترکیب شده به مدت ۹۰ دقیقه در حمام آب گرم ۹۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. میزان جذب نمونه‌ها در ۶۹۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. رسم منحنی استاندارد با استفاده از اسید آسکوربیک انجام شد. وزن خشک نمونه با فعالیت آنتی‌اکسیدان کل به صورت میلی‌گرم آسکوربیک اسید بر گرم ارزیابی شد.

میزان فلاونوئید کل: با روش آلومینیوم کلرید فلاونوئید کل سنجش شد. ابتدا ۰/۵ میلی‌لیتر از عصاره متانولی با ۱/۵ میلی‌لیتر متانول، ۰/۱ میلی‌لیتر آلومینیوم کلرید ۱۰٪ در اتانول (۱۰ گرم آلومینیوم کلرید ۱۰٪ در ۱۰۰ میلی‌لیتر اتانول و آب مقطر)، ۰/۱ میلی‌لیتر استات پتاسیم یک مولار (۴۱/۲ گرم در ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر) و ۲/۸ میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط شد. در نمونه شاهد از متانول خالص به جای عصاره متانولی، استفاده شد. مخلوط آماده شده نیم ساعت در تاریکی گذارده شد. سپس جذب آن بلافاصله در طول موج ۴۱۵ نانومتر یادداشت شد. برای استاندارد از غلظت‌های مختلف کوئرستین استفاده شد و مقدار فلاونوئیدها بر اساس mg quercetin g-1 FW مورد محاسبه قرار گرفت (Chang et al., 2002).

نشت الکترولیت برگ (Electrolyte leakage): با استفاده از روش لوتس و همکاران (Lutts et al., 1996) این آزمایش انجام شد. در این روش ابتدا قطعات برگی با اندازه ۱ سانتی‌متر آماده شد. پس از شستشوی این قطعات آن‌ها را با ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر، در داخل شیشه‌های ۵۰ میلی‌لیتری، به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی قرار گرفت. در این مرحله (EC1) به وسیله دستگاه هدایت سنج (EC متر) اندازه‌گیری میزان نشت اولیه انجام شد. سپس شیشه‌ها جهت کشته شدن سلول‌های برگی به اتوکلاو با دمای ۱۲۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه قرار گرفت. پس از سرد شدن محتویات داخل بطری‌ها، میزان نشت ثانویه (EC2) اندازه‌گیری شد. محاسبه نشت الکترولیت از طریق رابطه زیر به دست آمد.

$$EL = (EC1/EC2) \times 10$$

محتوای نسبی آب برگ (Relative Water Content): برای بررسی وضعیت آب گیاه، محاسبه محتوای نسبی آب برگ (RWC) انجام شد. ابتدا وزن تر نمونه‌های برگی تهیه شده از گیاه (FW) اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها در آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت در دمای چهار درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور شد و محاسبه وزن آماس (TW) آن‌ها، انجام شد. در نهایت نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد در آون قرار داده شد و اندازه‌گیری وزن خشک (DW) آن‌ها انجام شد (Siddique et al., 2000). برای تعیین محتوای آب نسبی برگ از فرمول ذیل استفاده شد:

$$RWC\% = [(FW-DW) / (TW-DW)] \times 100$$

محاسبه میزان پرولین: مقدار پرولین به روش ارائه شده توسط بیتس و همکاران (Bates et al. 1973) تعیین شد. جهت این ارزیابی به ۰/۵ گرم از برگ تازه و له شده ۱۰ میلی‌لیتر سولفوسالیسیک اسید سه درصد اضافه شد. لوله‌های فالكون محتوای مخلوط در ۷۵۰۰ دور به مدت ۳۰ دقیقه و دمای چهار درجه سانتی‌گراد سانتریفوژ شد و مواد اضافی از محلول جدا شد. به ۲ میلی‌لیتر از عصاره صاف شده، ۲ میلی‌لیتر اسید ناین‌هیدرین و ۲ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال اضافه شد و پس از بن ماری ۴ میلی‌لیتر تولوئن به آن اضافه و عدد جذب در طول موج ۵۲۰ نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. تجزیه و تحلیل آماری: به منظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار JMP8 استفاده شد. مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال ۱٪ و ۵٪ و رسم نمودارها توسط نرم‌افزار اکسل انجام شد.

نتایج

بررسی صفات مورفولوژیک گیاه برگ نو تحت تنش خشکی و سیلیکات پتاسیم

با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول ۲)، تمامی صفات مورفولوژیک اثرات ساده تنش خشکی و محلولپاشی در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار شد. در اثر متقابل، تمامی صفات به جز طول برگ، تعداد برگ، قطر ساقه و فاصله میانگره در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار نشان دادند.

ارتفاع، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، حجم و طول ریشه: با توجه به نتایج جدول ۳ بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار عدم تنش خشکی و محلولپاشی برگی با سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۶۸/۵ سانتی متر) در گیاه و کمترین ارتفاع گیاه در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون محلولپاشی (۲۹ سانتی متر) بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی در تیمار عدم تنش خشکی و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ به ترتیب ۳۹/۳۸ گرم و ۱۳/۲۹ گرم در گیاه و کمترین وزن تر اندام هوایی در تنش خشکی ۵۰٪ و بدون محلولپاشی (۱۰/۸۹ گرم) در گیاه حاصل شد. این در حالی است

که کمترین وزن خشک اندام هوایی در تنش خشکی ۵۰٪ و محلولپاشی ۲٪ در گیاه مشاهده شد (جدول ۳). مطابق با جدول ۳

جدول ۲. نتایج تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه برگ نو

میانگین مربعات							df	منابع تغییرات
طول ریشه	فاصله میان گره	قطر ساقه	تعداد برگ	عرض برگ	طول برگ	ارتفاع		
۲۸۹/۳۳**	۴/۷۴**	۱۵/۱۱**	۱۴۷۱۴**	۲/۴۵**	۹/۷۳**	۱۹۵۸/۱۱**	۲	خشکی
۱۹۶/۳۳*	۵/۴۱**	۷/۶۹**	۲۳۸۵**	۰/۲۵**	۲/۰۹**	۴۱۷/۶۳**	۲	سیلیکات پتاسیم
۴۹۵/۹۱**	۰/۴۴ ^{ns}	۰/۷۳ ^{ns}	۱۳۴/۴۹ ^{ns}	۰/۰۵۹*	۰/۰۲۷ ^{ns}	۱۱۴/۴۶**	۴	تنش×محلول پاشی
۴/۲۵	۰/۲۰	۰/۴۴	۹,۸	۰/۰۱	۰/۰۳۹	۳/۸۷	۲۷	خطا

ادامه جدول ۲

میانگین مربعات						df	منابع تغییرات
وزن خشک ریشه	وزن تر ریشه	وزن خشک هوایی	وزن تر هوایی	سطح برگ	حجم ریشه		
۱۰۱/۷۱**	۵۳۰/۸۸**	۹۵/۷۸**	۷۹۶/۶۱**	۸۵۱۸۵۱**	۸۹۳/۰۲**	۲	خشکی
۲۹/۱۰**	۱۶۶/۴۲**	۳۸/۱۹**	۲۵۷/۰۳**	۱۰۸۵۹۵**	۱۵۳/۰۲**	۲	سیلیکات پتاسیم
۷/۸۰**	۳۷/۱۳**	۳/۳۵۷**	۱۴۳/۵۵**	۳۴۲۱۲**	۱۵۸/۵۲**	۴	تنش×محلول پاشی
۰/۳۱	۴/۱۶	۰/۳۳	۵/۰۸	۸/۷	۱۰/۸۸	۲۷	خطا





^{ns}, * و ** به ترتیب نشانگر عدم اختلاف معنی دار و معنی دار بودن در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد می باشد.

بیشترین وزن تر و خشک ریشه گیاه در تیمار عدم تنش خشکی و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ بود. همچنین کمترین وزن تر و خشک ریشه در تنش خشکی ۵۰٪ و بدون محلولپاشی به میزان ۶/۵۶ و ۳/۵۷ گرم در گیاه بدست آمد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد بیشترین حجم ریشه در تیمار عدم تنش خشکی و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۳۷/۵ سانتیمتر مکعب) در گیاه رویت شد و کمترین حجم ریشه در تنش خشکی ۵۰٪ و بدون محلولپاشی (۹ سانتیمتر مکعب) در گیاه بود (جدول ۳). طبق جدول ۳ بیشترین طول ریشه در تنش خشکی ۵۰٪ و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۶۵/۲۵ میلی متر) در گیاه مشاهده شد و کمترین طول ریشه در تیمار عدم تنش خشکی و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۳۹ میلی متر) در گیاه ایجاد شد.

جدول ۳. مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی و محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر صفات مورفولوژیکی گیاه برگ نو

تنش خشکی	سیلیکات پتاسیم (%)	ارتفاع (cm)	عرض برگ (cm)	طول ریشه (cm)	حجم ریشه (cm ³)	سطح برگ (cm ²)	وزن تر قسمت هوایی (g)	وزن تر ریشه (g)	وزن خشک قسمت هوایی (g)	وزن خشک ریشه (g)
100%FC	۰	۴۴/۵۰ ^c	۱/۱۷۳ ^b	۴۳ ^c	۱۸ ^c	۴۴۵/۴۶ ^c	۱۸/۷۸ ^b	۱۵/۳۷ ^b	۷/۹۳ ^c	۴/۹۶ ^c
	۲	۵۵/۲۵ ^b	۱/۲۵ ^b	۵۴/۷۵ ^b	۲۳ ^b	۷۲۲/۸۹ ^b	۲۰/۱۳ ^b	۱۷/۹۵ ^b	۹/۲۳ ^b	۶/۵۲ ^b
	۴	۶۸/۵۰ ^a	۱/۶۵ ^a	۳۹ ^e	۳۷/۵ ^a	۸۳۲/۲۵ ^a	۳۹/۳۸ ^a	۲۸/۷۵ ^a	۱۳/۲۹ ^a	۱۱a
50%FC	۰	۳۲/۸۷ ^f	۰/۵۱ ^{de}	۴۱ ^d	۹/۷۵ ^{ef}	۱۹۱/۵۰ ^f	۱۱/۳۱ ^{de}	۷/۱۸ ^{de}	۴/۶۰ ^e	۱/۷۰ ^f
	۲	۳۶/۶۲ ^{de}	۰/۶۵ ^{cd}	۵۸/۷۵ ^{ab}	۱۴/۷۵ ^{cd}	۲۷۳/۲۵ ^e	۱۲/۵۹ ^{cd}	۹/۰۵ ^{cde}	۵/۲۳ ^e	۲/۹۰ ^{de}
	۴	۳۸/۲۵ ^d	۰/۸۱ ^c	۶۵/۲۵ ^a	۱۰/۷۵ ^{def}	۳۱۲ ^d	۱۳/۵۰ ^c	۱۰/۸۷ ^c	۶/۸۳ ^d	۳/۲۵ ^d
50% PRD	۰	۲۹ ^g	۰/۴ ^e	۵۵/۵ ^b	۹ ^f	۱۴۲/۷۵ ^h	۱۰/۸۹ ^{def}	۶/۵۶ ^e	۳/۵۷ ^f	۱/۵۷ ^f
	۲	۳۳/۲۵ ^f	۰/۵۵ ^{de}	۴۳ ^c	۱۴ ^{cde}	۱۶۰ ^g	۱۱/۵۰ ^{cde}	۹/۸۷ ^{cd}	۴/۷۹ ^e	۲/۱۲ ^{ef}
	۴	۳۵ ^{ef}	۰/۵۳ ^{de}	۵۷/۵ ^{ab}	۹/۲۵ ^{ef}	۱۹۵/۲۵ ^f	۱۳/۶۱ ^c	۱۱/۵۱ ^c	۶/۴۶ ^d	۳/۲۰ ^d

میانگین‌های دارای حرف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند.




شکل ۱. اثر اصلی تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم بر طول برگ و تعداد برگ گیاه برگ نو. حروف غیرمشابه روی ستون‌ها نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اختلاف بین تیمارها در سطح یک درصد است.

عرض و طول برگ، تعداد برگ، قطر ساقه، فاصله میانگره

مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد بیشترین عرض برگ در تیمار عدم تنش خشکی و محلول پاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ (۱/۶۵ سانتی متر) و کمترین عرض برگ در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون محلول‌پاشی (۰/۴ سانتی متر) در گیاه بود (جدول ۳). مطابق شکل ۱ اثرات ساده طول برگ در تیمار عدم تنش خشکی رتبه اول را به خود اختصاص داد، همچنین کاربرد سیلیکات پتاسیم ۴٪ باعث ایجاد بیشترین طول برگ شد. این در حالی است که طول برگ در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون کاربرد سیلیکات پتاسیم نسبت به سایر تیمارها کمتر بود. با توجه به نتایج شکل ۱، بیشترین تعداد برگ گیاه در تیمار عدم تنش خشکی مشاهده شد، همچنین کاربرد سیلیکات پتاسیم ۴٪ باعث ایجاد بیشترین تعداد برگ شد. کمترین تعداد برگ در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون کاربرد سیلیکات پتاسیم بود. مطابق شکل ۲ بیشترین قطر ساقه بوته در تیمار

۱۰۰٪ FC بود، همچنین گیاهان تحت تیمار با سیلیکات پتاسیم ۴٪ قطر ساقه بیشتر و گیاهان تیمار شده با تنش خشکی PRD۵۰ و بدون کاربرد سیلیکات پتاسیم قطر ساقه کمتر داشتند. در تیمار ۱۰۰٪ FC فاصله میانگره کمتر شد، همچنین کاربرد سیلیکات پتاسیم ۴٪ باعث ایجاد بیشترین فاصله میانگره شد. کمترین فاصله میانگره در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون کاربرد سیلیکات پتاسیم مشاهده شد (شکل ۲).



شکل ۲. اثر اصلی تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم بر قطر ساقه و فاصله میان گره گیاه برگ نو. حروف غیرمشابه روی ستون‌ها نشان‌دهنده معنی‌دار بودن اختلاف بین تیمارها در سطح یک درصد است.

جدول ۴. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه برگ نو

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات									
		کلروفیل a	کلروفیل b	کلروفیل کل	کاروتنوی د	آنتی اکسیدان	کربوهیدرات کل	نشست الکترولیت	محتوای نسبی رطوبت برگ	فنول کل	پرولین
تنش خشکی	۲	۲۲/۴۶**	۳/۱۱**	۲۴/۲۸**	۵/۴۵**	۷۴۴۷/۱۵**	۰/۵۲۷**	۸۵۱۳/۵۵**	۵۴۵۲/۷۱**	۱۰۹/۷۶*	۱۱/۳۵**
سیلیکات پتاسیم	۲	۲۱/۶۱**	۲۷/۵۷**	۹۷/۶۳**	۱/۳۳ ^{NS}	۲۶۶/۵۰**	۰/۰۶۵**	۳۵۵/۰۱**	۲۴۸/۱۷**	۱۳/۶۹**	۳/۱۹**
تنش × محلول پاشی	۴	۱/۷۴**	۰/۶۳*	۴/۱۲**	۱/۶۷ ^{NS}	۱۶۰/۲۳**	۰/۰۲۵**	۲۳/۷۸*	۰/۷۴ ^{NS}	۰/۶۵*	۰/۴۲*
خطا	۲۷	۰/۲۴	۰/۱۹	۰/۲۸	۰/۷۴	۲/۸۱	۰/۰۰۱	۳/۷۱	۲/۷۵	۰/۲۰	۰/۰۲

n * و ** به ترتیب نشانگر عدم اختلاف معنی دار و معنی دار بودن در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد می باشد

بررسی صفات فیزیولوژیک گیاه برگ نو تحت تنش خشکی و سیلیکات پتاسیم

همانطور که جدول تجزیه واریانس (جدول ۴) نشان می‌دهد، در تمامی صفات مورفولوژیک اثرات ساده تنش خشکی و محلولپاشی با سیلیکات پتاسیم معنی‌دار شده است. در مورد اثر متقابل تمامی صفات به غیر از محتوای آب برگ در سطح احتمال حداقل ۵٪ اختلاف معنی‌دار نشان دادند.

میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ: مقایسه میانگین‌ها نشان داد بیشترین میزان کلروفیل a مربوط به در تیمار ۱۰۰٪ FC و دو

سطح محلولپاشی ۲ و ۴٪ سیلیکات پتاسیم در گیاه بود و کمترین میزان کلروفیل a در تنش خشکی PRD۵۰ و بدون محلولپاشی در گیاه ایجاد شد (جدول ۵). مقایسه میانگین‌ها برای کلروفیل b نشان داد که کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ در تنش خشکی ۵۰ بیشترین کلروفیل b را ایجاد کرد در حالیکه کمترین کلروفیل b مربوط به تنش خشکی PRD۵۰ و بدون محلولپاشی در گیاه بود. در مورد کلروفیل کل بیشترین در تیمار تنش خشکی ۱۰۰ و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ مشاهده شد و کمترین مربوط به تنش خشکی PRD۵۰ و بدون محلولپاشی در گیاه بود.

فعالیت آنٹی‌اکسیدانی و فنل کل: با توجه به نتایج جدول ۵ بیشترین فعالیت آنٹی‌اکسیدانی در تیمارهای تنش خشکی ۵۰ و

محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۲٪ در گیاه، همچنین در تنش خشکی PRD ۵۰ و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم و در محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ ایجاد شد. این در حالی است که کمترین در سطح تنش خشکی ۱۰۰ و بدون کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم بود.

طبق نتایج جدول ۵، بیشترین فنل کل در تیمارهای تنش خشکی PRD 50 و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ در گیاه بود و

کمترین فنل کل در سطح تنش خشکی ۱۰۰ و بدون کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم بود. از دیگر سو، در شرایط تنش، سنتز فنل جهت حفظ ساختار سلولی در مقابله با استرس اکسیداتیو بهبود می‌یابد. در آزمایش حاضر با بهبود وضعیت رطوبتی خاک که تنش خشکی را برای گیاه کاهش می‌دهد کربوهیدرات‌ها و فنول برگ کاهش یافت.

کربوهیدرات کل و محتوای پرولین: مطابق جدول ۵ بیشترین کربوهیدرات در تیمارهای تنش خشکی ۵۰ و محلولپاشی

سیلیکات پتاسیم ۴٪ در گیاه، همچنین در تنش خشکی PRD ۵۰ و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم و در محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ ایجاد شد این در حالی است که کمترین در سطح تنش خشکی ۱۰۰ و بدون کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم بود.

مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد بیشترین پرولین در تیمارهای تنش خشکی PRD 50 و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم در گیاه بود و کمترین پرولین سطح تنش خشکی ۱۰۰ و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ بوده است درحالیکه تیمار ۱۰۰٪ FC و ۴٪ سیلیکات پتاسیم به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارهای پرولین را در برگ گیاه کاهش داد (جدول ۵).

محتوای نسبی آب برگ و نشت الکترولیت: با توجه به نتایج شکل ۴، با افزایش غلظت سیلیکات پتاسیم محتوای نسبی آب برگ افزایش پیدا کرده است. در بین سطوح تنش خشکی نیز تنش خشکی ۵۰ (PRD) عملکرد خوبی نداشته و کمترین میزان آب برگ در این تیمار مشاهده شد.



مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد بیشترین نشت الکترولیت در تیمارهای تنش خشکی PRD ۵۰ و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم در گیاه بود و کمترین نشت الکترولیت سطح تنش خشکی ۱۰۰ و بدون کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم بود (جدول ۵).

جدول ۵. مقایسه میانگین سطوح مختلف تنش خشکی و محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه برگ

نو

تنش خشکی (FC%)	سیلیکات پتاسیم (%)	کلروفیل a (mg/g FW)	کلروفیل b (mg/g FW)	کلروفیل کل (mg/g FW)	آنتی اکسیدان (%)	کربوهیدرات کل (mg/g FW)	نشت الکترولیت (%)	فنل کل (mg/g FW)	پرولین (mg/g FW)
	0	۷/۱۲ ^b	۳/۵۷ ^g	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۰۵ ^f	۰/۳۳ ^e	۱۹/۹۳ ^f	۲/۵۴ ^g	۱/۸۵ ^f
۱۰۰	۲	۸/۵۹ ^a	۵/۶۴ ^{de}	۱۷/۲۳ ^c	۲۳/۲۵ ^e	۰/۵۷ ^{de}	۱۷/۳۸ ^{fg}	۳/۶۰ ^f	۱/۴۶ ^g
	۴	۹/۱۰ ^a	۶/۵۷ ^{bc}	۱۵/۶۷ ^{ad}	۳۱/۷۷ ^d	۰/۶۳ ^d	۱۴/۶۸ ^g	۴/۵۸ ^e	۱/۱۰ ^h
	.	۵/۵۶ ^d	۴/۹۸ ^f	۱۰/۶۳ ^e	۵۹/۳۰ ^c	۰/۸۷ ^b	۵۶/۹۴ ^{bc}	۸/۲۲ ^c	۳/۵۵ ^b
۵۰	۲	۶/۴۰ ^c	۵/۹۸ ^{cd}	۱۲/۳۸ ^d	۶۷/۵۰ ^a	۰/۹۲ ^{ab}	۴۹/۴۷ ^d	۹/۳۰ ^b	۲/۸۶ ^d
	۴	۷/۷۵ ^b	۷/۳۸ ^a	۱۵/۱۳ ^{ab}	۶۵/۷۳ ^{ab}	۰/۹۳ ^a	۴۰/۶۶ ^e	۱۱/۱۶ ^a	۲/۲۵ ^e
	.	۳/۸۵ ^e	۳/۳۶ ^g	۷/۲۱ ^f	۶۹/۷۵ ^a	۰/۷۹ ^c	۶۵/۴۸ ^a	۶/۶۷ ^{de}	۴/۰۶ ^a
(PRD)۵۰	۲	۵/۰۳ ^{de}	۵/۲۰ ^{ef}	۱۰/۲۳ ^e	۶۰/۳۰ ^{bc}	۰/۷۶ ^c	۵۹/۹۳ ^b	۷/۱۵ ^d	۲/۷۳ ^d
	۴	۷/۷۹ ^b	۷/۰۴ ^{ab}	۱۴/۸۴ ^{bc}	۷۳/۱۲ ^a	۰/۸۹ ^{ab}	۵۳/۷۵ ^{cd}	۸/۰۸ ^c	۳/۲۲ ^c

میانگین‌های دارای حرف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند.



شکل ۴. اثر اصلی تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم بر محتوای رطوبت نسبی برگ گیاه برگ نو. حروف غیرمشترک در هر ستون بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد بیانگر اختلاف معنی دار است.

بحث

طبق نتایج بیشترین وزن بوته و تعداد برگ گیاه در تیمار عدم اعمال تنش خشکی و کاربرد سیلیکات پتاسیم ۴٪ مشاهده شد. از طرفی میزان کلروفیل در تیمار ۱۰۰٪ FC و دو سطح محلولپاشی ۲ و ۴٪ سیلیکات پتاسیم در گیاه بیشتر بود و کمترین میزان کلروفیل a و b در تنش خشکی ۵۰ PRD و بدون محلولپاشی در گیاه ایجاد شد. در واقع سلیسیوم با افزایش کلروفیل و فعالیت آنزیم روویسکو، تعداد و سطح برگ را افزایش داده و موجب بهبود فتوسنتز می‌شود. در نتیجه، مقدار کربوهیدرات و ذخایر حاصل از فتوسنتزی افزوده می‌شود (Jalilzadeh *et al.*, 2017). با افزایش کربوهیدرات درون یاخته، باعث منفی تر شدن پتانسیل اسمزی درون یاخته شده و آب به یاخته وارد می‌شود. افزایش نفوذ آب و توسعه سلول‌ها موجب افزایش وزن تر و خشک گیاه می‌گردد (O'Donoghue *et al.*, 2002). در مطالعه‌ای، کاربرد سیلیسیوم در گیاه شمعدانی، گل حنا و بنفشه شاخص کلروفیل و فتوسنتز را افزایش داد (Kamenidou and Cavis, 2008).

در مطالعه‌ای دیگر اعلام شد کاربرد سیلیکات پتاسیم موجب افزایش میزان کلروفیل در گل رز شد. از طرفی کاهش غلظت کلروفیل در نتیجه تنش خشکی می‌تواند به علت تخریب غشا تحت تأثیر تنش‌های اکسیداتیو باشد (Jalilzadeh *et al.*, 2017). تنش خشکی معمولاً از دو طریق روی فرایند فتوسنتز در گیاهان تأثیر می‌گذارد. ابتدا با بستن روزنه‌ها و جلوگیری از ورود دی‌اکسیدکربن به ساختمان برگ و ثانیاً از طریق کاهش دادن پتانسیل آب و صدمات ساختاری به اجزای فتوسنتزی گیاه (Kafi and Mahdavi

(Damghani, 2000). در شرایط تنش خشکی، از طریق سیگنال‌هایی که از ریشه به روزنه‌ها منتقل می‌شود، یا به وسیله کاهش فشار آماس در سلول‌های محافظ، روزنه‌ها بسته می‌شوند. لذا به دنبال بسته شدن روزنه‌ها، افت سریع دی‌اکسیدکربن در فضای بین سلولی رخ می‌دهد و در این شرایط ممانعت از فتوسنتز به عمل می‌آید. در شرایط شدت نوری زیاد، بدلیل اینکه تمام انرژی‌های احیاکننده که در سیستم انتقال الکترون وجود داد. بوسیله تنفس نوری نمی‌تواند مصرف شود در نتیجه رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شود و به این طریق بیشترین خسارت تنش خشکی به گیاه وارد می‌شود (Kafi and Mahdavi Damghani, 2000).

طبق مطالعات سیلیکات پتاسیم ضخامت برگ لوبلیا، اطلسی و شاهپسند را افزایش داد (Ma, 2003). سطح برگ گیاه همیشه بهار نیز با کاربرد این ماده افزایش یافت (Bayat et al., 2013). مطالعه Khyat Moghadam و همکاران (2021) با عنوان اثر سیلیکات پتاسیم و تنش خشکی بر گیاه کلزا اثرات مفید محلولپاشی این کود برای گیاه تحت تنش خشکی را تایید کردند. در گیاه سیب زمینی ترکیب آبیاری پس از ۶۰-۵۵ درصد یا ۷۵-۷۰ درصد FC و محلول پاشی ۲۰۰۰ پی پی ام سیلیکات پتاسیم مطلوب ترین تیمار محسوب شد (Abd El-Gawad et al., 2017). در برگ نو کاهش سطوح آبیاری منجر به کاهش صفات رویشی از جمله وزن تر و خشک، کاهش محتوای نسبی آب برگ و افزایش نشت الکترولیت شد (Selahvarzi et al., 2020).

در نتایج ما بر گیاه برگ نو بیشترین نشت الکترولیت در تیمار تنش خشکی PRD 50 و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم و کمترین نشت الکترولیت سطح تنش خشکی ۱۰۰ و بدون کاربرد محلولپاشی سیلیکات پتاسیم مشاهده شد. در واقع در شرایط خشکی، یکی از نخستین قسمت‌های گیاهی که آسیب می‌بیند، غشای پلاسمایی می‌باشد (Liang et al., 2003). چون در زمان خشکی، تولید و تجمع گونه‌های فعال اکسیژن، مانند رادیکال‌های سوپراکسید، هیدروژن پراکسید و رادیکال‌های هیدروکسیل افزایش می‌یابد. این ترکیبات به بسیاری از ترکیبات سلولی نظیر چربی‌ها، پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و اسیدهای نوکلئیک صدمه می‌زنند و با تغییر ساختمان غشا، در اثر پراکسیداسیون چربی‌ها و پروتئین‌ها تراوایی غشای سلولی را افزایش می‌دهند (Liang et al., 2012) که باعث نشت الکترولیت‌های موجود در داخل سلول به سمت بیرون می‌شود و در نتیجه رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطور که داده‌ها نشان داد بهبود شرایط رطوبتی بستر کاشت با کاهش سطح تنش باعث کاهش نشت الکترولیت گیاهان شد مقادیر نشت یونی از سلول‌های برگ در سطوح رطوبتی پایین بیشتر اتفاق می‌افتد (Inze, & Montagu, 2000). شرایط تنش باعث کنترل فعالیت‌های آنزیمی مداخله گر در سنتز پلی فنول‌ها شده و موجب مهار موثر رادیکال‌های سمی می‌شوند و بهبود رشد گیاه را به

با توجه به نتایج جدول ۵ بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانتی در تیمارهای تنش خشکی ۵۰ و محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۲٪ در گیاه، همچنین در تنش خشکی PRD ۵۰ و بدون محلولپاشی سیلیکات پتاسیم و در محلولپاشی سیلیکات پتاسیم ۴٪ ایجاد شد. تاثیر سیلیکون بر فعالیت آنتی‌اکسیدانت های آنزیمی و غیر آنزیمی در رقم اسفناج تحت تنش خشکی مورد آزمایش قرار گرفت (Gunes et al., 2007). نتایج نشان داد که در بعضی ارقام فعالیت آنزیم SOD کاهش و در برخی دیگر افزایش یافت، درحالیکه در پژوهش آن‌ها فعالیت آنزیم مذکور در تیمار سیلیکون در تمام ارقام افزایش نشان داد. آنان همچنین اعلام کردند که تحت تنش خشکی فعالیت آنزیم CAT به صورت معنی داری کاهش می‌یابد در صورتیکه کاربرد سیلیکون منجر به افزایش فعالیت این آنزیم در برخی ارقام اسفناج شد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها: نتایج نشان داد ۵۰٪ PRD نسبت به تنش ۵۰٪ FC رشد بهینه گیاه را مختل کرده اما در ترکیب با

محلول پاشی سیلیکات پتاسیم رشد و بقای گیاه بهبود یافت. اما بالاترین محتوای آب برگ و کلروفیل و کمترین کاروتنوئید، فنول کل، کربوهیدرات برگ و پرولین برگ که نشان دهنده پایداری فیزیولوژیکی گیاه را در شرایط تنش است در تیمار ۱۰۰٪ FC و سطح محلولپاشی ۴٪ سیلیکات قابل رویت بود. فراهم کردن رطوبت مناسب بستر کشت همراه با کاربرد سیلیکات پتاسیم می‌تواند گیاهانی با کیفیت، ویژگی‌های زیبایی‌شناسی مطلوب و مصرف بهینه آب ایجاد کند. پس بر اساس نتایج این آزمایش کاشت گیاه برگ نو در شرایط کم آبی توصیه می‌شود اما در صورتی که میزان آب کافی جهت آبیاری موجود نباشد می‌توان تا ۵۰٪ ظرفیت زراعی گیاه را آبیاری کرد و برای بهبود وضعیت گیاه از محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بهره برد.

سپاسگزاری: در انجام این پژوهش، حمایت مالی خاصی از مؤسسات عمومی، صنعتی و غیرانتفاعی دریافت نشده است.

تضاد منافع: نویسندگان مقاله اذعان دارند هیچ‌گونه تضاد منافی با شخص، شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند.

- Abd El-Gawad, HG, Nashwa, AI, Abu El-Azm, Hika. M. S. (2017). Effect of Potassium Silicate on Tuber Yield and Biochemical Constituents of Potato Plants Grown Under Drought Stress Conditions. *Middle East Journal of Agriculture Research*. 6 (3):718-731.
- Ahmadi, SH., Andersen, MN, Plauborg, F., Poulsen, RT., Jensen, CR., Sepaskhah AR, & Hansen S. (2010). Effects of irrigation strategies and soils on field grown potatoes: Gas exchange and xylem [ABA]. *Agricultural Water Management*, 97: 1486-1494.
- Arnon, DI. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology*; 24: 1-15. <https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1>
- Bates, LS, Waldern, RP, & Teave, ID. (1973). Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil*, 39:205-207. 10.1007/BF00018060Corpus ID: 8693238
- Bayat, H., Alirezaie, M., Neamati, H, & Saadabad, A. (2013). Effect of silicon on growth and ornamental traits of salt-stressed calendula (*Calendula officinalis* L.). *Journal of Ornamental Plants*, 4: 207-214.
- Broadly, M., Brown, P., Cakmak, I., Ma, J.F., Rengel, Z. & Zhao, F., ed. (2012). Beneficial element in: Marschner, s Mineral Nutrition of Higher Plants Springer -Verlag, P Marschner ed. t. Edn. pp. 249-261.
- Chang, C., Yang M., Wen, H. & Chern J. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. *Food and Drug Analysis*, 10: 178-182. <https://doi.org/10.38212/2224-6614.2748>.
- Donoghue, EM, Somefield S.D. & Heyes J.A. (2002). Vase solution containing sucrose result in changes to cell walls of sandersonia (*Sandersonia aurantica*) flowers. *Postharvest Biology and Technology*, 26: 285-294. 10.1016/S0925-5214(02)00045-5
- English, MJ, Musick, JT., & Murty, VV N. (1990). Deficit irrigation. In: Management of farm irrigation systems (Hoffman, G.J., Howell, T.A., and Solomon, K.H., Editors). ASAE Monograph no. 9. American Society of Agricultural Engineers publisher, 1020p.
- FAO. (2002). Deficit Irrigation Practices. Water Reports No. 22. Rome.
- Farahani, H., Sajedi, NA., Madani, H., Changizi, M., & Naeini, MR. 2020. Physiological and biochemical responses of Damask rose (*Rosa damascena* Miller) to potassium silicate application under water deficit stress. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 48(3), 1560-1572. 10.15835/nbha48311808
- Feyzi, M., Jafari, A. & Ahmadi, H. (2014). The Effect of Operation and Engine Speed on Chainsaw Vibration. *Journal of Agricultural Machinery*. 6(1): 90-101.
- Ghanadzadeh, M.A., Farid Hsseini A., Hossein pouran S., & eghbali H. 2015. Evaluation of water supply and wastewater sources for irrigation, National Irrigation and Drainage Congress of Iran
- Ghasemi, Z. (2014). Effect of irrigation with refined and unrefined municipal wastewater on growth indices and heavy metal accumulation in rosemary and tron species. M.Sc. thesis, Department of Environment, Yazd University.
- Gong HZ, Chen K, Wang S and Zhang C (2005) Silicon alleviates oxidative damage of wheat plants in pots under drought. *Plant Science*. 169(2): 313-321.
- Gunes, A., et al., (2007). Silicon mediates changes to some physiological and enzymatic parameters symptomatic for oxidative stress in spinach (*Spinacia oleracea* L.) grown under B toxicity. *Scientia Horticulturae*, 2007. 113(2): p. 113-119. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.03.009>.

- Haji Boland, R. (2013). Investigating the effect of silicon on the growth and tolerance of stresses in tobacco plants. Master's thesis. Tabriz University.(In persian)
- Hattori, T., et al., (2007). Short term stomatal responses to light intensity changes and osmotic stress in sorghum seedlings raised with and without silicon. *Environmental and Experimental Botany*, 60(2): p. 177-182. 10.1016/J.ENVEXPBOT.2006.10.004
- Inze, D., & Montagu, M.V. (2000). Oxidative stress in plants. Cornwall Great Britain.
- Jalilzadeh, E., Jabarzadeh, Z. & Nowrozi, P. (2017). The effect of foliar spraying with different sources and concentrations of silicon on some morphological and physiological characteristics of the Beverly Watson rose plant. *Science and technology of greenhouse culture*. 9(3):65-77.(In persian)
- Kafi M., Mahdavi Damghani M.A. 2000. Mechanisms of plant resistance to environmental stresses. Ferdowsi University of Mashhad Publications
- Kamenidou, S. and T.J. Cavis. 2008. Silicon supplements affect horticultural traits of greenhouse produced ornamental sunflowers. *Horticulture Science*, 43(1): 236-239. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.1.236>
- Karimi Moridani, M. (2014). Importance of potassium in paddy soil fertility. Quarterly journal of Nazan *Engineering and Natural Resources of Agriculture*. 12(44):33-39. (In Persian)
- Khayat Moghadam, M., Gholami A., Shirani rad, A.H. Baradaran Firoozabadi, M., & Abbasdokht, H. (2021). The effect of Potassium Silicate and Late-Season Drought Stress on the Physiological Characters of Canola. *Journal of Crop Improvement*, 23(4):561-576.(In persian)
- Liang, Y., Chen, Q., Liu, Q., Zhang, W. & Ding, R. (2003). Exogenous silicone (Si) increases antioxidant enzyme activity and reduces lipid peroxidation in roots of salt-stressed barley (*Hordeum vulgare* L.). *Journal of Plant Physiology*, 160: 1157-1164. 10.1078/0176-1617-01065.
- Lutts, S., Kinet, JM. & Bouharmont, J. (1996). NaCl-induced senescence in leaves of rice (*Oryza sativa* L.) cultivars differing in salinity resistance. *Annals of Botany*, 78: 389-398. <https://doi.org/10.1006/anbo.1996.0134>
- Ma, JF. 2003. Function of silicon in higher plants. *Progress in Molecular and Subcellular Biology*, 33: 127-147.
- Mehrgan, B., Mousavi Fard, S. & Rezaei Nejad, A. H. (2017). Effect of potassium silicate application on some morphological, physiological and biochemical characteristics of *Alternanthera repens* L. under drought stress. *Crop Improvement*, 1(20): 314-299. (In persian)
- Qanadzadeh, M. A., Faridhosseini, A., Hossein Puran, S., & Iqbali, H. (2014). Water, Irrigation and Productivity: Evaluation of Water and Wastewater Supply Sources for Irrigation (Case Study of Green Space of Mashhad. Conference: National Congress of Irrigation and Drainage of Iran. (In Persian)
- Rabbani, M., & Kazemi, F. (2015) Investigating strategies for optimum water usage in green spaces covered with lawn. *Desert*. 20(2): 217-230.
- Sadasivam, S., & Manickam, A. (2008). Biochemical Methods New Age International (P) Limited. New Delhi: 4-10
- Samieiani, E., Ansari, H., Azizi, M., S.M. Hashemi nia. & Selahvarzi, Y. (2017). The effect of drought stress on some biochemical traits in four species of cover plants (*Lolium Perne* grass, *Patentilla*, White Clover and *Frankinia*) with the ability to be used in green spaces. *Soil and Plant Intraction*, 4(15): 101-109.

- Saud, S., Yajun, C., Fahad, S., Hussain, S., Na, L., Xin, L., & Alhussien, S. AAFE. (2016). Silicate application increases the photosynthesis and its associated metabolic activities in Kentucky bluegrass under drought stress and post-drought recovery. *Environmental Science and Pollution Research*, 23(17), 17647-17655. 10.1007/s11356-016-6957-x
- Savić, S., Stikić, R., Radović, BV. Bogičević, B., Jovanovic, Z., & Šukalović, VHT. (2008). Comparative effects of regulated deficit irrigation (RDI) and partial root-zone drying (PRD) on growth and cell wall peroxidase activity in tomato fruits. *Scientia Horticulturae*, 117(1), 15-20. 10.1016/j.scienta.2008.03.009
- Selahvarzi, Y. Sarfaraz, S., Zabihi, M., & Kamali, M. 2020. Study on the Effect of Zeolite and Soil Texture on Quantitative and Qualitative Characteristics of *Ligustrum vulgare* in Different Irrigation Levels. *Journal of Horticultural Science*, 34 (3):451-463. (In Persian)
- Setayesh, R., Kafi, M., Nabati, J. (2017). Determining the drought stress tolerance threshold of ornamental barberry shrub in the weather conditions of Mashhad. *Journal of Horticultural Science*, 30(4):714-722.
- Siddique, MRB, Hamid, A., & Islam, MS. (2000). Drought stress effects on water relations of wheat. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*, 41:35-39.
- Singh, RP, Murthy, KNC, & Jayaprakasha, GK. (2002). Studies on the antioxidant activity of pomegranate (*Punica granatum*) peel and seed extracts using in vitro models. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50, 81-86. 10.1021/jf010865b.
- Singleton, VL. & Rossi, JA. (1965). Colorimetry of total phenolic with phosphomolybdic and phosphotungstic acid reagent. *American Journal of Enology and Viticulture*, 16: 144-158
- Starr, F., Starr, K., & Loope, L. (2003). *Ligustrum* spp. OVERVIEW. United States Geological Survey-Biological Resources Division. Haleakala Field Station, Maui, Hawaii
- Tabatabai, J. Fatemi, L. & Falahi E. (2018). The effect of silicon on the growth and performance of strawberry plants under salinity stress conditions. *Journal of Horticultural Sciences*. 23(1): 88-95. (In Persian)

Effect of irrigation (SDI and PRD techniques) and foliar application with potassium silicate in
Ligustrum vulgare L.

Abstract

Today, drought stress is one of the limiting factors for the development of green space. One of the solutions to reduce the effects of drought stress for plants is the application of potassium silicate foliar applications. In order to investigate the reduction of the adverse effects of low irrigation with the use of potassium silicate on *ligustrum vulgare* L in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design in 4 replications in 2021–2022. Experiment in the form of pot cultivation in 3 levels of low irrigation (control (100% agricultural capacity), 50% agricultural capacity (SDI), 50% agricultural capacity with PRD technique) and 3 levels of foliar spraying with potassium silicate (0, 2 and 4%) was done in 4 repetitions. According to the results, the highest plant height was related to the treatment of no drought stress and foliar spraying with 4% potassium silicate (68.5 cm), and the lowest plant height was in the drought stress of 50 PRD and without foliar spraying (29 cm). The highest antioxidant activity was in 50% drought stress + 2% potassium silicate (67%), also in PRD 50, without potassium silicate (69%), and in 4% potassium silicate foliar spraying (72%). The highest amount of total phenol was 11.16 mg/gfw (11.16 mg/gfw) in PRD 50 and potassium silicate 4%. Total carbohydrates in 50% drought stress + 4% potassium silicate (0.93 mg/g fw) and proline in PRD 50, without potassium silicate foliar application (4.06 mg/g fw) were higher than other treatments. The results showed that drought stress with 50% FC with PRD technique interfered with optimal plant growth compared to drought stress with 50% FC, but in combination with potassium silicate foliar application, plant growth and survival improved. Based on the results of this experiment, in the irrigation treatment with 50% FC, the condition of the plant improved with potassium silicate foliar application.

Keywords: carbohydrate, drought stress, foliar spraying, hedge plant, total phenol