

بررسی تأثیر کمپوست‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گشنیز

آرزو هاشمی^۱، حسینعلی اسدی قارنه^۲

۱ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

۲ دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

* ایمیل نویسنده مسئول: h.asadi@khuisf.ac.ir

چکیده

استفاده از کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای رشد بهینه گیاه می‌تواند اثرات مطلوبی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه داشته باشد. در مطالعه حاضر، تأثیر کمپوست‌های مختلف بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و اسانس گیاه گشنیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) واقع در روستای خاتون‌آباد در سال ۱۴۰۰ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ۱۶ تیمار (شاهد، کمپوست ترکیبی از گیاهان دارویی (۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم در مترمربع)، کمپوست نیشکر (۲، ۴ و ۶ کیلوگرم در مترمربع)، کمپوست شیرین‌بیان (۱، ۲ و ۳ کیلوگرم در مترمربع)، کمپوست نخیلات (۲، ۴ و ۶ کیلوگرم در مترمربع) و کمپوست ضایعات گل محمدی (۴، ۵ و ۶ کیلوگرم در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد سطح ۶ کیلوگرم در مترمربع کمپوست نیشکر بهترین نتیجه را در بین سایر تیمارهای کودی در بیشتر صفات نشان داد. ارتفاع بوته (۹۵/۵۲ سانتی‌متر) و سطح برگ (۵۳۱/۰ میلی‌مترمربع) با کاربرد کمپوست شیرین‌بیان ۳ کیلوگرم در مترمربع بیش از سایر تیمارها بود. بیشترین میزان اسانس (۲۹ درصد)، محتوای کلروفیل کل (۱/۴۶ میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ) و ترکیبات فنلی (۳۴۸ میلی‌گرم در گرم) با کاربرد ۶ کیلوگرم در مترمربع کمپوست نیشکر به دست آمد. لینالول مهم‌ترین ترکیب موجود در اسانس گشنیز در همه تیمارهای مورد استفاده بود. می‌توان نتیجه گرفت کاربرد کمپوست نیشکر و شیرین‌بیان با بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک منجر به بهبود رشدی و صفات کیفی گشنیز شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: ترکیبات فنلی، درصد اسانس، شیرین‌بیان، کمپوست نیشکر، گیاهان دارویی.

مقدمه

گشنیز (*Coriandrum sativum*) یکی از مهم‌ترین گیاهان ادویه‌ای و دارویی از خانواده چتریان (Apiaceae) است. این گیاه یک ساله و محصول فصل خنک است. می‌توان آن را در انواع خاک کشت کرد و خاک سبک، با زهکشی خوب، مرطوب و لومی را ترجیح می‌دهد (Bhat et al., 2014). این گیاه مقدار قابل توجهی فیبر غذایی، کلسیم، سلنیوم، آهن، منیزیم و منگنز در هر ۱۰۰ گرم را فراهم می‌کند. تمام قسمت‌های گیاه به عنوان غذا اما به شکل تازه استفاده می‌شود. از دانه‌ها در دستورالعمل‌های مختلف آشپزی استفاده می‌شود (Ahmad et al., 2017). درحقیقت گیاهان دارویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و باید در تحقیقات به نیازهای آن‌ها توجه شود (Zebarjadi et al., 2018; Keshvari et al., 2018; Ghorbani et al., 2020). یکی از الزامات این گیاهان توجه به مواد مغذی مورد نیاز آن‌ها است (Mohammadi et al., 2015).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

هزینه کود معدنی روز به روز در حال افزایش است و این راه‌کاری است برای کشاورز که به سمت کود آلی سوق پیدا کند (Almasi, 2021). بنابراین، کودهای آلی اثرات مثبتی دارند و به پایداری حاصلخیزی خاک و عملکرد کشاورزی کمک می‌کنند. از بین کودهای آلی، کمپوست به عنوان اصلاح‌کننده خاک مورد توجه قرار گرفته است (Benabderrahim et al., 2018). کمپوست در نتیجه تجزیه بیولوژیک ضایعات آلی توسط ریزجانداران مختلف در شرایط کنترل‌شده است (Ghaffari et al., 2022).

انباشته‌شدن مواد زائد کشاورزی و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن‌ها ایجاب می‌کند که این مواد به نحو مطلوب و آگاهانه در چرخه حیات قرار گیرند. یکی از راه‌کارهای مهم بازیافت مواد زائد، استفاده از آن‌ها در کشاورزی به‌ویژه به‌صورت کمپوست می‌باشد. کمپوست نمودن ضایعات باغبانی یکی از بهترین روش‌ها برای بهبود خواص و استفاده دوباره از این ضایعات در چرخه تولید می‌باشد.

نخل خرما (*Phoenix dactylifera L.*) یکی از درختان میوه مهم مناطق گرمسیری است. مقادیر زیادی ضایعات نخل که در هر فصل تولید می‌شود، هزینه‌های زیادی را برای کشاورزانی که همیشه در تلاش برای سوزاندن یا انتقال آن‌ها به خارج از منطقه هستند، ایجاد می‌کند. بنابراین، کمپوست‌سازی می‌تواند یک روش اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجه برای کاهش ضایعات نخل خرما باشد (Benabderrahim et al., 2018). با توجه به مشاهدات Ali (۲۰۰۸)، کمپوست برگ خرما باعث افزایش جوانه‌زنی و رشد چهار گیاه زینتی شاه‌اشرفی (*Cosmos bipinnatus*)، کوبک کوهی (*Dahlia variabilis*)، گل جعفری (*Tagetes erecta*) و گل آهار (*Zinnia elegans*) می‌شود.

یکی از کودهای کمپوست که در استان خوزستان به مقدار زیاد تولید می‌شود، کود کمپوست بقایای نیشکر می‌باشد. در حدود ۶۴ درصد وزن خشک بقایای نیشکر حاوی مواد آلی، فسفات و پروتئین به همراه مواد غیرقندی می‌باشد (Marinari et al., 2000). کمپوست تولیدشده از بقایای نیشکر حاوی مواد مغذی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و ریزمغذی‌ها و سایر مواد آلی مورد نیاز برای رشد گیاه می‌باشد (Chattha et al., 2019).

نیاز مداوم به جستجوی منابع طبیعی جایگزین امن برای مواد مغذی گیاهی وجود دارد. بسترهای طبیعی یکی از این جایگزین‌ها هستند و برای اطمینان از تأثیر آن‌ها بر رشد و بهره‌وری محصول مورد بررسی قرار می‌گیرند (Phiri, 2010). یکی از پسماندهای آلی، پسماند کارگاه‌های فرآوری گیاه دارویی شیرین‌بیان می‌باشد. ریشه شیرین‌بیان حاوی ترکیباتی از جمله گلاسیسیریزین، ساپونین، آسپاراژین، قندهای گلوکز و ساکارز، لیکوگورین، کومارین (Moaveni, 2009) و عناصر معدنی فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی و همچنین حاوی اسید موالونیک است که در سنتز جیبرلین‌ها استفاده می‌شود (Abd El-Azim et al., 2017). بنابراین با تهیه کمپوست از این ترکیب، می‌توان از آن به‌عنوان بستر کشت یا کود آلی برای گیاهان استفاده کرد (جوانبخت و همکاران، ۱۴۰۱).

گل رز از گیاهان معطر قابل توجهی است که به دلیل تقاضای بالا، نیاز به عطر و خوشبوکننده و استفاده از آن‌ها در پزشکی در سراسر جهان رشد می‌کند. مزارع زیادی تحت کشت این گیاه است. ضایعات تولیدشده از این مزارع ممکن است از فرآیندهای تقطیر روغن صنعتی و همچنین پیرایش بوته‌های گل رز کشاورزی حاصل شود (Shawl and Adams, 2009). مقدار بسیار کمی از بوته‌ها برای تکثیر رویشی استفاده می‌شود، اما اکثریت قریب به اتفاق خشک و سوزانده

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

می‌شود و خطرات بهداشتی برای جمعیت‌های اطراف و همچنین مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا و خاک ایجاد می‌کند (Pal, 2013). علاوه بر این، تعداد زیادی گل رز باید برای تولید مقدار کمی گلاب استفاده شود و این روش مقدار قابل توجهی زباله نیمه‌جامد ایجاد می‌کند که می‌تواند محیط را آلوده کند (Rabbani et al., 2016). به همین دلیل استفاده از زباله‌های آن در جهت تولید کمپوست می‌تواند راه‌کاری مناسب در کاهش این آلودگی باشد، از سوی دیگر کمپوست ضایعات گل رز به دلیل داشتن مواد مغذی می‌تواند در رشد گیاه موثر باشد (Galal et al., 2022).

گروه دیگر از بقایای آلی که در کشور ما در مقادیر بالا تولید می‌شود، بقایای گیاهان دارویی است. در بخش تولید و جمع‌آوری گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای، در حین فرآوری، مقدار قابل توجهی زباله‌های زیستی تولید می‌شود (Filipović and Ugrenović, 2013). کمپوست گیاهان دارویی جدا از استفاده اولیه آن به‌عنوان کود آلی، به‌عنوان تقویت‌کننده ساختار و ویژگی‌های شیمیایی-زراعی خاک، مواد خام برای تولید زیرلایه‌ها و مالچ استفاده می‌شود (Filipović and Ugrenović, 2013). در تحقیق Inam-ul-Haq و همکاران (۲۰۱۰)، کمپوست گیاهان دارویی که دارای اثر ضد میکروبی بود، برای کمپوست مورد استفاده در تولید قارچ مطلوب بود. محمودی (۱۳۹۵) در مطالعه خود نشان داد کمپوست بقایای نعنای دارای مقدار قابل توجهی هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد کربن آلی، درصد نیتروژن کل، پتاسیم، آهن و روی قابل جذب بود که تأثیر چشم‌گیری بر رشد گیاه ذرت (*Zea mays*) داشت.

با توجه به اهمیت روزافزون گیاهان دارویی و ضرورت بر افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تیمار انواع کمپوست‌های ارگانیک شامل کمپوست ضایعات نیشکر، کمپوست ضایعات نخیلان، کمپوست ضایعات گل محمدی، کمپوست ترکیبی از گیاهان دارویی و همچنین کمپوست ضایعات شیرین بیان بر صفات رشدی گیاه دارویی گشنیز و میزان و ترکیبات اسانس آن صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۴۰۰ در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) واقع در روستای خاتون‌آباد با عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۴۸ دقیقه شرقی اجرا شد. ارتفاع مزرعه از سطح دریا ۱۵۵۵ متر و اقلیم منطقه بر اساس طبقه‌بندی کوپن، خشک و بسیار گرم با تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های نیمه‌سرد می‌باشد. میانگین درازمدت بارندگی و درجه حرارت سالیانه به ترتیب ۱۲۰ میلی‌متر و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود. این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارهای مورد مطالعه شامل تیمار شاهد، کمپوست گیاهان دارویی (ترکیبی از بومادران، بابونه، آویشن باغی و نعنای) به میزان ۵، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم در مترمربع، کمپوست نیشکر (۲، ۴ و ۶ کیلوگرم در مترمربع)، کمپوست شیرین بیان (۱، ۲ و ۳ کیلوگرم در مترمربع)، کمپوست نخیلان (شامل برگ درخت خرما) (۲، ۴ و ۶ کیلوگرم در مترمربع) و کمپوست ضایعات گل محمدی (شامل سرشاخه‌ها و ساقه گل) به میزان ۴، ۵ و ۶ کیلوگرم در مترمربع) بود. خصوصیات کمپوست‌های مورد استفاده در جدول ۱ ذکر شده است.

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

برای تهیه کمپوست ترکیبات مختلف، ابتدا ضایعات نیشکر، گل محمدی، نخیلات، شیرین بیان و ترکیب گیاهان دارویی به صورت جداگانه در اندازه‌های ۲-۴ سانتی‌متر خرد و مرطوب شدند و سپس در جعبه‌های چوبی منافذدار با ابعاد ۱×۱×۱ متر ریخته شدند. منافذ موجود در این جعبه‌ها، اکسیژن مورد نیاز برای فعالیت میکروارگانیسم‌ها را تأمین می‌کند. برای کنترل دما، تأمین اکسیژن و تسریع در فرآیند تخمیر، هوادهی هر دو روز یکبار به صورت دستی صورت گرفت. در موقع به هم زدن، اگر رطوبت کم بود، مقداری آب در محل‌های خشک ریخته شد. این فرآیند طی پنج هفته صورت گرفت. روش تهیه کمپوست با توجه به شرایط و امکانات، ترکیبی از روش کمپوست‌سازی گرم و سریع برکلی و دانشگاه داکوتای شمالی انجام گرفت (Heiskanen, 1993).

جدول ۱. ویژگی‌های کمپوست‌های مورد مطالعه

نوع کمپوست	EC dS m ⁻¹	pH	C/N	آهن	روی	نیترژن	فسفر	پتاسیم
						میلی‌گرم بر کیلوگرم		
ترکیب گیاهان دارویی	۳/۹	۷	۱۴	۱۰	۳۷۰	۱/۹	۰/۹	۱
گل محمدی	۲/۴	۶/۵	۱۲	۸	۲۵۰	۲/۲	۰/۸	۱
نیشکر	۲/۸	۷/۵	۱۷	۶	۲۸۰	۲/۱	۱	۰/۹
شیرین بیان	۴/۲	۷	۱۵	۷	۳۵۰	۲	۱/۱	۰/۹
نخیلات	۳/۵	۵/۵	۱۲	۹	۳۲۰	۱/۷	۱	۰/۸

قبل از اجرای آزمایش به منظور تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش، به صورت تصادفی از شش نقطه زمین به عمق ۰ تا ۳۰ سانتی‌متری خاک به عنوان عمق نفوذ ریشه، نمونه برداری شد و پس از تهیه نمونه مرکب به میزان یک کیلوگرم به آزمایشگاه تجزیه خاک ارسال گردید. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول ۲ ذکر شده است.

جدول ۲. برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش

بافت خاک	آهک	گچ	کربن آلی	ازت کل	فسفر قابل جذب	پتاسیم قابل جذب	شن	سیلت	رس
			میلی‌گرم بر کیلوگرم			درصد			
لوم رس سیلتی	۴۳	۰/۰۸	۰/۵۷	۰/۰۶۱	۵۸	۵۱۰	۳۷	۱۱	۵۲

در این آزمایش ابعاد هر کرت ۲×۲ متر بود و بذرها در فاصله ۲۵ سانتی‌متری در فصل بهار سال ۱۴۰۰ کشت شدند. خاک مزرعه قبل از کشت، با تیمارهای مذکور به صورت کامل مخلوط شد و سپس کشت بذرها صورت گرفت. بذر

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

گیاه گشنیز از توده‌های بومی ایران و از شهر نهاوند همدان خریداری شد. عمق کشت بذر ۴ تا ۵ سانتی‌متر بود. بذر گیاهان در تیمارهای مختلف، در هنگام رسیدن کامل بذر (۳ ماه پس از کاشت) برداشت و برای اندازه‌گیری اسانس مورد استفاده قرار گرفت. صفات رشدی و بیوشیمیایی برگ‌ها نیز در زمان گل‌دهی اندازه‌گیری شدند.

صفات مورد ارزیابی

ارتفاع بوته: ارتفاع بوته‌های گشنیز از سطح خاک تا نقطه انتهایی توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.

تعداد و سطح برگ: در پایان آزمایش تعداد برگ‌ها در هر بوته شمارش و سطح برگ توسط دستگاه سطح‌سنج برگ (مدل Leaf area meter, SE203C) اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری وزن تر و خشک اندام هوایی

جهت ارزیابی وزن تر و خشک اندام هوایی گشنیز پس از پایان دوره آزمایش، گیاهان از هر تیمار برداشت و با استفاده از ترازوی دیجیتال، وزن تر آن‌ها اندازه‌گیری شد. جهت بررسی وزن خشک گیاهان، نمونه‌های گیاهی در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت نگهداری و خشک گردید، سپس در مرحله آخر توسط ترازوی دیجیتال وزن خشک آن‌ها ارزیابی شد.

محتوای کلروفیل و کاروتنوئید

جهت سنجش محتوای کلروفیل از برگ‌های سوم و چهارم انتهایی هر گیاه به‌عنوان جوان‌ترین برگ‌های فتوسنتزکننده، استفاده شد. برای این منظور، ۰/۱ گرم از بافت تازه برگ با ۱۰ میلی‌لیتر استون ۸۰ درصد به تدریج ساییده شد. سپس جذب نوری محلول رویی در طول موج‌های ۶۶۳، ۶۴۵ و ۴۷۰ نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر (D 6320) قرائت شد. برای محاسبه مقدار کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید (بر حسب میلی‌گرم بر گرم بافت تازه برگ) از روابط زیر استفاده شد (Lichtenhaler, 1987).

$$\text{a کلروفیل (mg g}^{-1}\text{)} = (12.7 \times \text{abs}_{663}) - (2.6 \times \text{abs}_{646}) \text{ mL acetone/mg}$$

$$\text{b کلروفیل (mg g}^{-1}\text{)} = (22.9 \times \text{abs}_{646}) - (4.68 \times \text{abs}_{663}) \text{ mL acetone/mg}$$

$$\text{کلروفیل کل (mg g}^{-1}\text{)} = (\text{Chl a}) + (\text{Chl b})$$

$$\text{کاروتنوئید (mg g}^{-1}\text{)} = (1000 \times \text{abs}_{470}) - (1.9 \times \text{abs}_{663}) - (63.14 \times \text{abs}_{646}) / 214$$

سنجش ترکیبات فنولی برگ

مقدار کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره گیاهی بر اساس روش Singleton و Slinkard (۱۹۷۷) اندازه‌گیری شد. بدین منظور به ۰/۵ میلی‌لیتر از عصاره‌های مختلف رقیق شده (۰/۱۰ گرم در ۱۰ میلی‌لیتر متانول ۸۰ درصد) مقدار ۲/۵

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

میلی‌لیتر از محلول فولین سیوکالتو ۱۰ درصد اضافه و پس از ۵ دقیقه مقدار ۲ میلی‌لیتر از کربنات سدیم ۷/۵ درصد افزوده شد. پس از ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق جذب نمونه‌ها در مقابل محلول کنترل متانول در طول موج ۷۶۵ نانومتر قرائت گردید. هم‌زمان با انجام آزمایش رقت‌های مختلف اسید تانیک تهیه و مانند روش فوق آزمایش و منحنی استاندارد تهیه شد. جذب نمونه‌های با منحنی استاندارد مقایسه و مقدار فنل کل هر عصاره بر حسب میلی‌گرم در هر گرم عصاره خشک محاسبه شد (افشاری و رحیم‌ملک، ۱۳۹۶).

درصد اسانس بذر

در هنگام رسیدگی کامل بذرها، جهت اندازه‌گیری درصد اسانس، مقدار ۱۰۰ گرم بذر گشنیز خشک‌شده از هر تیمار پس از آسیاب شدن با دو سوم آب بالن به دستگاه کلونجر که اساس کار تقطیر آبی است، منتقل شد و به مدت ۳ ساعت عمل استخراج انجام شد (Sefidkon, 2001).

ترکیبات اسانس

شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) انجام شد. پس از تزریق اسانس به دستگاه گازکروماتوگراف (GC) و یافتن مناسب‌ترین برنامه‌ریزی حرارتی ستون، جهت دستیابی به بهترین جداسازی، اسانس‌های حاصله با دی‌کلرو متان رقیق شده و به دستگاه گازکروماتوگراف کوپل شده با طیف‌سنج جرمی (GC/MS) تزریق و طیف‌های جرمی و کروماتوگرام‌های مربوطه بدست آمد. سپس شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از زمان بازداری، شاخص بازداری کوآتس، مطالعه طیف‌های جرمی و مقایسه با ترکیب‌های استاندارد و اطلاعات کتابخانه (Wiley, Adams, 2007)، صورت گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های به دست آمده به وسیله نرم‌افزار آماری SAS (v. 9,2) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین تیمارها، با آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک برگ، سطح و تعداد برگ، محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ، ترکیبات فنولی برگ و درصد اسانس بذر نشان داد تمامی صفات به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمار کمپوست (ترکیب گیاهان دارویی، نیشکر، شیرین‌بیان، نخيلات جنوب و ضایعات گل محمدی) در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند (جدول ۳ و ۴).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

جدول ۳. نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر برخی از ویژگی‌های رشدی گیاه گشنیز

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات			
		ارتفاع بوته	وزن تر	وزن خشک	سطح برگ
بلوک	۲	۱۲۲۵**	۲۸۶/۸**	۱۶/۰۰**	۱۵۶۲۵**
تیمار	۱۵	۲۹۶/۶**	۲۹۰/۵**	۳/۹۰**	۲۳۲۶۷**
خطا	۳۲	۸/۳۳	۴/۵۶	۰/۱۰	۱۳۱/۷
ضریب تغییرات (%)		۳/۶۱	۴/۷۹	۴/۵۹	۴/۱۶
					۱/۲۶

** معنی دار شدن در سطح آماری ۱ درصد.

جدول ۴. نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، ترکیبات فنولیک برگ و درصد اسانس بذر گیاه گشنیز

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات			
		کلروفیل a	کلروفیل b	کلروفیل کل	کاروتنوئید
بلوک	۲	۰/۰۷**	۰/۰۱**	۰/۱۳**	۰/۰۰۹**
تیمار	۱۵	۰/۱۵۰**	۰/۰۳۸**	۰/۱۹۰**	۰/۰۱۲**
خطا	۳۲	۰/۰۰۳	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۹
ضریب تغییرات (%)		۸/۳۸	۳/۲۸	۶/۱۹	۵/۶۱
					۵/۹۱
					۲/۵۰

** معنی دار شدن در سطح آماری ۱ درصد.

مقایسه میانگین صفت ارتفاع بوته تحت تیمار کمپوست‌های گیاهی مختلف نشان داد بالاترین ارتفاع بوته گشنیز مربوط به کمپوست شیرین بیان در هر سه سطح (۱، ۲ و ۳ کیلوگرم در مترمربع) با ۹۵ سانتی‌متر بود که افزایش ۳۶ درصدی نسبت به تیمار شاهد داشتند و کم‌ترین ارتفاع بوته نیز مربوط به تیمار کمپوست ترکیبی گیاهان دارویی در سطح ۱۰ کیلوگرم در مترمربع با ۶۵/۵۳ سانتی‌متر بود که کاهش ۷ درصدی نسبت به تیمار شاهد نشان داد (جدول ۵). بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی مربوط به تیمار کمپوست نیشکر در سطح ۶ کیلوگرم در مترمربع به ترتیب با ۵۴/۷۱ و ۸/۳۶ گرم بود که با سایر سطوح کمپوست نیشکر (۲ و ۴ کیلوگرم در مترمربع) تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری وجود نداشت (جدول ۵). بالاترین سطح برگ گشنیز مربوط به کمپوست ۳ کیلوگرم در مترمربع شیرین بیان با ۵۳۱ میلی‌متر مربع بود که افزایش ۱۰۵ درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت. کم‌ترین سطح برگ مربوط به تیمار کمپوست نخپلات در سطح ۲

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

کیلوگرم در مترمربع با ۱۸۶/۵ میلی مترمربع بود (جدول ۵). تیمار کمپوست نیشکر در سطح ۴ کیلوگرم در مترمربع، بالاترین تعداد برگ در بوته با ۱۵ برگ را دارا بود که افزایش ۲۵ درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت (جدول ۵).

جدول ۵. نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه گشنیز

تعداد برگ در بوته	ارتفاع	وزن تر اندام	وزن خشک اندام	سطح برگ	تیمارها (کیلوگرم در مترمربع)
	بوته	هوایی	هوایی	(میلی متر مربع)	
	سانتی متر	گرم	گرم		
۱۲ ^b	۷۰/۸۳ ^{de}	۵۳/۹۶ ^{ab}	۵/۱۵ ^h	۲۵۸/۰ ^e	شاهد
۷ ^g	۶۸/۳۲ ^{ef}	۲۸/۸۲ ⁱ	۵/۶۲ ^{gh}	۱۹۵/۳ ^g	ترکیب گیاهان دارویی ۵
۸ ^f	۶۵/۵۳ ^f	۲۸/۶۱ ⁱ	۵/۲۹ ^h	۲۲۲/۵ ^f	ترکیب گیاهان دارویی ۱۰
۷ ^g	۷۰/۰۳ ^{def}	۲۹/۵۶ ^{hi}	۵/۱۲ ^h	۲۹۴/۸ ^d	ترکیب گیاهان دارویی ۱۵
۹ ^e	۸۰/۱۲ ^c	۳۹/۱۵ ^g	۶/۲۳ ^f	۱۸۶/۵ ^g	نخیلات ۲
۸ ^f	۸۰/۴۷ ^c	۳۲/۵۴ ^h	۶/۱۲ ^{fg}	۲۲۲۲/۴ ^f	نخیلات ۴
۷ ^g	۸۰/۲۴ ^c	۴۲/۱۸ ^{fg}	۶/۷۹ ^e	۲۲۸/۰ ^f	نخیلات ۶
۱۰ ^d	۹۵/۲۲ ^a	۴۴/۸۲ ^{ef}	۷/۱۴ ^{de}	۲۳۶/۳ ^f	شیرین بیان ۱
۱۱ ^c	۹۵/۰۱ ^a	۵۲/۱۲ ^{abc}	۷/۶۸ ^{bc}	۳۹۱/۳ ^b	شیرین بیان ۲
۹ ^e	۹۵/۵۲ ^a	۴۷/۲۳ ^{de}	۷/۳۵ ^{cd}	۵۳۱/۰ ^a	شیرین بیان ۳
۱۲ ^b	۸۶/۲۱ ^b	۵۳/۳۷ ^{ab}	۷/۸۶ ^{abc}	۲۲۵/۰ ^f	نیشکر ۲
۱۵ ^a	۸۶/۱۵ ^b	۵۴/۱۳ ^{ab}	۸/۱۲ ^{ab}	۳۰۴/۳ ^d	نیشکر ۴
۱۲ ^b	۸۵/۷۴ ^b	۵۴/۷۱ ^a	۸/۳۶ ^a	۳۴۲/۵ ^c	نیشکر ۶
۸ ^f	۷۳/۰۸ ^{de}	۵۱/۰۶ ^{bc}	۷/۷۵ ^{bc}	۲۲۴/۵ ^f	گل محمدی ۴
۷ ^g	۷۳/۵۴ ^d	۵۲/۱۲ ^{abc}	۸/۰۴ ^{ab}	۲۳۶/۵ ^f	گل محمدی ۵
۸ ^f	۷۲/۴۸ ^{de}	۴۹/۲۳ ^{cd}	۷/۶۴ ^{bcd}	۳۱۰/۳ ^d	گل محمدی ۶

میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری ندارد.

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

مقایسه میانگین محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گشنیز تحت کاربرد کمپوست‌های مختلف نشان داد بالاترین محتوای کلروفیل a مربوط به کمپوست ۴ کیلوگرم در مترمربع نخیلات جنوب با ۱/۱۹۵ میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ و محتوای کلروفیل b در کمپوست ۶ کیلوگرم در مترمربع ضایعات گل محمدی با ۰/۴۹۵ میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ بود که افزایش معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد داشتند (جدول ۶). بالاترین محتوای کلروفیل کل و کارتنوئید در تیمار ۶ کیلوگرم در مترمربع کمپوست نیشکر به ترتیب با ۱/۴۶ و ۰/۲۸ میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ بود. کمترین میزان در این صفات نیز مربوط به تیمار کمپوست گیاهان دارویی در سطح ۵ کیلوگرم در مترمربع به ترتیب با ۰/۳۴۲ و ۰/۰۵۱ میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ بود (جدول ۶). بالاترین میزان ترکیبات فنولیک در تیمار کمپوست ۶ کیلوگرم در مترمربع نیشکر با ۳۴۱ میلی‌گرم در گرم یافت شد که نسبت به تیمار شاهد ۸۰ درصد افزایش نشان داد (جدول ۶). بیشترین و کمترین مقادیر اسانس بذر گشنیز به ترتیب با کاربرد ۶ کیلوگرم کمپوست نیشکر در مترمربع و ۲ کیلوگرم کمپوست شیرین بیان در مترمربع اندازه‌گیری شد (جدول ۶).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

جدول ۶. نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر محتوای کلروفیل، کارتنوئید، ترکیبات فنولیک برگ و درصد اسانس بذر گیاه گشنیز

میزان اسانس	ترکیبات فنولیک	کاروتنوئید	کلروفیل کل	کلروفیل b	کلروفیل a	تیمارها
درصد	میلی گرم در گرم ماده خشک	میلی گرم در گرم برگ	میلی گرم بر گرم وزن تر برگ	میلی گرم بر گرم وزن تر برگ	میلی گرم بر گرم وزن تر برگ	(کیلوگرم در مترمربع)
۲۸ ^b	۱۹۳/۶ ^g	۰/۱۱۱ ⁱ	۰/۸۰۶ ^{gh}	۰/۱۶۷ ⁱ	۰/۷۳۹ ^{cd}	شاهد
۲۲ ^f	۲۴۱/۹ ^d	۰/۰۵۸ ^j	۰/۳۴۲ ⁱ	۰/۱۱۲ ^j	۰/۲۳۰ ^h	ترکیب گیاهان دارویی ۵
۲۰ ^g	۲۱۳/۰ ^{efg}	۰/۱۹۴ ^{de}	۰/۹۴۴ ^{ef}	۰/۲۶۴ ^e	۰/۶۸۰ ^{de}	ترکیب گیاهان دارویی ۱۰
۲۰ ^g	۳۱۸/۶ ^b	۰/۲۱۳ ^c	۰/۸۷۷ ^{fg}	۰/۲۸۵ ^d	۰/۵۹۲ ^{ef}	ترکیب گیاهان دارویی ۱۵
۲۳ ^e	۲۳۴/۶ ^{de}	۰/۱۷۲ ^{fg}	۰/۷۶۸ ^h	۰/۱۷۵ ⁱ	۰/۵۹۳ ^{ef}	نخیلات ۲
۲۳ ^e	۲۳۱/۹ ^{de}	۰/۲۴۴ ^b	۱/۳۱۲ ^b	۰/۱۱۷ ^j	۱/۱۹۵ ^a	نخیلات ۴
۲۳ ^e	۲۲۵/۲ ^{def}	۰/۱۴۱ ^h	۰/۷۷۲ ^h	۰/۲۲۵ ^{fg}	۰/۵۴۶ ^f	نخیلات ۶
۱۴ ⁱ	۲۰۳/۱ ^{fg}	۰/۱۸۶ ^{def}	۰/۹۴۷ ^{ef}	۰/۲۲۷ ^{fg}	۰/۷۲۱ ^{cd}	شیرین بیان ۱
۱۰ ^l	۲۲۸/۳ ^{de}	۰/۱۸۳ ^{ef}	۱/۱۷۹ ^c	۰/۳۸۶ ^b	۰/۷۹۳ ^c	شیرین بیان ۲
۱۳ ^j	۲۱۵/۸ ^{efg}	۰/۱۷۷ ^f	۰/۸۸۰ ^{fg}	۰/۲۱۶ ^g	۰/۶۶۴ ^{de}	شیرین بیان ۳
۱۷ ^h	۲۷۲/۱ ^c	۰/۱۸۴ ^{ef}	۰/۹۲۵ ^f	۰/۲۵۷ ^e	۰/۶۶۸ ^{de}	نیشکر ۲
۱۱ ^k	۳۱۱/۴ ^b	۰/۲۰۲ ^{cd}	۱/۰۳۰ ^{de}	۰/۲۳۱ ^f	۰/۷۹۹ ^c	نیشکر ۴
۲۹ ^a	۳۴۸/۴ ^a	۰/۲۷۸ ^a	۱/۴۶۰ ^a	۰/۳۹۵ ^b	۱/۰۶۵ ^b	نیشکر ۶
۲۷ ^c	۲۶۷/۱ ^c	۰/۱۶۰ ^g	۰/۷۹۳ ^{gh}	۰/۱۹۶ ^h	۰/۵۹۷ ^{ef}	گل محمدی ۴
۱۴ ⁱ	۳۲۱/۸ ^b	۰/۱۷۷ ^f	۱/۰۴۶ ^d	۰/۳۲۵ ^c	۰/۷۲۱ ^{cd}	گل محمدی ۵
۲۶ ^d	۲۲۳/۸ ^{def}	۰/۰۱۹ ^k	۰/۹۰۵ ^f	۰/۴۹۵ ^a	۰/۴۱۰ ^g	گل محمدی ۶

میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) در سطح ۵ درصد اختلاف معنی‌داری ندارد.

به نظر می‌رسد کمپوست نیشکر با افزایش مواد معدنی خاک، بهبود فعالیت‌های میکروبی خاک و جذب بیشتر عناصر غذایی، منجر به افزایش فتوسنتز و ماده خشک گیاهی می‌شود که در نهایت منجر به بهبود رشد گیاه گشنیز می‌شود.

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

در این راستا، طهماسبی و همکاران (۱۴۰۱) گزارش کردند کود کمپوست بقایای نیشکر با ذخیره رطوبت و درصد نیتروژن بالا باعث افزایش شاخص‌های رشدی گیاه ذرت دانه‌ای مانند شاخص سطح برگ شد.

از سوی دیگر احتمالاً تیمار کمپوست نیشکر در سطح ۶ کیلوگرم در مترمربع، به دلیل دارا بودن عناصر غذایی که به فرم قابل دسترس به تدریج آزاد و در اختیار گیاهان قرار می‌دهد (Sanchez et al., 2017) باعث افزایش عملکرد اسانس گشنیز شده است. از آنجا که متابولیت‌های ثانویه از تولیدات جانبی فتوسنتز می‌باشند، بنابراین مقدار تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان بالا رفته و بالاترین حجم تولیدی اسانس را به خود اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد که در اثر افزودن کمپوست نیشکر به خاک نه تنها در دسترس بودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (به ویژه نیتروژن) افزایش پیدا کرده بلکه این کمپوست با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خاک ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه باعث افزایش تولید ماده خشک، ترکیبات موثره عصاره گیاه از جمله فنول و فلاونوئید و درصد اسانس گردید.

کاربرد کودهای کمپوست باعث دسترسی بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به ویژه نیتروژن، فسفر و ریز مغذی‌ها و نیز بهبود جذب آب می‌شود که منجر به تداوم بافت سبز فتوسنتز کننده، افزایش تولید مواد فتوسنتزی، توسعه سیستم ریشه‌ای گیاه در جهت جذب عناصر غذایی و نیز اصلاح حاصلخیزی خاک و در نتیجه افزایش رشد و ارتفاع گیاه می‌گردد (Chattha et al., 2019).

در طی پژوهش، Ibanogiu و Ibanogiu (۲۰۰۰)، ریشه شیرین‌بیان حاوی قندهای مختلف (تا ۱۸ درصد)، فلاونوئیدها، ساپونین‌ها، استرول‌ها، اسیدهای آمینه، نشاسته و صمغ‌ها است. بسیاری از محققان به این نتیجه رسیدند که ترکیبات موجود در شیرین‌بیان نقش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اساسی در ساختار رنگدانه‌های فتوسنتزی، متابولیسم کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها دارند. عصاره‌های آبی شیرین‌بیان سرشار از اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و فیتوهورمون‌های محرک رشد هستند که باعث افزایش فعالیت بافت مرستم آپیکال و در نتیجه تقسیم سلولی و افزایش طول رشد گیاه می‌شود. عصاره آبی شیرین‌بیان به نوبه خود حاوی مواد معدنی متعددی مانند پتاسیم، فسفر، منیزیم، آهن و سایر محرک‌های رشد و همچنین ساکاریدهای جذب شده توسط برگ‌ها در هنگام محلولپاشی است که باعث افزایش فعالیت رشد و در نتیجه افزایش رشد رویشی و محتوای کلروفیل کل می‌شود (El-Ghait et al., 2021). بیشترین درصد روغن معنی‌دار (۵/۰۹ و ۵/۳۷ درصد) از گیاهان محلولپاشی شده آجودان (*Trachyspermum ammi*) در غلظت ۴۰ گرم در لیتر ریشه شیرین‌بیان به دست آمد. افزایش این ویژگی‌ها ممکن است به دلیل افزایش جذب مواد مغذی، به ویژه ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، مس، روی، آهن و منگنز که در شیرین‌بیان وجود داشت، باشد (El-Ghait et al., 2021). این نتایج توسط Saker (۲۰۰۱) پشتیبانی می‌شود، که ادعا می‌کند میانگین تعداد غدد روغنی در هر میلی‌متر مربع تیغه برگ نعناع فلفلی (*Mentha piperita*) با استفاده از کودهای معدنی و آلی افزایش یافته است. مواد شیمیایی موجود در ریشه شیرین‌بیان به رشد طولی و تقسیم سلولی گیاه کمک می‌کند. وجود مواد آلی تجزیه شده توسط کرم و آزاد شدن عناصر معدنی (درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها) به سرعت جذب گیاه می‌شود که منجر به افزایش فشار اسمزی و در نهایت افزایش جذب آب و وزن تر و رشد ابعادی سلول‌ها می‌گردد (محسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۹). کاربرد پسماند شیرین‌بیان به دلیل بهبود ساختمان خاک و جلوگیری از تراکم خاک و حفظ آب ثقلی موجب ایجاد محیطی مناسب برای رشد گیاه

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

می‌شود و آب قابل دسترس بیشتری در اختیار گیاه قرار می‌دهد. همچنین این ترکیب از یک طرف باعث تامین عناصر غذایی خاک شده و از سوی دیگر نیز باعث بهبود فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک می‌گردد (رجایی و همکاران، ۱۳۹۴). در برگ‌های یونجه کاربرد کمپوست خرما به طور قابل توجهی بر جذب مواد معدنی در یونجه به‌ویژه فسفر، پتاسیم و منیزیم تأثیر گذاشت (Benabderrahim *et al.*, 2018). علاوه بر این، منیزیم در افزایش رشد برگ‌ها، تقسیم سلولی و فعالیت بیولوژیکی گیاه و همچنین ساخت کلروفیل نقش دارد. علاوه بر این، محتوای کلروفیل را در برگ‌ها افزایش می‌دهد و باعث ایجاد فرآیندهای فیزیولوژیکی ضروری در گیاه می‌شود (El-Ghait *et al.*, 2021). بنابراین افزایش محتوای کلروفیل تحت تیمار کمپوست ضایعات نخیلات می‌تواند به دلیل وجود منیزیم بالا در این کمپوست باشد. طی بررسی Ali و همکاران (۲۰۰۸)، کاربرد کمپوست ضایعات نخل خرما، به‌عنوان جایگزین پیت مشخص شد که در اکثر موارد بستر کمپوست نخل خرما از مواد غذایی بالاتری نسبت به پیت برخوردار بود و رشد گیاه را به طور چشم‌گیری بهبود داد.

با توجه به نقش عناصر غذایی مانند نیتروژن، منیزیم، آهن و منگنز در ساختمان رنگدانه‌های فتوسنتزی، کودهای کمپوست از طریق افزایش دسترسی این عناصر برای گیاه منجر به افزایش محتوای کلروفیل برگ می‌شوند (Arancon *et al.*, 2004). در مطالعه طهماسبی و همکاران (۱۴۰۱)، کاربرد کمپوست بقایای نیشکر باعث افزایش محتوای کلروفیل برگ‌های ذرت دانه‌ای شد. در تحقیق حاضر میزان ترکیبات فنولیک (۳۴۸/۴ میلی‌گرم در کیلوگرم) در تیمار کاربرد کمپوست نیشکر به میزان ۶ کیلوگرم در متر مربع بیش از سایر تیمارها افزایش نشان داد. از آن‌جا که متابولیت‌های ثانویه از تولیدات جانبی فتوسنتز می‌باشند، بنابراین مقدار تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان بالا رفته و بالاترین حجم تولیدی اسانس را به خود اختصاص می‌دهند (کاپلان و همکاران، ۲۰۰۹). به نظر می‌رسد که در اثر افزودن کمپوست نیشکر به خاک نه تنها در دسترس بودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (به ویژه نیتروژن) افزایش پیدا کرده، بلکه این ترکیب با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خاک ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه، باعث افزایش تولید ماده خشک، ترکیبات موثره عصاره گیاه از جمله ترکیبات فنولیک و درصد اسانس گردید.

Hargreaves و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که کانی‌سازی نیتروژن آلی کمپوست به عوامل مختلفی از جمله نسبت کربن به ازت ماده خام، شرایط کمپوست، بلوغ کمپوست، زمان اصلاح و کیفیت کمپوست بستگی دارد. در واقع، تأمین کمپوست در چنین خاکی، ریزوسفر را با عناصر ریز و درشت مغذی غنی می‌کند و با کاهش مواد مغذی مقابله می‌کند (Lakhdar *et al.*, 2008).

کاربرد ضایعات رز می‌تواند خواص شیمیایی و فیزیکی کمپوست تولیدی را بهبود دهد، در واقع اضافه‌کردن ضایعات گلخانه‌ای رز باعث کاهش پتاسیم قابل جذب، شوری و سدیم و افزایش pH کمپوست می‌شود. در خاک نیز باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری، شوری، سرب و کادمیوم و افزایش کربن آلی شد (خراطی و صباغ‌تازه، ۱۴۰۱). نتایج مقایسه میانگین داده‌های صفات این مطالعه نشان داد تیمارهای کمپوست گیاهان دارویی تأثیر منفی بر پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه گشنیز داشتند، گیاهان دارویی دارای ترکیبات فنولی و فلاونوئید هستند. این ترکیبات عامل کاهش رشد در سطوح بالای کمپوست می‌باشند، اگرچه این ترکیبات با پوسیدن مقدار آن‌ها کاهش می‌یابد ولی به طور کامل حذف نمی‌شوند (جوانبخت و همکاران، ۱۴۰۱). ترکیبات فنولی از ترکیبات موثر در پدیده دگرآسیبی هستند که

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

در ساختمان شیمیایی خود واجد یک حلقه آروماتیک همراه و یک یا چند عامل هیدروکسیل می‌باشند که می‌تواند عامل دگرآسیب برای گیاهان دیگر باشد (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۶).

یکی از دلایل زیاد شدن میزان ترکیبات فنولیکی طی استفاده از تیمارهای تغذیه‌ای در بسترهای مختلف ممکن است ناشی از تأثیر مثبت این کودها بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک همراه با افزایش ماده آلی خاک باشد (Onofrei *et al.*, 2018). در پژوهشی که بر روی گیاه زنجبیل (*Zingiber officinale* Roscoe) صورت گرفت نتایج نشان داد که، تحت شرایط بهبود خصوصیات خاک و در نتیجه افزایش فتوسنتز، محتوای فلاونوئید و فنل در این گیاه افزایش یافت (Ghasemzadeh *et al.*, 2011).

با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده‌ها ترکیبات اسانس گیاه گشنیز (لینالول، گاما-ترپینن، آلفا-پینن، پی-سیمن و ژرانیل استات) در سطح احتمال یک درصد تحت اثر تیمارهای کمپوست تفاوت معنی‌دار نشان داد (جدول ۷). نتایج مقایسه میانگین‌ها حاکی از این است که در تمام نمونه‌های گیاهی کشت شده در بسترها ترکیب لینالول مشاهده شد، به طوری که در تیمار کاربرد کمپوست گیاهان دارویی به میزان ۱۰ کیلوگرم در مترمربع و کمپوست نیشکر ۶ کیلوگرم در مترمربع به ترتیب با ۷۸/۷۰ و ۷۷/۹۰ درصد میزان لینالول سنتز شده در بذر گشنیز بیش از سایر تیمارها بود. کم‌ترین میزان لینالول در تیمار کاربرد کمپوست شیرین بیان ۲ کیلوگرم در مترمربع حاصل شد (جدول ۸). ترکیبات گاما-ترپینن و پی-سیمن در تیمار کمپوست نخلیات ۲ و ۶ کیلوگرم در مترمربع به ترتیب با ۸/۹۴ و ۱۱/۷۷ درصد بیشترین میزان را دارا بود. تیمار کمپوست گیاهان دارویی در سطح ۱۵ کیلوگرم در مترمربع از بالاترین میزان آلفا-پینن با ۶/۶۰ درصد برخوردار بود. ترکیب ژرانیل استات با ۷/۸۵ درصد در تیمار کمپوست شیرین بیان ۲ کیلوگرم در مترمربع در بیشترین مقدار در مقایسه با سایر تیمارها قرار داشت (جدول ۸).

جدول ۷. نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر برخی از ترکیبات مهم اسانس گیاه دارویی گشنیز

میانگین مربعات					درجه آزادی	منابع تغییرات
ژرانیل استات	پی-سیمن	آلفا-پینن	گاما-ترپینن	لینالول		
۱/۸۵	۱/۴۷	۱/۳۲	۶/۱۳	۲۴۰/۳	۲	بلوک
۵/۸۷**	۱۹/۲۶**	۸/۳۰**	۴/۷۶**	۸۷/۳۵**	۱۵	تیمار
۰/۰۲	۰/۰۴	۰/۰۱	۰/۰۷	۰/۷۸	۳۰	خطا
۲/۸۱	۶/۵۹	۲/۸۸	۴/۲۷	۱/۲۲		ضریب تغییرات (%)

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

** : به ترتیب معنی دار شدن در سطح آماری ۵ و ۱ درصد

جدول ۸. مقایسه میانگین اثر تیمار کمپوست‌های مختلف بر برخی از ترکیبات مهم اسانس گیاه دارویی گشنیز (درصد)

تیمار کمپوست (کیلوگرم در مترمربع)	لینالول	گاما-ترپینن	آلفا-پینن	پی-سینن	ژرانیل استات
شاهد	۷۲/۸۲ a-e	۷/۲۲ b	۱/۵۹ hi	۴/۵۰ b	۲/۴۴ j
گل محمدی ۴	۷۴/۶۵ a-d	۵/۷۹ cd	۲/۳۴ fg	۲/۲۴ ef	۵/۶۵ bc
گل محمدی ۵	۶۹/۹۶ cde	۴/۹۶ d	۲/۲۹ fg	۳/۳۱ d	۵/۲۳ cde
گل محمدی ۶	۶۶/۲۶ e	۶/۰۴ cd	۳/۹۶ de	۳/۷۵ cd	۳/۹۷ gh
نخیلات ۲	۷۱/۸۲ b-e	۸/۹۴ a	۴/۵۹ bc	۴/۳۵ bc	۲/۹۶ ij
نخیلات ۴	۷۵/۶۳ abc	۵/۵۵ d	۴/۸۸ b	۱/۸۲ fgh	۳/۰۹ i
نخیلات ۶	۷۸/۰۹ ab	۵/۷۴ cd	۰/۹۸ i	۱۱/۷۷ a	۳/۷۳ h
شیرین بیان ۱	۷۰/۵۷ cde	۷/۴۹ b	۲/۶۸ f	۲/۶۱ e	۴/۶۵ ef
شیرین بیان ۲	۵۸/۰۶ f	۸/۸۰ a	۴/۱۸ cde	۳/۳۰ d	۷/۸۵ a
شیرین بیان ۳	۷۱/۷۸ b-e	۵/۵۱ d	۳/۸۲ e	۲/۶۶ e	۵/۹۸ b
نیشکر ۲	۷۶/۱۴ abc	۴/۹۴ d	۱/۹۱ gh	۲/۳۸ ef	۴/۴۰ fg
نیشکر ۴	۶۸/۷۸ de	۵/۲۴ d	۱/۶۱ hi	۳/۲۹ d	۵/۷۰ bc
نیشکر ۶	۷۷/۹۰ ab	۷/۳۱ b	۴/۳۷ cd	۲/۱۸ efg	۲/۹۵ ij
ترکیب گیاهان دارویی ۵	۷۷/۴۹ ab	۵/۷۰ cd	۲/۷۹ f	۱/۶۱ gh	۴/۸۱ def
ترکیب گیاهان دارویی ۱۰	۷۸/۷۰ a	۵/۸۰ cd	۲/۳۴ fg	۱/۳۳ h	۴/۳۰ fgh
ترکیب گیاهان دارویی ۱۵	۶۸/۸۷ de	۶/۶۹ bc	۶/۶۰ a	۰/۳۱ i	۵/۳۰ cd

میانگین‌هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری ندارد.

اسانس‌ها ترکیبات ترپنوئیدی هستند و واحدهای تشکیل دهنده آن‌ها (یعنی ایزوپرنوئیدها) مانند ایزوپنتیل پیروفسفات (IPP) و دی متیل آلیل پیروفسفات (DMAPP) اساساً به NADPH و ATP نیاز دارند و عناصری مانند نیتروژن و فسفر برای تشکیل ترکیبات فوق ضروری هستند (Ghazi Manas et al., 2013). عوامل محیطی باعث تغییراتی در رشد گیاهان دارویی و همچنین مقدار و کیفیت مواد مؤثره آن‌ها نظیر آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، استروئیدها و اسانس‌ها می‌گردد (امیدبگی، ۱۳۸۸).

سطوح آلفا-پینن و ژرانیل استات به دلیل بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک و جذب تدریجی آب و مواد مغذی افزایش یافت که به نوبه خود با استفاده از کود آلی حاصل شد (Mohapatra and Das, 2009). کود می‌تواند فعالیت باکتری‌های مفید را بهبود بخشد و حلالیت مواد معدنی و دسترسی گیاه را فراهم کند (Yari and Tab, 2018). گاما-ترپینن به دلیل

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

بهبود فعالیت‌های میکروبی مفید در خاک و تأمین مطلوب عناصر ماکرو و میکرو در گشسبز افزایش یافت (Chatterjee, 2002). در مطالعه Darzi و Haj Seyed Hadi (۲۰۱۴) نشان دادند که بیشترین درصد گاما ترپنین در گشسبز با مصرف ۱۵ تن کود دامی در هکتار به دست آمد. همچنین مطالعات نشان داده است که اسیدهای آمینه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاه و کیفیت محصول تأثیر می‌گذارند (Faten et al., 2010) و این امر در بهبود میزان گاما ترپنین موجود در اسانس گشسبز مؤثر بوده است. به نظر می‌رسد کمپوست غنی از عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بوده و با آزادسازی تدریجی عناصر غذایی که متناسب با مرحله رشدی گیاه می‌باشد، باعث افزایش محتوی ترکیب‌های اسانس در تیمارهای مورد بررسی بود.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد صفات مورفولوژیک، محتوای کلروفیل و کارتنوئید، میزان ترکیبات فنولیک برگ و درصد اسانس بذر گیاه گشسبز به‌طور چشم‌گیری تحت تأثیر کاربرد کمپوست‌های مختلف گیاهی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کاربرد کمپوست نیشکر نسبت به سایر تیمارها ممکن است شرایط مطلوبی را در دوره رشد اولیه از نظر حفظ آب در اطراف محیط ریشه و بهبود شرایط خاک برای نفوذ عمیق‌تر ریشه‌ها به داخل خاک فراهم کند که می‌تواند در تقویت رشد رویشی گیاه مؤثر باشد و از این‌رو باعث افزایش محتوای کلروفیل، ترکیبات فنولیک، درصد اسانس و اجزای اسانس و به‌ویژه میزان لینالول به‌عنوان یکی از ترکیبات اصلی اسانس گشسبز و همچنین وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه گشسبز به‌ویژه در سطح ۶ کیلوگرم در مترمربع شد.

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

منابع

- افشاری، م. و رحیم‌ملک، م. (۱۳۹۶) سنجش ترکیبات فنولی، اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی بومادران هزاربرگ (*Achillea millefolium* L.) در مراحل رشد. فرآیند و کارکرد گیاهی ۲۱: ۱۵-۲۵.
- امیدبیگی، ر. (۱۳۸۸) رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی (جلد اول)، انتشارات فکر روز، تهران، ۲۸۳ صفحه.
- جوانبخت، م.، قاسمی قهساره، م. و متقیان، ح. ر. (۱۴۰۱) اثر ورمی کمپوست پسماند ریشه شیرین بیان بر رشد و نمو بنفشه آفریقایی. گل و گیاهان زینتی ۷: ۷۷-۹۲.
- خراطی، آ. و صباغ‌تازه، ا. (۱۴۰۱) تأثیر ضایعات رز بر کاهش شوری و عناصر سنگین در کمپوست و خاک. علوم و تکنولوژی محیط زیست ۲۴: ۱۲۵-۱۴۲.
- رجایی، م.، عطارزاده، م.، موسوی، س. ح. و عطارزاده، م. (۱۳۹۴) استفاده از کمپوست شیرین بیان (*Glycyrrhiza Glabra*) در کاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‌ای. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار ۲۵: ۷۹-۹۰.
- طهماسبی، م.، قرینه، م. ح.، مشتقی، ع. و خدایی جوقان، آ. (۱۴۰۱) واکنش صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد ذرت دانه‌ای به روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی ۱۲: ۳۱-۴۴.
- کاظمی، م.، روشندل، پ. و رفیعی‌الحسینی، م. (۱۳۹۶) ارزیابی تأثیر دگرآسیبی شش گیاه دارویی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چغندر قند و دو علف هرز مهم آن. فرآیند و کارکرد گیاهی ۶: ۶۵-۸۰.
- محسن‌زاده، س.، حسین‌خانی هزاوه، م. و زمانپور شاه‌منصوری، ح. (۱۳۹۹) برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسطوخودوس (*Lavandula angustifolia*) در پاسخ به تنش خشکی و کود کمپوست و ورمی‌کمپوست. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی ۲۷: ۱۴۹-۱۶۲.
- محمودی، ل. (۱۳۹۵) تأثیر کمپوست گیاهان دارویی بر شاخص‌های رشد ذرت و برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
- Abd El-Azim, W.M., Khater, R.M.R. and Badawy, M.Y.M. (2017) Effect of biofertilization and different licorice extracts on growth and productivity of *Foeniculum vulgare*. Mill. plant. Middle East Journal of Agriculture Research 6(1):1-12.
- Ahmad, T., Shah, S.T., Ullah, F., Ghafoor, F. and Anwar, U. (2017) Effect of organic fertilizers on growth and yield of coriander. International Journal of Agricultural and Environmental Research 3(1): 116-120.
- Ali, Y. S. S. (2008) Use of date palm leaves compost as a substitution to peatmoss. American Journal of Plant Physiology 3(4):131-136. <https://doi.org/10.3923/ajpp.2008.131.136>
- Almasi, F. (2021) Organic fertilizer effects on morphological and biochemical traits and yield in coriander (*Coriandrum sativum* L.) as an industrial and medicinal plant. Agrotechniques in Industrial Crops 1(1): 19-23.
- Arancon, N., Edwards, P., Bierman, C., Welch, P. and Metzger, J. (2004) Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits of field-grown tomatoes, peppers and strawberries. Pedobiology 47: 731-735.
- Benabderrahim, M.A., Elfalleh, W., Belayadi, H. and Haddad, M. (2018) Effect of date palm waste compost on forage alfalfa growth, yield, seed yield and minerals uptake. International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture 7:1-9.

- Bhat, S., Kaul, P., Kaur, M. and Sharm, H. K. (2014) Coriander Processing, nutritional and functional aspects. *African Journal of Plant Science* 64: 1264–1273.
- Chattha, M. U., Hassan, M. U., Barbanti, L., Chattha, M. B., Khan, I., Usman, M., Ali, A. and Nawaz, M. (2019) Composted sugarcane by-product press mud cake supports wheat growth and improves soil properties. *International Journal of Plant Production* 13(2): 241-249.
- Chatterjee, S.K. (2002) Cultivation of medicinal and aromatic plants in India, a commercial approach. *Crop Production* 27(1): 75-85.
- Darzi, M.T., Atarpoor, R. and Haj Seyed Hadi, M.R. (2016) Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (*Dracocephalum moldavica* L.). *Iranian Journal of Filed Crop Science* 46(4): 711-722.
- El-Ghait, E. M. A., Mohamed, Y. F. Y., Badawy, M. Y. M. and El-Gioushy, S. H. (2021) Influence of aqueous licorice and ethanol moringa extracts on the essential oil production, and chemical constituents of ajwain (*Trachyspermum ammi*) plants under sandy soil condition. *Scientific J. Flowers and Ornamental Plants* 8(1):19-38.
- Faten, S.A., Shaheen, A.M., Ahmad, A.A. and Mahmoud, A.R. (2010) Effect of foliar application of amino acids as antioxidants on growth, yield and characteristics of squash. *Research Journal of Agriculture and Biological Science* 6 (5): 583-588.
- Filipović, V. and Ugrešević, V. (2013) The composting of plant residues originating from the production of medicinal plants. Conference: International Scientific Meeting. Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - Achieving regional competitiveness“. At: Topola, Serbia, hotel „Oplenac“, December 5-7th 2013.
- Galal, T. M., Majrashi, A., Al-Yasi, H. M., Farahat, E. A., Eid, E. M. and Ali, E. F. (2022). Taif's rose (*Rosa damascena* Mill var. *trigintipetala*) wastes are a potential candidate for heavy metals remediation from agricultural soil. *Agriculture* 12: 1319.
- Ghaffari, H., Tadayon, M.R., Bahador, M. and Razmjoo, J. (2022) Biochemical and yield response of sugar beet to drought stress and foliar application of vermicompost tea. *Plant Stress* 5: 100087.
- Ghasemzadeh, A., Jaafar, H.Z.E. and Rahmat, A. (2011) Effects of Solvent Type on Phenolics and Flavonoids Content and Antioxidant Activities in Two Varieties of Young Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) Extracts. *Journal of Medicinal Plants Research* 5: 1147-1154.
- Ghazi Manas, M., Banj Shafiee, S., Haj Seyed Hadi, M.R. and Darzi, M.T. (2013) Effects of vermicompost and nitrogen on quantitative and qualitative yield of chamomile (*Matricaria chamomilla* L.). *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants* 29(2): 269-280.
- Ghorbani, M., Kahrizi, D. and Chaghakaboodi, Z. (2020) Evaluation of camelina sativa doubled haploid lines for the response to water-deficit stress. *Journal of Medicinal Plants and Byproduct* 9(2): 193-199.
- Hargreaves, J. C., Adl, M. S. and Warman, P. R. (2008) A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 123:1–14. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.07.004>
- Heiskanen, J. (1993). Favourable water and aeration conditions for growth media used in containerized tree seedling production: Review. *Scandinavian Journal of Forest Research* 8: 337-358.
- Ibanogiu, E. and Ibanogiu, S. (2000) Foaming behaviour of liquorice *Glycyrrhiza glabra* extract. *Food Chemistry* 70(3): 333-336.
- Inam-ul-Haq, M., Khan, N. A., Khan, M. A., Khan, M. A., Javed, N., Binyamin, R. and Irshad, G. (2010) Use of medicinal plants in different composts for yield improvement of various strains of oyster mushroom. *Pakistan Journal of Botany* 42(5): 3275-3283.
- Keshvari, T., Najafy, A., Kahrizi, D. and Zebarjadi, A. R. (2018) Callus induction and somatic embryogenesis in *Stevia rebaudiana* Bertoni as a medicinal plant. *Cellular and Molecular Biology* 64(2): 46-49. <https://doi.org/10.14715/cmb/2018.64.2.9>
- Lakhdar, A., Hafsi, C., Rabhi, M., Debez, A., Montemurro, F., Abdelly, C., Jedidi, N. and Ouerghi, Z. (2008) Application of municipal solid waste compost reduces the negative effects of saline water in *Hordeum maritimum* L. *Bioresource Technology* 99:7160–7167. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.12.071>
- Lichtenhaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids the pigments of photosynthetic biomembranes. In: *Methods Enzymol.* Douce, R. and pacher, L. (Eds.). Academic press Inc, New York, pp. 350-382.

- Marinari, S., Masciandaro, G., Ceccanti, B. and Grego, S. (2000) Influence of organic and mineral fertilizers on soil biological and physical properties. *Bioresource Technology* 72(1): 9-19.
- Moaveni, P. (2009) Principles of cultivation of medicinal plants. Eta Publications (1th ed.). Ghods.
- Mohammadi, G. R., Chatrnour, S., Jalali-Honarmand, S. and Kahrizi, D. (2015) The effects of planting arrangement and phosphate biofertilizer on soybean under different weed interference periods. *Acta Agriculturae Slovenica* 105(2): 313-322. <https://doi.org/10.14720/aas.2015.105.2.14>
- Mohapatra, S.C. and Das, T.K. (2009) Integrated effect of biofertilizers and organic manure on turmeric (*Curcuma longa*). *Environmental Ecology* 27: 1444-1445.
- Onofrei, V., Benchennouf, A., Jancheva, M., Loupassaki, S., Ouaret, W., Burducea, M., Lobiuc, A., Teliban, G.C. and Robu, T. (2018) Ecological foliar fertilization effects on essential oil composition of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.) cultivated in a field system. *Scientia Horticulturae* 239: 104-113.
- Pal, P. K. (2013) Evaluation, Genetic Diversity, Recent Development of Distillation Method, Challenges and Opportunities of *Rosa damascena*: A Review. *Journal of Essential Oil Bearing Plants* 16: 1-10.
- Phiri, C. (2010) Influence of *Moringa oleifera* leaf extracts on germination and early seedling development of major cereals. *Agriculture and Biology Journal of North America* 1(5): 774-777.
- Rabbani, D., Mahmoudkashi, N., Mehdizad, F. and Shaterian, M. (2016) Green approach to wastewater treatment by application of *Rosa damascena* waste as nano-biosorbent. *International Journal of Environmental Science and Technology* 9: 121-130.
- Saker Weam, R.A. (2001) Effect of some organic and inorganic fertilizers on *Mentha piperita*. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture. Cairo University, Egypt.
- Sánchez, Ó., Osping, D. A., Montoya, S. (2017) Compost supplementation with nutrients and microorganisms in composting process. *Waste Management* 69: 136-153.
- Sefidkon, F. (2001) Evaluation of qualitative and quantitative essential oil fennel (*Foeniculum vulgare* Mill) in different stages of growth. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants* 7: 85-104.
- Shawl, A. S., Adams, R. (2009) Rose Oil in Kashmiri India, an emerging cash crop benefiting industry and local agribusiness. *Perfumer and Flavorist* 34: 22-25.
- Slinkard, K. and Singleton, V. L. (1977) Total phenol analysis; automation and comparison with manual methods. *American Journal of Enology and Viticulture* 28: 49-55.
- Yari, A. and Tab, A. (2018) Evaluation of organic and chemical different nutrition systems on the yield, quantity and quality of essential oil of coriander (*Coriandrum sativum* L.). *Journal of Plant Production Research* 24(4): 13-29.
- Zebarjadi, A., Kazem, S. and Kahrizi, D. (2018) Cell dedifferentiation and multiplication of Burdock (*Arctium lappa*) as a medicinal plant. *Cellular and Molecular Biology* 64(7): 92-96. <https://doi.org/10.14715/cmb/2018.64.7.16>.

Investigation Effects of Different Composts on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Coriander

Arezo Hashemi¹, Hossein Ali Asadi- Gharneh^{2*}

- 1 Former MSc student, Department of Horticultural Science. Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
- 2 Associate Professor, Department of Horticultural Science. Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

* Corresponding author: email: h.asadi@khuisf.ac.ir

Abstract

Using nature-compatible fertilizer and suitable for optimum plant growth can have favorable effects on the plant's quantitative and qualitative indices. In the present study, the effect of different composts on the vegetative growth, biochemical characteristics and essential oil of coriander in a randomized complete block design with three replications in the agricultural research of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, which was located in Khatun Abad village during 2021, was performed. Experimental treatments included 16 treatments (control, compost of some medicinal plants (5, 10 and 15 kg m⁻²), sugarcane compost (2, 4 and 6 kg m⁻²), licorice compost (1, 2 and 3 kg m⁻²), Palm compost (2, 4 and 6 kg m⁻²) and Damask rose waste compost (4, 5 and 6 kg m⁻²). The results showed that the level of 6 kg m⁻² of sugarcane compost showed the best results among other fertilizer treatments in most traits. Plant height (95.52 cm) and leaf area (531.0 m m⁻²) with the application of licorice compost 3 kg m⁻² were higher than other treatments. The highest amount of essential oil (29%), total chlorophyll (1.46 mg g⁻¹), and phenolic compounds (348 mg kg⁻¹) was obtained with the use of 6 kg sugarcane per square meter. Linalool was the most abundant compound in coriander essential oil in all treatments. It can be concluded that sugarcane and licorice compost, through improving the physical and chemical properties of the soil, led to improved coriander growth and quantity traits.

Keywords: Phenolic compounds, Percentage of essential oil, Licorice, Sugarcane compost, Medicinal plants.