

مطالعه تاثیر کاربرد بیوچار و سلینیوم در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از کادمیوم در

گیاه گشنیز (*Coriandrum sativum* L.)

فاطمه رفیق‌زاده^۱، مرضیه قنبری جهرمی^{۲*}، مرجان دیانت^۳

۱- کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۲- استادیار، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳- استادیار، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Email: *ghanbari@srbiau.ac.ir

چکیده

به منظور بررسی تأثیر بیوچار و سلینیوم بر خصوصیات کمی و کیفی گشنیز (*Coriandrum sativum* L.) تحت تنش کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای در طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل استفاده از کلرید کادمیوم در سه سطح (۰، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، بیوچار در دو سطح (۰ و ۵ درصد حجمی) و محلول‌پاشی برگ‌گی با سلنات سدیم در دو سطح (۰ و ۲۰ میلی‌گرم در لیتر) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار کادمیوم ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم سبب کاهش صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل a، b و کل، محتوای نسبی آب برگ و افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول شد. فنل تا سطح کادمیوم ۱۰ میلی‌گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرد اما در سطوح بالاتر کادمیوم (۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) کاهش پیدا کردند. تیمارهای سلینیوم و بیوچار با کاهش اثر تنش کادمیوم سبب افزایش صفات وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، محتوای کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و عملکرد اسانس و کاهش صفات فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، قند محلول، تجمع کادمیوم ریشه و اندام هوایی شدند. بیشترین مقدار عملکرد اسانس (۱۶/۹۳ میلی‌گرم در بوته) و درصد اسانس (۰/۴۴ درصد) در تیمار ترکیب بیوچار ۵ درصد حجمی و سلینیوم ۲۰ میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. بیوچار و سلینیوم با تعدیل اثر تنش کادمیوم سبب بهبود صفات گشنیز شدند.

واژه‌های کلیدی: درصد اسانس، سمیت، فعالیت آنزیم، محلول‌پاشی.

مقدمه

عناصر سنگین از مهم‌ترین منابع آلودگی‌های غیر نقطه‌ای منابع طبیعی و کشاورزی هستند (Rai et al., 2019). سالانه هزاران تن از این عناصر وارد خاک و آب می‌شوند. از آنجایی که آلوده شدن محصولات کشاورزی با فلزات سنگین از یک طرف منجر به کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و از طرف دیگر تهدید جدی برای سلامت انسان است، لذا از جنبه‌های محیط زیستی بسیار حائز اهمیت هستند (Zheng et al., 2020). در بین فلزات سنگین برخی از آن‌ها همچون روی، مس و کبالت در مقادیر مناسب برای بیشتر سیستم‌های بیولوژیکی از جمله انسان ضروری است، در حالی که برخی دیگر از این فلزات از جمله کادمیوم، سرب و آرسنیک برای گیاهان، حیوانات و انسان بسیار سمی است (Memari-Tabrizi et al., 2021). کادمیوم به عنوان ماده‌ای سرطان‌زا در ایجاد اغلب سرطان‌ها شناخته شده است. کادمیوم یکی از

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

عوامل مهم تاثیرگذار در ایجاد بیماری‌های قلبی و فشار خون است. یکی از سازوکارهای سمیت کادمیوم جلوگیری از متابولیسم تنفسی کربوهیدرات‌ها است، که ممکن است به دلیل جانشین شدن عناصر ضروری با کادمیوم در آنزیم‌های تنفسی باشد. همچنین کادمیوم اثر آنتاگونیستی با جذب بعضی از عناصر ضروری مانند مس و روی دارد و به طور غیرقابل برگشتی در محل‌های فعال آنزیم‌های مورد نیاز DNA، RNA و پروتئین‌ها جایگزین می‌شود. جذب کادمیوم فقط از طریق ریشه صورت نمی‌گیرد بلکه شاخه‌ها و برگ‌ها نیز قادرند کادمیوم را جذب نمایند. طولانی شدن مدت خزان گیاهان خطر مهم دیگری است که در نتیجه آلودگی به کادمیوم ایجاد می‌شود (Manzoor et al., 2019).

در سیستم‌های کشاورزی پایدار، استفاده از منابع تجدیدپذیری که حداکثر محاسن اکولوژیکی و حداقل مضرات زیست‌محیطی را دارا باشد، امری ضروری است (Bakhtiari et al., 2020). بیوجار (Biochar) نوعی اصلاح‌کننده خاک است که سبب تحول عظیمی در افزایش مقاومت گیاه به تنش شده است (Ali et al., 2017). بیوجار، ماده کربنی است که از گرمادهی بقایای گیاهی و ضایعات در محیط حاوی اکسیژن محدود یا بدون اکسیژن به دست می‌آید (Razzaghi et al., 2020). تجزیه گرمایی زیست توده در محیط فاقد اکسیژن را گرماکافت می‌نامند (Ali et al., 2017). بیوجار پایداری بالایی داشته و به منظور مدیریت ضایعات، کاهش تغییرات اقلیمی، تولید انرژی و بهبود خصوصیات خاک تولید می‌شود (Razzaghi et al., 2020). خصوصیات منحصر به فرد بیوجار آن را به عنوان گزینه مناسبی برای مصرف در خاک مطرح ساخته است (Ali et al., 2017). بیوجار خصوصیات مختلف فیزیکی (از جمله ساختمان خاک، جرم مخصوص ظاهری، هدایت هیدرولیکی)، شیمیایی (اسیدیته، ظرفیت تبادل کاتیونی، میزان مواد آلی) و زیستی خاک (فعالیت، تنوع و جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیمی) را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود حاصلخیزی خاک می‌شود (Ali et al., 2017; Razzaghi et al., 2020).

از بین عناصر ریزمغذی موجود، سلنیوم عنصری است که در فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان نقش مهمی داشته (Broadley et al., 2010) و موجب افزایش رشد گیاهان تحت تنش‌های محیطی از جمله شوری می‌گردد و مشخص گردیده که سلنیوم این توانایی را دارد که وضعیت آب و جذب املاح در گیاهان را در شرایط شور و خشک تنظیم کند (Gupta and Gupta, 2017). بررسی‌های متعدد، اثر مفید سلنیوم را بر روی رشد و عملکرد گیاهان اثبات کرده است. نقش مفید این عنصر در بهبود رشد در شرایط تنش خشکی (Ikram et al., 2020; El-Saadony et al., 2021) و شوری (Zahedi et al., 2019; Ghasemian et al., 2021) بررسی شده است. اثر مفید سلنیوم به طور عمده به افزایش ترکیبات و فعالیت آنزیم‌های دفاع آنتی‌اکسیدان نسبت داده شده است (Balakhmina and Nadezhkina, 2017). با این حال، سازوکارهای دیگر اثر سلنیوم روی تخفیف تنش‌های محیطی، بررسی‌های زیادی را به خود اختصاص نداده است.

از آنجایی که کادمیوم به عنوان عنصر اصلی در ایجاد انواع سرطان‌ها به ویژه سرطان گوارش شناخته شده‌اند، بررسی اثرات این فلزات بر خواص کمی و کیفی محصول پرمصرف گشنیز ضروری و مهم است. استفاده از اصلاح‌کننده‌های خاک و عناصر تغذیه‌ای می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب این عنصر باشد. با توجه به صنعتی شدن و افزایش ضایعات شیمیایی در جهان، بحران آلاینده‌ها به خصوص کادمیوم در گیاهان دارویی توجه زیادی به خود جلب کرده است (Babashpour-Asl et al., 2022).

گشنیز (*Coriandrum sativum* L.) گیاهی علفی از خانواده Apiaceae است. این گیاه به ارتفاع ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، دارای ساقه راست، شفاف و کم و بیش شیاردار است. گشنیز به میزان فراوان به عنوان سبزی و در تهیه غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه که بومی جنوب غرب آسیا و غرب تا شمال آفریقا است به طور گسترده‌ای در خاورمیانه،

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

منطقه مدیترانه، هند، آسیای جنوبی، آمریکای لاتین، چین و آفریقا مورد مصرف قرار می‌گیرد (Nourzad et al., 2015). گشنیز علاوه بر دادن طعم و بوی مطبوع به غذا، دارای ارزش غذایی بالایی نیز است (Afshari et al., 2021). بنابراین تغذیه محصول گشنیز با سلنیوم و بهبود بستر خاک با بیوچار به منظور کاهش جذب فلزات سنگین و در نهایت حفظ کمیت و کیفیت گشنیز ضروری است.

مواد و روش‌ها

طرح و تیمارهای آزمایش

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بیوچار و سلنیوم بر خصوصیات کمی و کیفی گشنیز در شرایط تنش کادمیوم در گلخانه‌ای واقع در وردآورد کرج در طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کادمیوم با استفاده از کلرید کادمیوم در سه سطح (۰، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و بیوچار در دو سطح (۰ و ۵ درصد حجمی) به صورت مخلوط با خاک و محلول‌پاشی برگی با سلنیوم در دو سطح (۰ و ۲۰ میلی‌گرم در لیتر) از منبع سلنات سدیم اعمال شد. روش انجام تحقیق

بذرهای گشنیز تهیه شده (از شرکت پاکان بذر اصفهان) پس از ضدعفونی در گلدان‌های ۳ لیتری (۲ کیلوگرم خاک) حاوی خاک کشاورزی، خاک‌برگ و ماسه (به نسبت ۵۰:۳۰:۲۰) کشت شدند. بذرهای گشنیز در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در گلدان‌های پلاستیکی حاوی بستر کشت (خاک زراعی و خاکبرگ) کشت شدند (جدول ۱). کادمیوم و بیوچار (جدول ۲) با مقادیر مشخص با خاک مخلوط گردید. پس از سبز شدن گیاه و در مرحله ۴ برگی محلول‌پاشی برگی با سلنیوم ۳ بار با فواصل ۱۵ روزه انجام شد. آبیاری گیاهان براساس ظرفیت زراعی خاک به صورت نرمال هر ۲ روز یکبار انجام شد. پس از پایان دوره رشد گیاه (تاریخ ۲۰ الی ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱)، متغیرهای مورد بررسی در گیاه اندازه‌گیری شدند.

جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک گلدان‌ها

پارامتر	مقدار
نیترژن کل (درصد)	۰/۱۲
فسفر قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم)	۱۴/۴
پتاسیم قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم)	۲۵۸
کربن آلی (درصد)	۰/۶۷
لای (درصد)	۴۷
رس (درصد)	۲۷
شن (درصد)	۲۶
هدایت الکتریکی (میلی‌موس بر سانتی‌متر)	۱/۲
pH	۶/۸

جدول ۲- ترکیبات بیوچار

پارامتر	واحد	بیوچار
ماده آلی	درصد	۹۱/۶

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

۷۵/۸	درصد	کربن آلی
۰/۴۵	درصد	نیتروژن
۶۴	میلی گرم در کیلوگرم	نیترات
۹۴۰	میلی گرم در کیلوگرم	سولفور
۰/۵۲۰	درصد	سدیم
۲۰	درصد	پتاسیم
۰/۳۷۰	درصد	فسفر
۳۷/۵	میلی زیمنس بر متر	هدایت الکتریکی
۹/۵	-	pH
۸/۴	درصد	خاکستر کل
۰/۲۰۷	گرم بر سانتی متر مکعب	چگالی ظاهری

متغیرهای مورد بررسی

وزن تر اندام هوایی و ریشه پس از برداشت با ترازوی دیجیتال Digital scale با دقت ۰/۰۱ گرم توزین شد. برای اندازه گیری اندام هوایی، گیاه کشت شده در هر گلدان از یقه توسط قیچی قطع شد و تمام قسمت های هوایی گیاه (ساقه، گل و برگ) اندازه گیری شد. برای اندازه گیری ریشه، ریشه ها به آرامی از خاک جدا شده و با ترازوی دیجیتال وزن شدند. پس از خشک کردن اندام هوایی و ریشه گیاه در دستگاه آون (دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت)، وزن خشک آن ها با ترازوی دیجیتال Digital scale با دقت ۰/۰۱ گرم به دست آمد (Inbar et al., 1994).

اندازه گیری میزان محتوای کلروفیل با روش Arnon (1949) انجام شد. بدین ترتیب که میزان جذب عصاره استخراج شده در طول موج های ۶۴۵ نانومتر، ۶۶۳ نانومتر، ۴۸۰ نانومتر و ۵۱۰ نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر (Shimadzu UV-160، ساخت ژاپن) قرائت گردید. سپس با استفاده از رابطه های زیر کلروفیل a (رابطه ۱)، کلروفیل b (رابطه ۲) و کلروفیل کل (رابطه ۳) محاسبه شد.

$$\text{رابطه ۱: } \text{میلی گرم کلروفیل a در هر گرم برگ تر} = [(12.7 \times A_{663}) - (2.69 \times A_{645})] \times V / 1000 \times W$$

$$\text{رابطه ۲: } \text{میلی گرم کلروفیل b در هر گرم برگ تر} = [(22.9 \times A_{645}) - (4.69 \times A_{663})] \times V / 1000 \times W$$

$$\text{رابطه ۳: } \text{میلی گرم کلروفیل کل در هر گرم برگ تر} = [(20.2 \times A_{645}) + (8.02 \times A_{663})] \times V / 1000 \times W$$

در رابطه های بالا، A میزان جذب در طول موج مورد نظر، V حجم نهایی استون ۸۰ درصد برحسب میلی لیتر و W اندازه برگ تازه برحسب گرم است.

برای اندازه گیری محتوی نسبی آب برگ (RWC) جوانترین برگ تکامل یافته گیاه جدا و به سرعت با ترازوی دقیق آزمایشگاهی LiBROR AEL مدل 40SM با دقت ۰/۰۰۰۱ وزن گردید. سپس برگ های هر تیمار به طور جداگانه در لوله آزمایش درب دار حاوی آب مقطر برای مدت ۴ تا ۵ ساعت غوطه ور گردیدند و برگ ها را پس از گذشت این مدت، از لوله آزمایش خارج و با استفاده از کاغذ صافی خشک گردیدند، و مجدداً توزین شدند. تا وزن آن ها در حالت تورژسانس کامل به دست آید. برای محاسبه وزن خشک، برگ ها به مدت ۴۸ ساعت در آون ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند و سپس وزن گردیدند. محتوای نسبی آب برگ از رابطه زیر محاسبه شد، که در آن FW وزن تر برگ؛ DW وزن خشک برگ و TW وزن اشباع برگ می باشد (Ritchie et al., 1990).

$$RWC = \frac{FW - DW}{TW - DW} \times 100$$

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

اندازه‌گیری ترکیب‌های فنلی به وسیله روش‌هایی که از Folin-Ciocalteu به‌عنوان معرف و اسید گالیک به عنوان استاندارد استفاده می‌نمایند، انجام شد. محتوای فنلی به‌وسیله اسپکتروفتومتر (Shimadzu UV-160، ساخت ژاپن)، با روش Ouchikh و همکاران (۲۰۱۱) اندازه‌گیری شد. برای سنجش قند محلول برگ از روش فنل-سولفوریک (Kochert, 1978) استفاده شد. فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و کاتالاز بر اساس روش Giannopolitis و Ries (۱۹۷۷) اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری کادمیوم ریشه و اندام هوایی از روش Reeves و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه واریانس با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS نسخه ۹/۳ و مقایسه میانگین داده‌ها در سطح معنی‌دار ۱ و ۵ درصد با آزمون دانکن انجام شد.

نتایج و بحث

صفات رشدی

براساس نتایج تجزیه واریانس اثرات اصلی کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در سطح ۱ درصد ($P \leq 0.01$) و اثر متقابل کادمیوم و بیوچار و سلنیوم بر وزن خشک اندام هوایی در سطح ۵ درصد ($P \leq 0.05$) معنی‌دار شد (جدول ۳).

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گشنیز

میانگین مربعات		درجه آزادی		منابع تغییرات	
وزن خشک ریشه	وزن تر ریشه	وزن خشک اندام هوایی	وزن تر اندام هوایی		
۱/۴۵ **	۱۱/۴ **	۶/۳۵ **	۴۹/۱۶ **	۲	کادمیوم
۰/۵۱۳ **	۱/۶۴ **	۱/۱۰ **	۴/۰۶ **	۱	بیوچار
۰/۲۰۲ **	۰/۲۶۶ **	۰/۳۸ **	۱/۱۷ **	۱	سلنیوم
۰/۰۰۱۹ ns	۰/۰۳۰ ns	۰/۰۱۳ ns	۰/۰۰۴ ns	۲	کادمیوم × بیوچار
۰/۰۱۶ ns	۰/۰۰۵۲ ns	۰/۰۳۴ *	۰/۰۳۴ ns	۲	کادمیوم × سلنیوم
۰/۰۱۳ ns	۰/۰۴۷ ns	۰/۰۲۲ *	۰/۰۲۲ ns	۱	بیوچار × سلنیوم
۰/۰۰۳۶ ns	۰/۰۲۷ ns	۰/۰۲۳ *	۰/۰۸۳ ns	۲	کادمیوم × بیوچار × سلنیوم
۰/۰۰۹۳	۰/۰۲۱	۰/۰۰۶۹	۰/۰۶۶	۲۲	خطا
۴/۹۹	۲/۸۷	۲/۳۴	۲/۲۲	-	ضریب تغییرات (%)

** بیانگر معنی‌داری در سطح ۱ درصد، * بیانگر معنی‌داری در سطح ۵ درصد، ns بیانگر معنی‌داری عدم معنی‌داری.

بیشترین مقدار وزن تر اندام هوایی نیز با ۱۳/۵۰ گرم در تیمار شاهد مشاهده شد. تیمارهای کادمیوم ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک، وزن تر اندام هوایی را به ترتیب ۴/۰۳ و ۲۹/۸۵ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند. بیوچار سبب افزایش معنی‌دار وزن تر اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد شد.

جدول ۴- نتایج مقایسه میانگین اثرات کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر وزن تر اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه گشنیز

تیمار	سطوح	وزن تر اندام هوایی (گرم)	وزن تر ریشه (گرم)	وزن خشک ریشه (گرم)
-------	------	--------------------------	-------------------	--------------------

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی


۲/۲۲ ^a	۶/۰۰ ^a	۱۳/۵۰ ^a	شاهد	
۲/۰۳ ^b	۵/۱۰ ^b	۱۱/۷۹ ^b	۱۰ میلی گرم	کادمیوم
۱/۵۵ ^c	۴/۱۱ ^c	۹/۴۷ ^c	۲۰ میلی گرم	
۱/۸۱ ^b	۴/۸۸ ^b	۱۱/۲۵ ^b	شاهد	بیوچار
۲/۰۵ ^a	۵/۳۱ ^a	۱۱/۹۲ ^a	۵ درصد	
۱/۸۶ ^b	۵/۰۱ ^b	۱۱/۴۱ ^b	شاهد	سلنیوم
۲/۰۱ ^a	۵/۱۸ ^a	۱۱/۷۷ ^a	۲۰ میلی گرم	

مقدار وزن تر اندام هوایی در نتیجه تیمار بیوچار به میزان ۵/۹ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش پیدا کرد (جدول ۴). سلنیوم سبب افزایش معنی دار وزن تر اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد شد. براساس نتایج مقایسه میانگین مقدار وزن تر اندام هوایی در تیمار شاهد برابر ۱۱/۴۱ گرم بود که این مقدار در تیمار سلنیوم به ۱۱/۷۷ گرم رسید. مطابق با نتایج این تحقیق، چندین مطالعه نشان داده‌اند که سلنیوم می‌تواند باعث افزایش زیست توده گیاهی شود. تحقیقات نشان داده است که غلظت مناسب سلنیوم باعث بهبود رشد گیاهان می‌شود (Reis et al., 2018). کاهش تجمع زیست توده (عمدتاً وزن تر) تحت تنش کادمیوم ممکن است به دلیل تخریب کلروفیل باشد. تنش کادمیوم که بر ساختار کلروپلاست و غشای کلروپلاست تأثیر می‌گذارد، تبادل یونی را در کلروپلاست‌ها افزایش می‌دهد و آنزیم‌های ضروری چرخه کالوین را مهار می‌کند، محتوای کلروفیل را کاهش می‌دهد و در نهایت رشد گیاه را مهار می‌کند (Alyemeni et al., 2018).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد کادمیوم سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی شد اما تیمارهای بیوچار و سلنیوم با کاهش اثر کادمیوم، سبب بهبود وزن خشک اندام هوایی شدند. بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی با ۴/۵ گرم در تیمار کادمیوم صفر (شاهد) بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، تیمار بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر سبب افزایش ۱۴/۱۰ درصدی وزن خشک اندام هوایی نسبت به تیمار کادمیوم صفر (شاهد) و بیوچار صفر (شاهد) و سلنیوم (شاهد) شد (شکل ۱). کاربرد بیوچار به عنوان اصلاح کننده خاک به ترکیب فیزیکی و شیمیایی آن از جمله نوع ماده اولیه مصرفی، سطح ویژه و تخلخل بستگی دارد (Afshar et al., 2021 ; Zhang et al., 2020). هنگامی که بیوچار به خاک اضافه می‌شود، به دلیل سطح بار منفی، مساحت سطح بالا و خاصیت ترسیب کربن، به طور قابل توجهی بر سطح خاک، تخلخل، توزیع اندازه منافذ و ظرفیت نگهداری و ظرفیت تبادل کاتیونی آب و همچنین بسیاری از جنبه‌های شیمیایی و بیولوژیکی دیگر تأثیر می‌گذارد. افزایش حاصلخیزی خاک، رشد و استقرار گیاه را در شرایط تنش افزایش می‌دهد (Durukan et al., 2020).

بیوچار مواد مغذی را مستقیماً در خاک جذب کرده و حفظ می‌کند و ریشه گیاه متعاقباً آن‌ها را جذب می‌کند، بدون اینکه برای جذب آب نیاز به رشد بیشتر در زمین باشد. مطالعات بهبود قابل توجهی را در نرخ فتوسنتزی گیاه، پتانسیل آب آوند چوبی، محتوای کلروفیل، تولید هورمون گیاهی و زیست توده و رشد کلی با استفاده از بیوچار گزارش کرده‌اند (Semida et al., 2019).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.



شکل ۱- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کادمیوم، بیوجار و سeleniوم بر وزن خشک اندام هوایی گشنیز

مطابق با یافته‌های این تحقیق، رشد چندین گیاه با استفاده از بیوجار در شرایط تنش فلزات سنگین (Younis *et al.*, 2016) یا تنش کادمیوم (Abbas *et al.*, 2017) افزایش یافت. با توجه به خواص جذبی بیوجار با کاهش مواجهه گیاه با عوامل تنش یا با افزایش واکنش‌های تنش گونه‌های گیاهی، بیوجار برای کاهش اثرات مضر تنش گیاهی عمل می‌کند (Khan *et al.*, 2020). بنابراین ظرفیت بیوجار برای افزایش دسترسی به آب می‌تواند اثرات مضر کادمیوم را کاهش دهد. بیوجار مقادیر قابل توجهی یون مانند کادمیوم را در خاک جذب می‌کند. از سوی دیگر، ویژگی‌های بیوجار مانند تخلخل و مساحت سطح خاص که تحت تأثیر شرایط پیرولیز و انواع مواد خام است که بر کیفیت بیوجار تأثیر می‌گذارد تا اتصال آب خاک و گیاه را افزایش دهد (Khan *et al.*, 2020). کادمیوم وزن تر ریشه را به طور معنی‌داری کاهش داد به طوری که در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک کمترین مقدار وزن تر ریشه (۴/۱۱ گرم) مشاهده شد. براساس نتایج مقایسه میانگین، بیوجار سبب افزایش معنی‌دار وزن تر ریشه نسبت به تیمار شاهد شد (جدول ۴). گزارش شده است که بیوجار می‌تواند رشد گیاه را عمدتاً به دلیل افزایش در دسترس بودن مواد مغذی و بهبود خواص فیزیکی خاک از جمله کاهش چگالی ظاهری افزایش دهد (Windeatt *et al.*, 2014). بیوجار با گروه‌های عاملی فعال خواص شیمیایی خاک مانند ظرفیت تبادل کاتیونی را بهبود می‌بخشد و دسترسی گیاه به مواد مغذی و در نتیجه رشد بهتر گیاه را افزایش می‌دهد (Keabetswe *et al.*, 2019). تیمار سeleniوم سبب افزایش معنی‌دار وزن تر ریشه نسبت به تیمار شاهد شد. مقدار وزن تر ریشه در تیمار شاهد برابر ۵/۰۱ گرم بود در حالی که این مقدار در تیمار سeleniوم برابر ۵/۱۸ درصد بود. کادمیوم سبب کاهش معنی‌دار وزن خشک ریشه شد. در تحقیقات پیشین نشان داده شد که محلول‌پاشی برگی سeleniوم بخصوص در فرم نانو نه تنها سبب بهبود رشد و وزن تر گیاه و رنگیزه‌های فتوسنتزی می‌شود، بلکه متابولیسم، عناصر مغذی و میزان آنزیم آنتی‌اکسیدانی پراکسیداز و میزان مالون دی‌آلدئید را بهبود می‌بخشد و سبب کاهش آسیب‌های تنش شوری می‌گردد (Muñoz-Muñoz *et al.*, 2009). با افزایش سطح کادمیوم، مقدار وزن خشک ریشه روند کاهشی معنی‌داری پیدا کرد به طوری که در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم، کمترین مقدار وزن خشک ریشه (۱/۵ گرم) مشاهده شد. بیوجار وزن خشک ریشه را به طور معنی‌داری افزایش داد. مقدار وزن خشک ریشه در تیمار شاهد برابر ۱/۸۱ گرم

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

بود که این مقدار در تیمار بیوچار با افزایش ۱۳/۱۵ درصدی به ۲/۰۵ گرم رسید (جدول ۴). ریشه‌های گیاه روی بسترهای حاوی بیوچار به خوبی رشد می‌کنند. با بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی ریزوسفر، کاهش مقاومت خاک در برابر رشد ریشه مشاهده می‌شود (Altland and Locke, 2013). همچنین می‌تواند نفوذپذیری آب خاک را بهبود بخشد و نفوذ ریشه را تسهیل کند و کلونیزاسیون ریشه در حجم بزرگتر خاک را افزایش دهد (Atkinson et al., 2010). سلنیوم وزن خشک ریشه را به طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. مقدار وزن خشک ریشه در تیمار شاهد برابر ۱/۸۶ گرم بود در حالی که این مقدار در تیمار سلنیوم برابر ۲/۰۱۱ گرم بود. تیمار سلنیوم، وزن خشک ریشه را به میزان ۸/۰۶ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (جدول ۴). در تحقیقی که بر روی گیاه گوجه گیلاسی جهت بررسی اثر نانوذره سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمی گیاه گوجه گیلاسی (*Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme*) انجام شد. محلول‌پاشی برگ با غلظت ۴ میلی‌گرم بر لیتر نانوسلنیوم بیشترین تاثیر را در بهبود وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، طول بخش هوایی، محتوای کلروفیل برگ و میزان برخی عناصر در برگ داشت (Neysanian et al., 2021).

رنگدانه‌های فتوسنتزی و محتوای آب نسبی برگ

براساس نتایج تجزیه واریانس اثرات اصلی کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و محتوای نسبی آب برگ در سطح ۱ درصد ($P \leq 0.01$) معنی‌دار شد. اثر متقابل بیوچار و سلنیوم بر کلروفیل a در سطح ۱ درصد ($P \leq 0.01$) و بر کلروفیل کل در سطح ۵ درصد ($P \leq 0.05$) معنی‌دار شد (جدول ۵).


جدول ۵- نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ گشنیز

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات		
		کلروفیل a	کلروفیل b	کلروفیل کل
کادمیوم	۲	۰/۲۷۶ **	۰/۰۳۷ **	۰/۴۷ **
بیوچار	۱	۰/۰۶۲ **	۰/۰۱۱ **	۰/۱۲۶ **
سلنیوم	۱	۰/۰۳۷ **	۰/۰۰۷۸ **	۰/۰۸۹ **
کادمیوم × بیوچار	۲	۰/۰۰۰۰۸ ns	۰/۰۰۰۰۵ ns	۰/۰۰۰۰۱ ns
کادمیوم × سلنیوم	۲	۰/۰۰۰۰۵ ns	۰/۰۰۰۰۰۳ ns	۰/۰۰۰۱۲ ns
بیوچار × سلنیوم	۱	۰/۰۰۵۸ **	۰/۰۰۰۳۳ ns	۰/۰۰۰۷۸ *
کادمیوم × بیوچار × سلنیوم	۲	۰/۰۰۰۰۲۸ ns	۰/۰۰۰۰۲۲ ns	۰/۰۰۰۲۵ ns
خطا	۲۲	۰/۰۰۰۰۴۴	۰/۰۰۰۰۰۲	۰/۰۰۰۰۱۳
ضریب تغییرات (%)	-	۲/۰۷	۳/۸۱	۲/۴۴

** بیانگر معنی‌داری در سطح ۱ درصد، * بیانگر معنی‌داری در سطح ۵ درصد، ns بیانگر معنی‌داری عدم معنی‌داری.

تیمار بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی‌گرم در لیتر، مقدار کلروفیل a را نسبت به تیمار شاهد (عدم استفاده بیوچار و سلنیوم) به میزان ۱۶ درصد افزایش دادند (شکل ۲-الف). کاربرد بیوچار مقدار کلروفیل a و b را عمدتاً به دلیل بهبود جذب منیزیم و نیتروژن به‌عنوان درشت مغذی‌های ضروری برای بیوسنتز کلروفیل افزایش داد (Zargar Shooshtari et al., 2020).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.



شکل ۲- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل بیوچار و سلنیوم بر کلروفیل a گشنیز (الف) و کلروفیل کل (ب)

کادمیوم، مقدار کلروفیل b را به طور معنی داری کاهش داد. تیمارهای کادمیوم ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، مقدار کلروفیل b را به ترتیب ۱۰/۳۱ و ۲۳/۲۹ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند (جدول ۶). اثرات نامطلوب بر رنگدانه فتوسنتزی در گیاهان تحت تنش کادمیوم نیز نتیجه انواع برهمکنش های کادمیوم در متابولیسم گیاه است. یکی از عوامل ممکن است افزایش تولید کلروفیل باشد که اعتقاد بر این است که فرآیند بیوسنتز کلروفیل و کاروتنوئیدها را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث تخریب کلروفیل می شود (Saini and Dhania, 2020; Saleh *et al.*, 2020). بیوچار سبب افزایش معنی دار کلروفیل b نسبت به تیمار شاهد شد. سلنیوم سبب افزایش معنی دار کلروفیل b نسبت به تیمار شاهد شد. مقدار کلروفیل b در تیمار شاهد برابر ۰/۳۵۱ میلی گرم در گرم بود در حالی که این مقدار در تیمار سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر به ۰/۳۸۱ میلی گرم در گرم رسید. تیمار سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر، مقدار کلروفیل b را به میزان ۸/۳۶ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (جدول ۶). بیوچار و سلنیوم هر دو سبب افزایش معنی دار کلروفیل کل نسبت به تیمار شاهد شدند.

جدول ۶- نتایج مقایسه میانگین اثرات کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر کلروفیل b و محتوی آب نسبی برگ گشنیز

تیمار	سطوح	کلروفیل b (میلی گرم بر گرم وزن تر)	محتوی آب نسبی برگ (درصد)
کادمیوم	شاهد	۰/۴۱۰ a	۹۰/۰۸ a
	۱۰ میلی گرم	۰/۳۷۰ b	۷۹/۸۳ b
	۲۰ میلی گرم	۰/۳۰۰ c	۷۳/۳۳ c
بیوچار	شاهد	۰/۳۴۷ b	۷۹/۳۸ b
	۵ درصد	۰/۳۸۳ a	۸۲/۷۷ a
	شاهد	۰/۳۵۱ b	۸۲/۴۴ b
سلنیوم	۲۰ میلی گرم	۰/۳۸۱ a	۷۹/۷۲ a

بیشترین مقدار کلروفیل کل با ۱/۶ میلی گرم در گرم در تیمار بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. کمترین مقدار کلروفیل کل نیز با ۱/۳۸ میلی گرم در گرم در تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار و سلنیوم)

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

مشاهده شد. تیمار بیوچار ۵ درصد حجم و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر، مقدار کلروفیل کلر به میزان ۱۵/۷۵ درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار و سلنیوم) افزایش دادند (شکل ۲-ب). بیوچار به عنوان منبع غذایی و همچنین یک مبدل کاتیونی مناسب به دلیل سطح وسیعی که دارد و در نتیجه در دسترس بودن مواد مغذی و جذب بیشتر آن‌ها توسط ریشه گیاه عمل می‌کند. علاوه بر این، افزایش pH خاک اصلاح شده توسط بیوچار پیامدهایی بر کانی‌سازی و در دسترس بودن مواد مغذی عمدتاً در رابطه با کاتیون‌های پایه مانند کلسیم، منیزیم و پتاسیم دارد. استفاده از بیوچار و ورمی‌کمپوست باعث افزایش محتوای کلروفیل، فتوسنتز برگ و تولید زیست توده در مطالعات دیگر شده است (Wang et al., 2017). سلنیوم باعث جلوگیری از تخریب کلروفیل در گیاهان در معرض تنش‌های محیطی می‌شود (Oraghi et al., 2019). نقش تنظیم‌کنندگی سلنیوم در وضعیت آبی گیاه تحت شرایط تنش خشکی نیز بررسی و اثرات حفاظتی آن به اثبات رسیده است (Elemike et al., 2019).

کمترین مقدار محتوای نسبی آب برگ نیز با ۷۳/۳۳ درصد در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. تیمارهای کادمیوم ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، مقدار محتوای نسبی آب برگ را به ترتیب ۱۱/۳۷ و ۱۸/۵۹ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند (جدول ۶). محتوای نسبی آب نشانگر وضعیت آب در گیاهان است. محتوای نسبی آب برگ رابطه بین تأمین آب به بافت برگ و میزان تعرق است (Lugojan and Ciulca, 2011). آب در تمام فرآیندهای متابولیک سلول گیاهی نقش اساسی دارد. توانایی گیاه برای بازیابی از تنش و عملکرد متعاقب آن به محتوای نسبی آب بستگی دارد. کاهش سطح آب باعث می‌شود سلول‌های گیاهی کاهش فشار تورژسانس را تجربه کنند که منجر به آسیب سلولی و پژمردگی کلی و کاهش رشد گیاهان می‌شود. محتوای نسبی بالای آب به گیاه کمک می‌کند تا گونه‌های فعال اکسیژن و تنش‌های اسمزی ناشی از خشکی را خنثی کند و به طور بالقوه به بازده بیشتر کمک کند. هدایت هیدرولیکی گیاه میزان جذب آب توسط ریشه و حرکت آن از طریق ساقه است. گیاهان تحت شرایط تنش معمولاً کاهش در هدایت هیدرولیکی را تجربه می‌کنند که به نوبه خود بر محتوای نسبی آب تأثیر می‌گذارد (García et al., 2017; Ngumbi and Kloepper, 2016). در پی استفاده از سلنیوم در خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت نگهداری آب در خاک و جذب و انتقال آب و عناصر در گیاه افزایش می‌یابد (Shahid et al., 2019).

بیوچار سبب افزایش معنی‌دار محتوای نسبی آب برگ نسبت به تیمار شاهد شد. مقدار محتوای نسبی آب برگ در تیمار شاهد برابر ۷۹/۳۸ درصد بود که این مقدار در تیمار بیوچار ۵ درصد حجمی به ۸۲/۷۷ درصد رسید. سلنیوم، محتوای نسبی آب برگ را به طور معنی‌داری افزایش داد. بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ با ۸۲/۴۴ درصد در تیمار سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. مقدار محتوای نسبی آب برگ در تیمار شاهد نیز برابر ۷۹/۷۲ درصد بود (جدول ۶).

صفات شیمیایی و بیوشیمیایی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثرات اصلی کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر کادمیوم ریشه و اندام هوایی، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول در سطح ۱ درصد ($P \leq 0.01$) معنی‌دار شد. اثر متقابل کادمیوم و بیوچار و کادمیوم و سلنیوم بر کادمیوم ریشه و اندام هوایی، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول در سطح ۱ درصد ($P \leq 0.01$) معنی‌دار شد. اثر متقابل بیوچار و سلنیوم بر کادمیوم ریشه در سطح ۵ درصد ($P \leq 0.05$)، کادمیوم اندام هوایی، فنل کل، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول و کادمیوم اندام هوایی در سطح یک درصد ($P \leq 0.01$) معنی‌دار شد. اثر متقابل کادمیوم و بیوچار و سلنیوم بر کادمیوم ریشه و اندام هوایی در سطح ۵ درصد ($P \leq 0.05$) معنی‌دار شد (جدول ۷).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

جدول ۷- نتایج تجزیه واریانس اثر کادمیوم، بیوچار و سلنیوم بر صفات شیمیایی و بیوشیمیایی گشیز


میانگین مربعات						
منابع تغییرات	درجه آزادی	کادمیوم ریشه (میلی گرم در گرم)	کادمیوم اندام هوایی (میلی گرم در گرم)	فنل کل (میلی گرم گالیک اسید در وزن خشک)	سوپر اکسید دیسموتاز (واحد آنزیمی در میلی گرم پروتئین)	قند محلول (میلی گرم در گرم)
کادمیوم	۲	۱۰۰/۵۹ **	۲۴/۹۵ **	۱/۹۶ **	۴۳/۵۵ **	۳۱/۷۶ **
بیوچار	۱	۴/۶۹ **	۱/۱۴ **	۰/۳۸۰ ns	۱/۸۴ **	۲/۳۵ **
سلنیوم	۱	۳/۰۰۴ **	۱/۰۶۷ **	۵/۲۱ **	۱/۹۸ **	۳/۸۶ **
کادمیوم × بیوچار	۲	۱/۹۷ **	۰/۳۲۵ **	۰/۲۲۸ ns	۱/۰۹ **	۰/۲۸۷ *
کادمیوم × سلنیوم	۲	۱/۰۸۴ **	۰/۳۵۰ **	۰/۱۰۰ ns	۰/۹۴۴ **	۰/۸۰ **
بیوچار × سلنیوم	۱	۰/۴۴۸ *	۰/۴۰۰ **	۳/۶۷ **	۰/۵۷۲ **	۲/۳۵ **
کادمیوم × بیوچار × سلنیوم	۲	۰/۲۲۸ *	۰/۱۳۰ *	۰/۱۱۶ ns	۰/۰۹۶ ns	۰/۵۴ ns
خطا	۲۲	۰/۰۸۵	۰/۰۳۲	۰/۲۸۰	۰/۰۶۷	۰/۰۷۱
ضریب تغییرات (%)	-	۱۰/۳۱	۱۱/۵۴	۳/۱۸	۴/۸۲	۳/۱۷

** بیانگر معنی داری در سطح ۱ درصد، * بیانگر معنی داری در سطح ۵ درصد، ns بیانگر معنی داری عدم معنی داری.

کادمیوم سبب افزایش مقدار کادمیوم ریشه شد اما استفاده از تیمارهای بیوچار و سلنیوم سبب کاهش مقدار کادمیوم ریشه شد. بیشترین مقدار کادمیوم ریشه با ۷/۴۶ میلی گرم در گرم در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک و بیوچار صفر (شاهد) و سلنیوم صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، تیمارهای بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مقدار کادمیوم ریشه را به میزان ۳۷/۵ درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار و سلنیوم) کاهش داد (شکل ۳). در خاک‌های آلوده به کادمیوم، کلید تولید غذای ایمن، کاهش محتوای کادمیوم در قسمت‌های خوراکی گیاهان است (Rizwan et al., 2016). مطابق با یافته‌های این تحقیق، غلظت کادمیوم با استفاده از بیوچار در برخی از گیاهان مانند اسفناج (Khan et al., 2020) کاهش یافت. گزارش شده است که نوع کادمیوم در خاک توسط بیوچار اصلاح می‌شود که ممکن است جذب آن توسط گونه‌های گیاهی را کاهش دهد (Rizwan et al., 2016; Qiu et al., 2020). کاهش غلظت کادمیوم پس از استفاده از بیوچار ممکن است در نتیجه کاهش غلظت کادمیوم آب منفذی یا افزایش سطوح کادمیوم متصل به ماده آلی خاک باشد (Lu et al., 2017).


این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی



شکل ۳- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کادمیوم و بیوچار و سلنیوم بر کادمیوم ریشه گشیز

بیوچار و سلنیوم با کاهش اثر کادمیوم، میزان کادمیوم اندام هوایی را به طور معنی داری کاهش دادند. بیشترین مقدار کادمیوم اندام هوایی با $3/73$ میلی گرم در گرم در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم و بیوچار صفر (شاهد) و سلنیوم صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم، تیمارهای بیوچار ۵ درصد و سلنیوم ۲۰ میلی گرم، مقدار کادمیوم اندام هوایی را به میزان $35/71$ درصد کاهش دادند (شکل ۴). ارزیابی تحقیقات قبلی نشان داده است که بیوچار می تواند تأثیر مضر فلزات سنگین را کاهش دهد، که ممکن است به دلیل مکانیسم های مختلف از جمله افزایش جذب یون های مضر با استفاده از بیوچار، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و در دسترس بودن رطوبت باشد. خاکی که می تواند یون های موجود در محلول خاک را رقیق کند که منجر به کاهش سمیت یونی برای محصولات می شود (Jing *et al.*, 2020; Qiu *et al.*, 2020; Khan *et al.*, 2020)




شکل ۴- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کادمیوم و بیوچار و سلنیوم بر کادمیوم اندام هوایی گشیز

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

کمترین مقدار فنل کل در تیمارهای بیوچار صفر (شاهد) و سلنیوم صفر (شاهد) مشاهده شد. بیشترین مقدار فنل کل نیز در تیمارهای بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم صفر (شاهد)، بیوچار ۵ درصد حجمی و سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد (شکل ۵).



شکل ۵- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل بیوچار و سلنیوم بر فنل کل گشنیز.

فنل و فلاونوئید که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی هستند در پاسخ به افزایش گونه‌های فعال اکسیژن تحت تنش‌های زنده و غیر زنده تحریک می‌شود. آن‌ها در بافت‌های گیاهی به وفور وجود دارند. این ترکیبات مستقیماً گونه‌های مولکولی اکسیژن فعال را از بین ببرند و ممکن است با به دام انداختن رادیکال لیپیدی آلکوکسیل، پراکسیداسیون لیپیدی را متوقف کنند. علاوه بر این، فلاونوئیدها توسط پراکسیداز اکسید می‌شوند و به عنوان مهارکننده H_2O_2 عمل می‌کنند (Bartwal *et al.*, 2013).


کادمیوم سبب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز شد اما بیوچار با تعدیل اثر کادمیوم سبب کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به تیمار شاهد شد. بیشترین مقدار آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز $8/03$ واحد آنزیمی در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک و بیوچار صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم، بیوچار ۵ درصد حجمی سبب کاهش $13/15$ درصدی فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار) شد (شکل ۶- الف). تنش کادمیوم در گیاهان همچنین منجر به تغییرات شدید در فعالیت آنزیم به دلیل استرس اکسیداتیو در سلول‌های گیاهی می‌شود (Gupta *et al.*, 2019). مطالعات نشان داده‌اند که کادمیوم اضافی باعث تولید بیش از حد گونه‌های فعال اکسیژن مانند H_2O_2 ، O_2 و OH در سلول‌ها می‌شود. تشکیل رادیکال‌های آزاد باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های مختلف از جمله سوپر اکسید دیسموتاز می‌شود (Pandey and Dubey, 2016). آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان خط مقدم حفاظت گیاه در برابر گونه‌های فعال اکسیژن در هر دو شرایط زیستی و غیر زنده هستند. شرایط استرس‌زا اغلب منجر به تجمع بیش از حد گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود که باعث استرس اکسیداتیو می‌شود. از بین بردن گونه‌های فعال اکسیژن به طور مستقیم با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز مرتبط است. فعالیت این آنزیم‌ها به طور کلی با افزایش شدت تنش افزایش می‌یابد (Scherer *et al.*, 2013).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.



شکل ۶- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کادمیوم و بیوچار بر سوپر اکسید دیسموتاز (الف) و قند محلول (ب)


سلنیوم با تعدیل اثر کادمیوم سبب کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به تیمار شاهد شد. بیشترین مقدار آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با ۷/۹۷ واحد آنزیمی در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم و بیوچار صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، سلنیوم ۲۰ میلی گرم در لیتر سبب کاهش ۱۱/۸۲ درصدی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار) شد (شکل ۷- الف).



شکل ۷- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کادمیوم و سلنیوم بر سوپر اکسید دیسموتاز (الف) و قند محلول (ب)

تیمارهای بیوچار و سلنیوم هر دو سبب کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز نسبت به تیمار شاهد شدند. بیشترین میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با ۵/۹۸ واحد آنزیمی در تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوچار و سلنیوم) مشاهده شد. مقدار آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در سایر تیمارها تفاوت معنی داری با هم نداشتند (شکل ۷- ب).

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.



شکل ۸- نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل بیوچار و سلینوم بر سوپر اکسید دیسموتاز (الف) و قند محلول (ب)

کادمیوم مقدار قند محلول را به طور معنی داری افزایش داد اما بیوچار با تعدیل اثر کادمیوم سبب کاهش قند محلول شد. بیشترین مقدار قند محلول با ۱۰/۴۶ میلی گرم در گرم در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم و بیوچار صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، بیوچار ۵ درصد حجمی مقدار قند محلول را به میزان ۵/۳۳ درصد کاهش داد این مقدار در تیمار کادمیوم ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم برابر ۹ درصد بود (شکل ۶-ب). در شرایط تنش، افزایش کل قندهای محلول، غشاهای مختلف و ساختارهای سلولی مختلف را از تأثیرات مضر استرس حفظ می کند. با افزایش قندهای محلول در شرایط تنش، ذخیره کربوهیدرات گیاهان در سطح مطلوب برای حمایت از متابولیسم پایه حفظ می شود. علاوه بر این، افزایش غلظت قند در گیاهان مرتبط با کاهش آب در سلولها عامل مهمی در کاهش رشد گیاه است (Rohani et al., 2019). تحقیقات نشان داده است کاربرد بیوچار باعث افزایش فتوسنتز، محتوای کلروفیل، سرعت تعرق، فلاونوئید کل، قند و گلوکز در گیاهان مختلف مانند بادام زمینی، گوجه فرنگی، کاهو و ذرت شده است (Agegnehu et al., 2015; Petrucelli et al., 2015; Speratti et al., 2018). در تحقیقات دیگر کاربرد بیوچار به طور قابل توجهی قند کل ریحان را در مقایسه با شاهد افزایش داد (Petrucelli et al., 2015).

بیشترین مقدار قند محلول با ۱۰/۶۸ میلی گرم در گرم در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک و سلینوم صفر (شاهد) مشاهده شد. در تیمارهای کادمیوم ۲۰ و ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، سلینوم ۲۰ میلی گرم در لیتر مقدار قند محلول را به ترتیب ۹/۶ و ۱۰/۱۱ درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد سلینوم) کاهش دادند (شکل ۷-ب). احتمالاً اثر سلینوم در فراتنظیمی متابولیسم کربوهیدرات می تواند به اثر تحریک کنندگی فتوسنتز آن کمک کند (Feng et al., 2013). تیمارهای بیوچار و سلینوم سبب کاهش معنی داری قند محلول نسبت به تیمار شاهد شدند. بیشترین مقدار قند محلول با ۹/۲۵ میلی گرم در گرم در تیمار بیوچار صفر (شاهد) و سلینوم صفر (شاهد) مشاهده شد. مقدار قند محلول در سایر تیمارها تفاوت معنی داری با هم نداشتند (شکل ۸-ب).

بیوچار به عنوان تهویه کننده خاک، حاوی مواد مغذی گیاهی است با این حال، بهتر است از بیوچار همراه با مواد مغذی اضافی برای بهبود عملکرد آن استفاده شود. مطالعات دیگر نشان داده است که بیوچار مواد مغذی را در برابر شستشو حفظ می کند. که به طور بالقوه باعث بهبود کارایی مواد مغذی به کار رفته در کنار بیوچار می شود (Agegnehu et al., 2015). منع مواد بیوچار به شدت بر محتوا و در دسترس بودن عناصر غذایی در خاک پس از اصلاح تأثیر

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

می‌گذارد. خواص شیمیایی خاک پس از اصلاح به شدت تحت تأثیر منبع بیوچار اعمال شده قرار خواهد گرفت (Major Pandey, et al., 2010). همکاران (۲۰۱۶) دریافتند که بیوچار باعث افزایش عملکرد اسانس ریحان شد.

نتیجه‌گیری کلی

فنل کل گشنیز در نتیجه تنش کادمیوم تا سطح ۱۰ میلی‌گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرد اما در تیمار کادمیوم ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم به‌طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. محلول‌پاشی سلنیوم سبب افزایش صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و فنل کل و کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول شد. بیوچار نیز با بهبود وضعیت خاک سبب افزایش صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و فنل کل و کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و قند محلول شد. شناخت منابع خاک در یک منطقه و اتخاذ گزینه‌های مدیریتی برای بهبود بهره‌وری خاک برای استفاده پایدار ضروری است. استفاده از بیوچار به‌عنوان یک اصلاح‌کننده خاک با کود معدنی و سایر اصلاحات آلی با بهبود خواص خاک مانند pH خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر موجود و کاتیون‌های قابل تعویض، بهره‌وری کشاورزی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

منابع

- Abbas, T., Rizwan, M., Ali, S., Zia-ur-Rehman, M., Qayyum, M. F., Abbas, F. & Ok, Y. S. (2017). Effect of biochar on cadmium bioavailability and uptake in wheat (*Triticum aestivum* L.) grown in a soil with aged contamination. *Ecotoxicology and environmental safety*, 140, 37-47. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.02.028>
- Afshari, M., Pazoki, A. & Sadeghipour, O. (2021). Foliar-applied Silicon and its Nanoparticles Stimulates Physio-chemical Changes to Improve Growth, Yield and Active Constituents of Coriander (*Coriandrum Sativum* L.) Essential oil Under Different Irrigation Regimes. *Silicon*, 13, 4177-4188. <https://doi.org/10.1007/s12633-021-01101-8>
- Agegehu, G., Bass, A. M., Nelson, P. N., Muirhead, B., Wright, G. & Bird, M. I. (2015). Biochar and biochar-compost as soil amendments: effects on peanut yield, soil properties and greenhouse gas emissions in tropical North Queensland, Australia. *Agriculture, ecosystems & environment*, 213, 72-85. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.07.027>
- Ali, S., Rizwan, M., Qayyum, M. F., Ok, Y. S., Ibrahim, M., Riaz, M. & Shahzad, A. N. (2017). Biochar soil amendment on alleviation of drought and salt stress in plants: a critical review. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(14), 12700-12712. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-8904-x>
- Altland, J. E. & Locke, J. C. (2013). Effect of biochar type on macronutrient retention and release from soilless substrate. *Hort Science*, 48(11), 1397-1402. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.48.11.1397>
- Alyemeni, M. N., Ahanger, M. A., Wijaya, L., Alam, P., Bhardwaj, R. & Ahmad, P. (2018). Selenium mitigates cadmium-induced oxidative stress in tomato (*Solanum lycopersicum* L.) plants by modulating chlorophyll fluorescence, osmolyte accumulation, and antioxidant system. *Protoplasma*, 255(2), 459-469. <https://doi.org/10.1007/s00709-017-1162-4>
- Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. *Plant physiology*, 24(1), 1-15. <https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1>
- Atkinson, C. J., Fitzgerald, J. D. & Higgs, N. A. (2010). Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: a review. *Plant and soil*, 337(1), 1-18. <https://doi.org/10.1007/s11104-010-0464-5>
- Babashpour-Asl, M., Farajzadeh-Memari-Tabrizi, E. & Yousefpour-Dokhanieh, A. (2022). Foliar-applied selenium nanoparticles alleviate cadmium stress through changes in physio-biochemical status and essential oil profile of coriander (*Coriandrum sativum* L.) leaves. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(53): 80021-80031. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19941-1>
- Bakhtiari, M., Mozafari, H., Asl, K. K., Sani, B. & Mirza, M. (2020). Bio-organic and inorganic fertilizers modify leaf nutrients, essential oil properties, and antioxidant capacity in medic savory (*Satureja*

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

- macrantha* L.). *Journal of Biological Research-Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale*, 93(1). <https://doi.org/10.4081/jbr.2020.8477>
- Balakhnina, T. I. & Nadezhkina, E. S. (2017). Effect of selenium on growth and antioxidant capacity of *Triticum aestivum* L. during development of lead-induced oxidative stress. *Russian journal of plant physiology*, 64(2), 215-223. <https://doi.org/10.1134/S1021443717010022>
- Bartwal, A., Mall, R., Lohani, P., Guru, S. K., & Arora, S. (2013). Role of secondary metabolites and brassinosteroids in plant defense against environmental stresses. *Journal of Plant Growth Regulation*, 32(1), 216–232. <https://doi.org/10.1007/s00344-012-9272-x>
- Broadley, M.R., Alcock, J., Alford, J., Cartwright, P., Foot, I., Fairweather-Tait, S.J., Hart, D.J., Hurst, R., Knott, P., Mcgrath, S.P., et al., (2010). Selenium biofortification of high-yielding winter wheat (*Triticum aestivum* L.) by liquid or granular Se fertilization. *Plant Soil*, 332, 5–18. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0234-4>
- Durukan, H., Demirbas, A. & Turkecul, I. (2020). Effects of biochar rates on yield and nutrient uptake of sugar beet plants grown under drought stress. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 51(21), 2735-2745. <https://doi.org/10.1080/00103624.2020.1849257>
- Elemike, E.E., Uzoh, I.M., Onwudiwe, D.C. & Babalola, O.O. (2019). The Role of Nanotechnology in the Fortification of Plant Nutrients and Improvement of Crop Production. *Applied Sciences*. 9, 499. <https://doi.org/10.3390/app9030499>
- El-Saadony, M. T., Saad, A. M., Najjar, A. A., Alzahranī, S. O., Alkhatib, F. M., Shafi, M. E. & Hassan, M. A. (2021). The use of biological selenium nanoparticles to suppress *Triticum aestivum* L. crown and root rot diseases induced by *Fusarium* species and improve yield under drought and heat stress. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 28, 4461-4471. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.04.043>
- Feng, R., Wei, C. & Tu, S. (2013). The roles of selenium in protecting plants against abiotic stresses. *Environmental and experimental botany*, 87, 58-68. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2012.09.002>
- García, J. E., Maroniche, G., Creus, C., Suárez-Rodríguez, R., Ramirez-Trujillo, J. A. & Groppa, M. D. (2017). *In vitro* PGPR properties and osmotic tolerance of different Azospirillum native strains and their effects on growth of maize under drought stress. *Microbiological Research*, 202, 21-29. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2017.04.007>
- Ghasemian, S., Masoudian, N., Saeid Nematpour, F. & Safipour Afshar, A. (2021). Selenium nanoparticles stimulate growth, physiology, and gene expression to alleviate salt stress in *Melissa officinalis*. *Biologia*, 76(10), 2879-2888. <https://doi.org/10.1007/s11756-021-00854-2>
- Giannopolitis, C.N. & Ries, S.K. (1977) Superoxide Dismutases I. Occurrence in Higher Plants. *Plant Physiology*, 59, 309-314. <http://dx.doi.org/10.1104/pp.59.2.309>
- Gupta, M. & Gupta, S. (2017). An Overview of Selenium Uptake, Metabolism, and Toxicity in Plants. *Frontiers in Plant Science*, 7, 2074. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02074>
- Gupta, N., Yadav, K. K., Kumar, V., Kumar, S., Chadd, R. P. & Kumar, A. (2019). Trace elements in soil-vegetables interface: translocation, bioaccumulation, toxicity and amelioration-a review. *Science of the Total Environment*, 651, 2927-2942. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.047>
- Ikram, M., Raja, N. I., Javed, B., Hussain, M., Hussain, M., Ehsan, M. & Akram, A. (2020). Foliar applications of bio-fabricated selenium nanoparticles to improve the growth of wheat plants under drought stress. *Green Processing and Synthesis*, 9(1), 706-714. <https://doi.org/10.1515/gps-2020-0067>
- Inbar, J., Abramsky, M., Cohen, D. & Chet, I. (1994). Plant growth enhancement and disease control by *Trichoderma harzianum* in vegetable seedlings grown under commercial conditions. *European Journal of Plant Pathology*, 100(5), 337-346. <https://doi.org/10.1007/BF01876444>
- Jing, F., Chen, C., Chen, X., Liu, W., Wen, X., Hu, S. & Yu, Q. (2020). Effects of wheat straw derived biochar on cadmium availability in a paddy soil and its accumulation in rice. *Environmental Pollution*, 257, 113592. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113592>
- Keabetswe, L., Shao, G. C., Cui, J., Lu, J. & Stimela, T. (2019). A combination of biochar and regulated deficit irrigation improves tomato fruit quality: A comprehensive quality analysis. *Folia Horticulturae*, 31(1), 181-193. <https://doi.org/10.2478/fhort-2019-0013>
- Khan, A. Z., Ding, X., Khan, S., Ayaz, T., Fidel, R., & Khan, M. A. (2020). Biochar efficacy for reducing heavy metals uptake by Cilantro (*Coriandrum sativum*) and spinach (*Spinacia oleracea*) to minimize human health risk. *Chemosphere*, 244, 125543. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125543>

- Kochert, G. (1978). Carbohydrate determination by the phenol-sulfuric acid method. *Handbook of phycological methods, Phycological and biochemical methods*, 95-97. <https://doi.org/10.1016/j.ab.2004.12.001>
- Lu, K., Yang, X., Gielen, G., Bolan, N., Ok, Y. S., Niazi, N. K. & Wang, H. (2017). Effect of bamboo and rice straw biochars on the mobility and redistribution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) in contaminated soil. *Journal of environmental management*, 186, 285-292. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.068>
- Lugojan, C. & Ciulca, S. (2011). Evaluation of relative water content in winter wheat. *Forest. Biotechnol.* 15, 173–177.
- Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S. J. & Lehmann, J. (2010). Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. *Plant and soil*, 333(1), 117-128. <https://doi.org/10.1007/s11104-010-0327-0>
- Manzoor, F., Wei, L., Nurunnabi, M., Subhan, Q. A., Shah, S. I.A. & Fallatah, S. (2019). The Impact of Transformational Leadership on Job Performance and CSR as Mediator in SMEs. *Sustainability*, 11, 436. <https://doi.org/10.3390/su11020436>
- Memari-Tabrizi, E. F., Yousefpour-Dokhanieh, A. & Babashpour-Asl, M. (2021). Foliar-applied silicon nanoparticles mitigate cadmium stress through physio-chemical changes to improve growth, antioxidant capacity, and essential oil profile of summer savory (*Satureja hortensis* L.). *Plant Physiology and Biochemistry*, 165, 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.04.040>
- Muñoz-Muñoz, J.L., García-Molina, F., García-Ruiz, P.A., Arribas, E., Tudela, J., García-Cánovas, F. & Rodríguez-López, J.N. (2009). Enzymatic and chemical oxidation of trihydroxylated phenols. *Food Chemistry*, 113, 435–444. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.07.076>
- Neysanian, M., Ahmadvand, R., Oraghi Ardebili, Z. & Ebadi, M. (2021). The effect of Selenium nanoparticles on some morphological and anatomical features of cherry tomato plants (*Solanum lycopersicum* L. var. *cerasiforme*). *Developmental Biology*, 13(3), 39-54. <https://doi.org/10.30495/jdb.2021.686361>
- Ngumbi, E. & Kloepper, J. (2016). Bacterial-mediated drought tolerance: current and future prospects. *Applied Soil Ecology*, 105, 109-125. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2016.04.009>
- Nourzad, S., Ahmadian, A. & Moghaddam, M. (2015). Proline, Total Chlorophyll, Carbohydrate Amount and Nutrients Uptake in Coriander (*Coriandrum Sativum* L.) under Drought Stress and Fertilizers Application. *Iranian Journal of Field Crops Research*, 13(1), 131-139. <https://doi.org/10.22067/gsc.v13i1.26013>
- Oraghi Ardebili, N., Iranbakhsh, A. & Oraghi Ardebili, Z. (2019). Efficiency of selenium and salicylic acid protection against salinity in soybean. *Plant Physiology*, 9, 2727–2738
- Ouchikh, O., Chahed, T., Ksouri, R., Taarit, M. B., Faleh, H., Abdelly, C. & Marzouk, B. (2011). The effects of extraction method on the measured tocopherol level and antioxidant activity of *L. nobilis* vegetative organs. *Journal of Food Composition and Analysis*, 24(1), 103-110. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.04.006>
- Pandey, V., Patel, A. & Patra, D. D. (2016). Biochar ameliorates crop productivity, soil fertility, essential oil yield and aroma profiling in basil (*Ocimum basilicum* L.). *Ecological engineering*, 90, 361-366. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.01.020>
- Petrucelli, R., Bonetti, A., Traversi, M. L., Faraloni, C., Valagussa, M. & Pozzi, A. (2015). Influence of biochar application on nutritional quality of tomato (*Lycopersicon esculentum*). *Crop and Pasture Science*, 66(7), 747-755. <https://doi.org/10.1071/CP14247>
- Qiu, Z., Tang, J., Chen, J. & Zhang, Q. (2020). Remediation of cadmium-contaminated soil with biochar simultaneously improves biochar's recalcitrance. *Environmental Pollution*, 256, 113436. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113436>
- Rai, P. K., Lee, S. S., Zhang, M., Tsang, Y. F. & Kim, K. H. (2019). Heavy metals in food crops: Health risks, fate, mechanisms, and management. *Environment international*, 125, 365-385. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.067>
- Razzaghi, F., Obour, P. B. & Arthur, E. (2020). Does biochar improve soil water retention? A systematic review and meta-analysis. *Geoderma*, 361, 114055. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.114055>
- Reeves, R. D., Baker, A. J. M., Borhidi, A. & Berazain, R. (1999). Nickel hyperaccumulation in the serpentine flora of Cuba. *Annals of Botany*, 83(1), 29-38. <https://doi.org/10.1006/anbo.1998.0786>
- Reis, J., Amorim, M., Melão, N. & Matos, P. (2018). Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research. In: Rocha, Á., Adeli, H., Reis, L.P., Costanzo, S. (eds) Trends and

- Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST'18 2018. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 745. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_41.
- Ritchie, S. W., Nguyen, H. T., & Holaday, A. S. (1990). Leaf water content and gas-exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. *Crop science*, 30(1), 105-111. <https://doi.org/10.2135/cropsci1990.0011183X003000010025x>
- Rizwan, M., Ali, S., Abbas, T., Zia-ur-Rehman, M., Hannan, F., Keller, C. & Ok, Y. S. (2016). Cadmium minimization in wheat: a critical review. *Ecotoxicology and environmental safety*, 130, 43-53. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.04.001>
- Rohani, N., Daneshmand, F., Vaziri, A., Mahmoudi, M. & Saber-Mahani, F. (2019). Growth and some physiological characteristics of *Pistacia vera* L. cv Ahmad Aghaei in response to cadmium stress and *Glomus mosseae* symbiosis. *South African Journal of Botany*, 124, 499-507. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.06.001>
- Saini, S., & Dhania, G. (2020). Cadmium as an environmental pollutant: ecotoxicological effects, health hazards, and bioremediation approaches for its detoxification from contaminated sites. In *Bioremediation of industrial waste for environmental safety* (pp. 357-387). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3426-9_15
- Saleh, S.R., Kandeel, M.M., Ghareeb, D., Ghoneim, T.M., Talha, N.I., Alaoui-Sossé, B. & Abdel-Daim, M.M. (2020). Wheat biological responses to stress caused by cadmium, nickel and lead. *Science of The Total Environment*, 706, 136013. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136013>
- Scherer, R., Lemos, M.F., Lemos, M.F., Martinelli, G.C., Martins, J.D.L. & da Silva, A.G. (2013). Antioxidant and antibacterial activities and composition of Brazilian spearmint (*Mentha spicata* L.). *Industrial crops and products*, 50, 408-413. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.07.007>
- Semida, W.M., Beheiry, H.R., Sétamou, M., Simpson, C.R., Abd El-Mageed, T.A., Rady, M.M. & Nelson, S.D. (2019). Biochar implications for sustainable agriculture and environment: A review. *South African Journal of Botany*, 127, 333-347. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.11.015>
- Shahid, M.A., Balal, R.M., Khan, N., Zotarelli, L., Liu, G.D., Sarkhosh, A., Fernandez-Zapata, J.C., Nicolas, J.J. & Garcia-Sanchez, F. (2019). Selenium impedes cadmium and arsenic toxicity in potato by modulating carbohydrate and nitrogen metabolism. *Ecotoxicol Environ Saf*, 180, 588-599.
- Speratti, A.B., Johnson, M.S., Sousa, H.M., Dalmagro, H.J. & Couto, E.G. (2018). Biochars from local agricultural waste residues contribute to soil quality and plant growth in a Cerrado region (Brazil) Arenosol. *GCB Bioenergy*, 10(4), 272-286. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12489>
- Wang, X. X., Zhao, F., Zhang, G., Zhang, Y. & Yang, L. (2017). Vermicompost improves tomato yield and quality and the biochemical properties of soils with different tomato planting history in a greenhouse study. *Frontiers in plant science*, 8, 1978. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01978>
- Windeatt, J. H., Ross, A. B., Williams, P. T., Forster, P. M., Nahil, M. A. & Singh, S. (2014). Characteristics of biochars from crop residues: potential for carbon sequestration and soil amendment. *Journal of environmental management*, 146, 189-197. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.08.003>
- Younis, U., Malik, S. A., Rizwan, M., Qayyum, M. F., Ok, Y. S., Shah, M. H. R. & Ahmad, N. (2016). Biochar enhances the cadmium tolerance in spinach (*Spinacia oleracea*) through modification of Cd uptake and physiological and biochemical attributes. *Environmental Science and Pollution Research*, 23(21), 21385-21394. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-7344-3>
- Zahedi, S. M., Abdelrahman, M., Hosseini, M. S., Hoveizeh, N. F. & Tran, L. S. P. (2019). Alleviation of the effect of salinity on growth and yield of strawberry by foliar spray of selenium-nanoparticles. *Environmental Pollution*, 253, 246-258. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.04.078>
- Zargar Shooshtari, F., Souri, M. K., Hasandokht, M. R. & Jari, S. K. (2020). Glycine mitigates fertilizer requirements of agricultural crops: case study with cucumber as a high fertilizer demanding crop. *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s40538-020-00185-5>
- Zhang, Y., Ding, J., Wang, H., Su, L. & Zhao, C. (2020). Biochar addition alleviate the negative effects of drought and salinity stress on soybean productivity and water use efficiency. *BMC Plant Biology*, 20(1), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12870-020-02493-2>
- Zheng, S., Wang, Q., Yuan, Y. & Sun, W. (2020). Human health risk assessment of heavy metals in soil and food crops in the Pearl River Delta urban agglomeration of China. *Food chemistry*, 316, 126213. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126213>

Effect of biochar and selenium on alleviating oxidative stressed induced by cadmium on coriander (*Coriandrum sativum* L.)

Fatemeh Rafighzadeh¹, Marzieh Ghanbari Jahromi^{1,*}, Marjan Diyanat¹

¹Department of Horticultural Science and Agronomy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

In order to investigate the effect of biochar and selenium on the quantitative and qualitative characteristics of coriander (*Coriandrum sativum* L.) under cadmium stress, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design with three replications in greenhouse conditions during the years 2022. The experimental treatments include the use of cadmium chloride at three levels (0, 10 and 20 mg/kg), biochar at two levels (0 and 5% of soil) and foliar spraying with sodium selenate at two levels (0 and 20 mg/l). The results of this research showed that cadmium treatment of 20 mg/kg caused a decrease in fresh and dry weight of shoot and root, chlorophyll a, b and total, relative leaf water content and increased activity of superoxide dismutase enzyme and soluble sugar. Phenol increased up to the cadmium level of 10 mg/kg, but decreased at higher cadmium levels (20 mg/kg). By reducing the effect of cadmium stress, selenium and biochar treatments increased the fresh and dry weight of roots and shoots, chlorophyll content, relative leaf water content, and essential oil yield, and decreased the characteristics of superoxide dismutase enzyme activity, soluble sugar, and cadmium accumulation in roots and shoots. The highest amount of essential oil yield (16.93 mg/plant) and percentage of essential oil (0.44%) was observed in the combination treatment of biochar 5% by volume and selenium 20 mg/l. Biochar and selenium improved coriander traits by modulating the effect of cadmium stress.

Keywords: percentage of essential oil, toxicity, enzyme activity, foliar spraying.