

تأثیر ملاتونین بر عملکرد، صفات رشدی و برخی صفات فیزیولوژیکی فلفل تند تحت شرایط تنش خشکی

مهدی عموزاده^۱، فردین قنبری^{۱*} و راحیل موحدی^۲

^۱ گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

^۲ گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹)

چکیده

ملاتونین نقش‌های متفاوت و مهمی بر بسیاری از جنبه‌های رشد و نمو گیاهان دارد. مشخص شده است که ملاتونین دارای خواص آنتی‌اکسیدانی است و در فرآیندهای جوانه‌زنی، بلوغ، پیری، حفاظت سلولی و مقاومت در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده نقش دارد. در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف ملاتونین (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر عملکرد، صفات رشدی و برخی خصوصیات زیست‌شیمیایی فلفل تند تحت سطوح مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار در یکی از مزارع تولیدی در ۲۰ کیلومتری شهرستان دره‌شهر در سال ۱۴۰۰ انجام شد. نتایج نشان داد که کاهش آبیاری باعث کاهش رشد و عملکرد گیاه شده و محتوای پرولین و مالون دی‌آلدهید را افزایش داد. کاربرد ملاتونین در تمام سطوح آبیاری سبب بهبود رشد و عملکرد فلفل در شرایط مزرعه گردید. همچنین محلول‌پاشی ملاتونین باعث کاهش محتوای پرولین و مالون دی‌آلدهید شده و کلروفیل و کاروتنوئید را نسبت به شاهد افزایش داد. غلظت ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین تأثیر بهتری بر رشد و عملکرد فلفل نسبت به غلظت‌های دیگر داشت. همچنین اثر بخشی هورمون ملاتونین بیشتر در سطح آبیاری ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر مشاهده شد. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ملاتونین (به خصوص در غلظت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) با افزایش محتوای کلروفیل و کاهش تجمع مالون دی‌آلدهید و پرولین باعث کاهش آثار تنش خشکی در گیاه فلفل شد.

واژه‌های کلیدی: آنتی‌اکسیدان، تشتک تبخیر، تنش خشکی، کلروفیل

مقدمه

آسیب سلولی به دلیل تجمع گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) شود، که منجر به اختلال هموستاز ردوکس در سلول‌های گیاهی و تولید مالون دی‌آلدهید، نتیجه نهایی پراکسیداسیون لیپیدی در غشای سلولی، شود که به عنوان شاخص آسیب غشای اکسیداتیو شناخته می‌شود (Yang et al., 2021). در میان آنزیم‌های اصلی مهارکننده ROS، کاتالاز (CAT)،

دسترسی محدود به آب آبیاری و تنش خشکی ناشی از آن یکی از محدودکننده‌ترین عواملی است که بر فرآیندهای متابولیک گیاهان تأثیر می‌گذارد، رشد، نمو و بهره‌وری گیاهان را به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک کاهش می‌دهد (Dawood, 2016). به‌طور کلی، تنش خشکی می‌تواند باعث

گسترده‌ای از گونه‌های گیاهی از جمله غلات، حبوبات، سبزیجات و غیره کشف شده است. در گیاهان محل بیوستتز ملاتونین کلروپلاست‌ها هستند و مقدار ملاتونین سلول‌های گیاهی در مقایسه با سلول‌های جانوری بسیار بیشتر است. آنچه مطالعه ملاتونین را در گیاهان جالب می‌سازد نقش‌های متعددی است که در رشد گیاه و دفاع در برابر عوامل محیطی ایفا می‌کند. گزارش‌هایی در زمینه نقش ملاتونین در بهبود پاسخ‌های گیاه به تنش‌هایی چون خشکی، سرما، حمله پاتوژن‌ها و محافظت در برابر علف‌کش، سمیت یونی و تنش اکسیداتیو ارائه شده است (Debnath *et al.*, 2019). ملاتونین سبب تحریک بیوستتز ایندول استیک اسید (IAA) شده و از این طریق رشد ریشه را تحریک می‌کند (Chen *et al.*, 2009). به عنوان جاروب‌کننده عوامل اکسیداتیو و متعادل‌کننده فرآیندهایی که تعادل ردوکس سلول را تغییر می‌دهند، می‌تواند در متحمل کردن گیاهان به تنش خشکی گزینه مناسبی باشد (Tiwari *et al.*, 2020). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ملاتونین با بهبود بخشیدن به فتوستتز و هوموستازی یونی، تحمل به تنش را در گیاهان بهبود بخشیده است (Gao *et al.*, 2019). پیش‌تیمار با ملاتونین سبب افزایش ظرفیت فتوستتزی و توسعه سیستم ریشه‌ای می‌شود. تیمارهای ملاتونین با افزایش سطح رونوشت‌برداری و نیز افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان توانایی گیاه را برای مقابله با تنش اکسیداتیو بهبود می‌بخشد (Khan *et al.*, 2024). در گیاه شنبلیله تحت تنش خشکی تیمار ملاتونین در غلظت ۱۰۰ میکرومولار سبب بهبود فتوستتز و تعرق گیاه شده و تخریب کلروفیل در شرایط تنش را کاهش داد (Amiri *et al.*, 2024). همچنین پیش‌تیمار ملاتونین به‌طور معنی‌داری تولید مالون دی‌آلدئید و پراکسید هیدروژن را کاهش داده و بنابراین به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی صدمات ایجادشده به گیاهان در اثر شرایط تنش را کاهش می‌دهد (Altaf *et al.*, 2022). در تحقیقی دیگر، تیمار ملاتونین باعث افزایش کلروفیل، کاروتنوئید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل، پرولین، فنل، فلاونوئید و پروتئین محلول و کاهش محتوای

سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و آسکوربات پراکسیداز (APX) ذکر شده‌اند که در کلروپلاست‌ها، میتوکندری‌ها، پراکسی‌زوم‌ها و سیتوزول برای محافظت از بخش‌های سلولی در برابر تنش اکسیداتیو عمل می‌کنند (Farouk and Al-Amri, 2019). یک پاسخ برجسته دیگر به تنش خشکی تجمع موادی از جمله اسیدهای آمینه، پلی‌آمین‌ها، گلایسین‌بتائین، پروتئین‌های آبدوست و کربوهیدرات‌ها است که با از دست دادن آماس سلولی مقابله می‌کند و پتانسیل اسمزی سیتوزول سلول و واکوئل‌ها را تعدیل می‌کنند (Yang *et al.*, 2021). طی گزارش‌های زیادی ثابت شده است که وقتی گیاهان در شرایط رشد نامطلوب و تنش‌های محیطی قرار می‌گیرند تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. برخی از این تغییرات شامل تغییر در میزان نشت یونی در بافت گیاهی و یا تغییر در ویژگی‌های روزنه در گیاه است (Shahrivar *et al.*, 2020). تنش خشکی باعث ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاهان در اثر تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن در طی فرآیند فتوستتز و تنفس می‌گردد. این رادیکال‌های آزاد اکسیژن به‌طور مستقیم به پروتئین‌ها، چربی‌ها، اسیدهای نوکلئیک و از همه مهم‌تر به غشاء سلولی حمله کرده و سبب مرگ سلولی می‌شوند (Zhang *et al.*, 2015). بنابراین، در دوره تنش، گیاهان با روش‌های مختلف از جمله با تولید آنتی‌اکسیدان‌ها میزان تحمل به تنش خشکی را افزایش داده‌اند. با این حال، این ترکیبات ضدتنش درون‌زا برای توانمند کردن گیاهان در برابر تنش طولانی مدت کافی نیستند، بنابراین استفاده خارجی از مواد کمکی (به‌عنوان مثال هورمون‌های گیاهی) برای کمک به گیاهان به‌منظور تحمل بهتر شرایط تنش اهمیت دارد.

ملاتونین با فرمول شیمیایی N-acetyl-5-methoxy tryptamine یک ترکیب ایندولی است که به‌طور طبیعی در گیاهان سنتز می‌شود. در گیاهان ملاتونین به‌عنوان محرک زیستی شناخته شده که موجب افزایش تحمل به تنش‌های زنده و غیرزنده و بهبود رشد و توسعه گیاه می‌گردد (Farouk and Al-Amri, 2019; Sharma *et al.*, 2020). ملاتونین در طیف

مالون دی آلدید در گیاه توت‌فرنگی تحت تنش آبی شد (عین‌الدین و همکاران، ۱۴۰۲).

لفل (*Capsicum annum*) یک محصول گیاهی متعلق به خانواده Solanaceae است و به‌طور گسترده در اکثر نقاط جهان کشت می‌شود. در بسیاری از نقاط جهان، فلفل به دلیل طعم تند، ویژگی‌های تغذیه‌ای و محتویات رنگدانه میوه‌ها ارزش دارد (Saleh et al., 2018). مواد شیمیایی گیاهی موجود در فلفل دارای خواص زیست‌شیمیایی و دارویی زیادی مانند فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدحساسیت و ضدسرطان هستند (Lee et al., 2005). همچنین، فلفل رسیده به‌طور طبیعی سرشار از اسید آسکوربیک (ویتامین C) و پروویتامین A است که رادیکال‌های آزاد را در بدن انسان خنثی می‌کند و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند آرتروز، قلبی عروقی، سرطان و روند پیری را کاهش می‌دهد (Ozgun et al., 2011). مشخص شده است که فلفل به کمبود آب بسیار حساس است و کمبود آب به‌طور قابل‌توجهی وزن تازه کل میوه را کاهش داده و در نتیجه منجر به تولید میوه‌های با اندازه کوچک‌تر می‌شود (Gonzalez-Dugo et al., 2007). در تحقیق حاضر اثر کاربرد خارجی ملاتونین بر تحمل به خشکی و برخی ویژگی‌های فرآیند و کارکرد مرتبط با آن در گیاه فلفل تحت شرایط مزرعه بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در یکی از مزارع تولیدی واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان دره‌شهر، استان ایلام در سال ۱۴۰۰ به انجام رسید. آزمایش به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل آبیاری بعد از ۱۲۰، ۸۰ و ۴۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و ملاتونین در چهار سطح شامل شاهد یا عدم مصرف، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار به عنوان عامل فرعی بود. برای آماده‌سازی زمین مورد نیاز، ابتدا علف‌های هرز، سنگ‌ها و کلوخه‌های سطح مزرعه جمع‌آوری شد و به کمک بیل دستی

خاک مزرعه تا عمق ۳۰ سانتی‌متری شخم زده شد. عملیات کاشت پس از آماده‌سازی کرت‌های آزمایشی (۳۶ کرت) در اواخر اسفندماه صورت گرفت. هر کرت آزمایشی شامل پنج خط کاشت بود. ردیف‌های کناری و نیم متر از بالا و پایین هر کرت به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. برای کاشت، نشاهای سالم و یکدست انتخاب شده و به صورت دستی به فاصله ۲۰ سانتی‌متر در ردیف‌های منظم کشت شدند. در دو هفته ابتدایی همه گیاهان به صورت یکسان آبیاری شدند تا نشاها کاملاً استقرار یابند. پس از آن تیمار ملاتونین به صورت محلول‌پاشی برگ‌ها در غلظت‌های ذکرشده تا خیس شدن کامل سطح برگ‌ها اعمال شد و دو هفته بعد مجدداً این عمل تکرار شد. پس از آن گیاهان در معرض تنش خشکی قرار گرفتند و تا پایان فصل رشد ادامه یافت. آبیاری بر اساس مدت زمان لازم برای ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر جمعی از تشتک تبخیر کلاس A (ایستگاه آب و هواشناسی شهرستان دره‌شهر) انجام گرفت. بدین ترتیب که با استعلام روزانه میزان تبخیر از ایستگاه آب و هواشناسی، زمانی که میزان تبخیر جمعی برابر تیمارهای ذکر شده می‌رسید، اقدام به آبیاری می‌شد. آبیاری هر کرت به صورت کنترل‌شده با استفاده از لوله‌های آبیاری به صورت یکنواخت در هر کرت توزیع شد. همچنین برای جلوگیری از نشست آب در کرت‌های مجاور بین کرت‌های اصلی ۲ متر فاصله در نظر گرفته شد. مرحله نمونه‌برداری از گیاه زراعی در زمان برداشت محصول انجام گرفت و تعداد پنج بوته از هر کرت به‌طور تصادفی با در نظر گرفتن اثر حاشیه انتخاب و بوته‌های موجود به همراه ریشه از خاک خارج شد. پس از شمارش تعداد میوه، اندازه‌گیری وزن تمام میوه‌های برداشت‌شده با استفاده از ترازوی دقیق دیجیتالی با دقت یک صدم گرم انجام گرفت و میانگین وزن حاصل به عنوان وزن میوه در نظر گرفته شد. سپس وزن تر و خشک شاخساره و ریشه‌ها اندازه‌گیری شد. جهت تعیین وزن خشک، اندام‌های مختلف به مدت ۷۲ ساعت در آون ۷۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

$$b \text{ کلروفیل} = [(20/31 \times OD_{646}) - (4/91 \times OD_{663.9})]$$

$$104 - [(1000 \times OD_{470}) - (3/27 \times Chl a)] = \text{کاروتنوئید کل [Chl b]}$$

جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار SAS استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. برای رسم نمودارها نرم افزار Excel به کار رفت.

نتایج

صفات کمی میوه: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات ساده ملاتونین و آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد و تعداد میوه در بوته معنی دار شد. اثر اصلی آبیاری بر میانگین وزن میوه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. همچنین اثر متقابل ملاتونین و آبیاری نیز در سطح احتمال یک درصد بر این صفات معنی دار بود (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش آب آبیاری در حد ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر تعداد میوه و میانگین وزن میوه به طور معنی داری کاهش یافته و به تبع آن، عملکرد کل نیز کاهش یافت. استفاده از تیمار ملاتونین در تمام سطوح آبیاری تعداد میوه در بوته و عملکرد کل را نسبت به شاهد افزایش داد (شکل ۱ و ۲). در سطوح آبیاری ۸۰ و ۴۰ میلی‌متر تبخیر بیشترین تعداد میوه و بالاترین عملکرد با کاربرد ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین بدست آمد. بیشترین میزان میانگین وزن میوه (۱/۷۴ گرم) در تیمار شاهد و آبیاری ۴۰ میلی‌متر و کمترین میزان وزن میوه (۱/۴۴ گرم) در شرایط عدم کاربرد ملاتونین و ۸۰ میلی‌متر تبخیر بدست آمد (شکل ۲ و ۳).

صفات رشدی: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات ساده ملاتونین و آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر همه صفات رشدی شامل ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک ریشه و شاخساره معنی دار شد (جدول ۱). اثر متقابل ملاتونین و آبیاری بر صفات وزن تر شاخساره و ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر وزن خشک شاخساره و ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان

برای تعیین غلظت پرولین، یک میلی‌لیتر از عصاره الکلی تهیه شده با ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر رقیق نموده و ۵ میلی‌لیتر معرف نین‌هیدرین به آن اضافه شده و ۵ میلی‌لیتر اسید استیک گلاسیال به آن افزوده و مخلوط حاصله پس از به هم زدن به مدت ۴۵ دقیقه در حمام آب جوش (۱۰۰ درجه سانتی‌گراد) قرار داده شد. پس از در آوردن نمونه‌ها از حمام آب جوش و خنک شدن آن‌ها، ۱۰ میلی‌لیتر بنزن به هر کدام از نمونه‌ها افزوده و به شدت تکان داده شد تا پرولین وارد فاز بنزن گردد. نمونه‌ها به مدت ۳۰ دقیقه به حال سکون رها شدند. میزان جذب فاز بالایی نمونه‌ها در طول موج ۵۱۵ نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد (Paquin and Lechasseur, 1979).

برای اندازه‌گیری محتوای مالون دی‌آلدئید ۰/۲ گرم از بافت تازه گیاهی در هاون چینی با ۵ میلی‌لیتر اسید تری کلرواستیک اسید (TCA) یک درصد سائیده شد. عصاره حاصل با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به مدت پنج دقیقه سانتریفیوژ شد. به یک میلی‌لیتر از محلول رویی حاصل از سانتریفیوژ، ۴/۵ میلی‌لیتر محلول TCA ۲۰ درصد که دارای ۰/۵ درصد اسید تیوباربیتریک بود، اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت ۱۰ دقیقه با ۴۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ گردید. شدت جذب این محلول با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج‌های ۵۳۲ و ۶۰۰ نانومتر خوانده شد. در نهایت غلظت مالون دی‌آلدئید بر اساس نانومول بر گرم وزن تر گزارش شد (Stewart and Bewley, 1980).

برای اندازه‌گیری کلروفیل و کاروتنوئید یک گرم برگ تازه با ۲۰ میلی‌لیتر استون ۸۰ درصد ساییده و سپس با سرعت ۲۷۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. میزان جذب محلول به دست آمده در طول موج‌های ۶۶۳، ۶۴۶ و ۴۷۰ نانومتر خوانده شد و مقدار کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید کل با استفاده از روابط زیر محاسبه شد (Arnon, 1949).


$$\text{کلروفیل کل} = [(17/76 \times OD_{646.6}) + (7/37 \times OD_{663.6})]$$

$$\text{کلروفیل a} = [(12.25 \times OD_{663.6}) - (2/55 \times OD_{646.6})]$$

جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس ویژگی‌های رشدی اندازه‌گیری شده در رابطه با دوره‌های مختلف آبیاری و ملاتونین

میانگین مربعات								درجه آزادی	منابع تغییر
وزن خشک ریشه	وزن تر ریشه	وزن خشک شاخساره	وزن تر شاخساره	ارتفاع گیاه	میانگین وزن میوه	تعداد میوه در بوته	عملکرد کل		
۰/۶۸	۳۶/۶۱	۰/۴۰	۵۲/۰۴	۱۵/۲۵	۰/۰۰۲	۳۲/۷۹	۵۶/۴۰	۲	بلوک
۸/۹۶**	۴۱۶/۲۲**	۱۱۵۹/۸۲**	۳۷۸۰۷/۹۵**	۳۴۶/۷۵**	۰/۰۲۱**	۳۸۸۲/۵۱**	۹۸۸۵/۲۴**	۲	آبیاری
۲/۱۶	۴۲/۹۴	۵/۹۳	۲۰۲/۸۱	۵/۱۲	۰/۰۰۶	۵۸/۸۵	۱۹۱/۱۹	۴	خطای اول
۲۰/۵۴**	۸۸۳/۱۵**	۸۲۹/۱۲**	۱۲۰۳۴/۴۳**	۹۲۶/۰۰**	۰/۰۰۴ ^{ns}	۷۹۶۴/۴۹**	۲۱۷۳۷/۳۳**	۳	ملاتونین
۲/۷۷**	۳۹/۰۴*	۴۴/۶۷**	۶۳۵/۴۴*	۳۱/۴۱ ^{ns}	۰/۰۲۷**	۳۵۴/۵۹**	۹۲۹/۵۱**	۶	آبیاری×ملاتونین
۰/۵۹	۱۴/۸۸	۸/۰۶	۲۲۲/۸۳	۱۵/۰۵	۰/۰۰۳	۲۵/۲۷	۱۰۳/۴۰	۱۸	خطای کل
۴/۸۰	۴/۱۶	۶/۱۵	۴/۱۲	۴/۹۷	۳/۵۰	۴/۶۰	۵/۷۲	-	ضریب تغییرات


* و ** به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال پنج و یک درصد و ns عدم تفاوت معنی‌داری است.



شکل ۱- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر عملکرد کل بوته لفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.

خشک ریشه و شاخساره را نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین میزان وزن تر شاخساره (۴۳۴ گرم) در تیمار ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین و آبیاری ۴۰ میلی‌متر و کمترین میزان وزن تر شاخساره (۲۵۷ گرم) در شرایط عدم کاربرد ملاتونین و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر بدست آمد (شکل ۴). همچنین بیشترین وزن تر ریشه (۱۰۷/۰۴ گرم) در تیمار ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین و آبیاری ۴۰ میلی‌متر و کمترین میزان وزن تر ریشه (۶۹/۷۱ گرم) در شرایط عدم کاربرد ملاتونین و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر بدست آمد (شکل ۶).

داد که سطوح آبیاری ۱۲۰ و ۸۰ میلی‌متر تبخیر سبب کاهش معنی‌دار و به ترتیب ۸/۶۴ و ۱۲/۵۱ درصدی ارتفاع گیاه نسبت به آبیاری ۴۰ میلی‌متر شدند. همچنین کاربرد ملاتونین در تمام غلظت‌ها ارتفاع گیاه را نسبت به شاهد افزایش داد و بیشترین تأثیر در تیمار ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین (۳۴/۹۵ درصد افزایش نسبت به شاهد) مشاهده شد (جدول ۲). با کاهش آب آبیاری در حد ۱۲۰ و ۸۰ میلی‌متر تبخیر وزن تر و خشک شاخساره و ریشه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. استفاده از تیمار ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین در تمام سطوح آبیاری وزن تر و



میزان تبخیر (میلی متر)

شکل ۲- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر تعداد میوه در بوته فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آن‌ها است.




میزان تبخیر (میلی متر)


شکل ۳- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر میانگین وزن میوه فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آن‌ها است.

تبخیر به ترتیب $38/50$ و $67/47$ درصد محتوای پرولین بالاتری نسبت به گیاهان آبیاری شده پس از ۴۰ میلی‌متر تبخیر نشان دادند. ملاتونین در تمام سطوح آبیاری محتوای پرولین را نسبت به شاهد کاهش داد. در سطح آبیاری ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر، کمترین میزان پرولین با کاربرد ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین (۳۴ درصد کاهش نسبت به شاهد) بدست آمد.

پرولین: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات ساده ملاتونین، آبیاری و اثر متقابل ملاتونین و آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر محتوای پرولین معنی‌دار شد (جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش آب آبیاری میزان پرولین گیاه فلفل افزایش یافت به طوری که در شرایط عدم کاربرد ملاتونین گیاهان آبیاری شده بعد از ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر



شکل ۴- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر وزن تر شاخساره فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.




شکل ۵- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر وزن خشک شاخساره فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.


که اثرات ساده ملاتونین و آبیاری در سطح احتمال یک درصد بر مالون دی‌آلدهید معنی‌دار شد. همچنین اثر متقابل ملاتونین و آبیاری در سطح احتمال پنج درصد بر مالون دی‌آلدهید معنی‌دار بود (جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش آب آبیاری میزان مالون دی‌آلدهید به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. استفاده از تیمار ملاتونین در سطوح آبیاری ۸۰ و ۱۲۰

بیشترین مقدار پرولین برگ مربوط به آبیاری ۱۲۰ میلی‌متر و تیمار بدون کاربرد ملاتونین (۵۷/۰۶ میکرومولار بر گرم وزن تر) و کم‌ترین مقدار پرولین برگ (۲۷/۱ میکرومولار بر گرم وزن تر) مربوط به ۴۰ میلی‌متر آبیاری و کاربرد ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین بود (شکل ۸).

مالون دی‌آلدهید: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد



شکل ۶- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر وزن تر ریشه فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آن‌ها است.




شکل ۷- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر وزن خشک ریشه فلفل. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آن‌ها است.


ترکیبی ۱۲۰ میلی متر آبیاری و بدون کاربرد ملاتونین بدست آمد (شکل ۹).

کلروفیل: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات ساده ملاتونین و آبیاری بر محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی‌دار شد ولی اثر متقابل آبیاری و ملاتونین بر این صفات معنی‌دار نشد

میلی متر تبخیر میزان مالون دی‌آلدهید را کاهش داد ولی در ۴۰ میلی متر تأثیر معنی‌داری بر این صفت نداشت. در سطح آبیاری ۱۲۰ میلی متر تبخیر بیشترین میزان مالون دی‌آلدهید مربوط با عدم کاربرد ملاتونین بدست آمد و همه سطوح ملاتونین میزان مالون دی‌آلدهید را نسبت به شاهد کاهش دادند. بیشترین مقدار مالون دی‌آلدهید (۶/۴۲ نانومول بر گرم وزن تر) در تیمار



شکل ۸- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر پرولین. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.



شکل ۹- مقایسه میانگین اثر متقابل دوره‌های مختلف آبیاری (آبیاری پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر) و ملاتونین (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) بر مالون دی‌آلدئید. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.

افزایش داد. همچنین تیمار ملاتونین در غلظت‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار به ترتیب سبب افزایش ۷، ۲۲ و ۱۶ درصدی کلروفیل کل نسبت به شاهد شد (جدول ۳).

کاروتنوئید: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات اصلی آبیاری در سطح احتمال پنج درصد و ملاتونین در سطح یک درصد بر محتوای کاروتنوئید معنی‌دار شد. اما اثر

(جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کاهش آب آبیاری در سطح ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر به ترتیب سبب کاهش ۱۷، ۱۰ و ۱۴ درصدی محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل در برگ‌های فلفل نسبت به آبیاری ۴۰ میلی‌متر شد. استفاده از تیمار ملاتونین در غلظت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار در تمام سطوح آبیاری رنگدانه‌های فتوسنتزی را نسبت به شاهد

جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس صفت‌های پرولین، مالون دی‌آلدهید، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید در رابطه با دوره‌های مختلف آبیاری و ملاتونین

میانگین مربعات					درجه آزادی	منابع تغییر
کاروتنوئید	کلروفیل کل	کلروفیل b	کلروفیل a	مالون دی‌آلدهید	پرولین	
۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۲۸	۰/۲۶	۲ بلوک
۰/۰۰۰۸۲*	۰/۲۱۴**	۰/۰۱۷*	۰/۱۴**	۱۷/۳۹**	۶۷۵/۰۱**	۲ آبیاری
۰/۰۰۰۰۲	۰/۰۰۲۲	۰/۰۰۰۸	۰/۰۰۰۶	۰/۲۵	۲/۶۹	۴ خطای اول
۰/۰۰۰۷۵**	۰/۲۰۵**	۰/۰۴۲**	۰/۰۸۳**	۲/۸۱**	۲۲۸/۶۱**	۳ ملاتونین
۰/۰۰۰۱۶ ^{ns}	۰/۰۳۱ ^{ns}	۰/۰۰۶ ^{ns}	۰/۰۱۴ ^{ns}	۱/۱۶*	۸۵/۹۶**	۶ آبیاری × ملاتونین
۰/۰۰۰۱۳	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۸	۰/۲۹	۱/۹۶	۱۸ خطای کل
۱۰/۹۴	۷/۸۶	۱۰/۱۷	۷/۵۰	۱۴/۳۲	۳/۴۹	- ضریب تغییرات

* و ** به ترتیب معنی‌داری در سطح احتمال پنج و یک درصد و ns عدم تفاوت معنی‌داری است.

جدول ۳- مقایسه میانگین‌های مربوط به پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی اندازه‌گیری‌شده تحت تأثیر دوره‌های مختلف آبیاری و ملاتونین (میلی‌گرم بر گرم وزن تر)

کاروتنوئید	کلروفیل کل	کلروفیل b	کلروفیل a	ارتفاع گیاه	ملاتونین
(میلی‌گرم بر گرم وزن تر)				(سانتی‌متر)	
۰/۳۶۸ ^a	۱/۸۵ ^a	۰/۷۰ ^a	۱/۲۹ ^a	۸۳/۹۱ ^a	۴۰ میلی‌متر تبخیر
۰/۳۳۷ ^b	۱/۷۳ ^{ab}	۰/۶۵ ^a	۱/۲۲ ^a	۷۶/۶۶ ^b	۸۰ میلی‌متر تبخیر
۰/۳۱۶ ^c	۱/۵۹ ^b	۰/۶۳ ^b	۱/۰۷ ^b	۷۳/۴۱ ^c	۱۲۰ میلی‌متر تبخیر
۰/۳۰۰ ^b	۱/۵۴ ^c	۰/۵۸ ^b	۱/۰۷ ^c	۶۶/۷۷ ^d	شاهد
۰/۳۴۸ ^a	۱/۶۹ ^b	۰/۶۲ ^b	۱/۱۹ ^b	۷۳/۳۳ ^c	۵۰ میکرومولار
۰/۳۴۵ ^a	۱/۸۹ ^a	۰/۷۳ ^a	۱/۲۳ ^{ab}	۸۱/۷۸ ^b	۱۰۰ میکرومولار
۰/۳۶۹ ^a	۱/۷۹ ^{ab}	۰/۶۹ ^a	۱/۳۰ ^a	۹۰/۱۱ ^a	۲۰۰ میکرومولار

حروف غیر مشابه در مقابل میانگین‌ها در هر ستون نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار براساس آزمون دانکن در سطح ۰/۰۵ درصد بین آنها است.

تیمار ۲۰۰ میکرومولار ملاتونین و کمترین میزان کاروتنوئید (۰/۳۰۰ میلی‌گرم بر وزن تر) در عدم کاربرد ملاتونین بدست آمد (جدول ۳).

بحث

تنش خشکی باعث تسریع پیری برگ شده و غلظت کلروفیل را کاهش می‌دهد و سرانجام میزان فتوسنتز به میزان معنی‌داری کاهش یافته و در نتیجه رشد و عملکرد محصول نیز کاهش

متقابل ملاتونین و آبیاری بر کاروتنوئید معنی‌دار نشد (جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش آب آبیاری میزان کاروتنوئید به‌طور معنی‌داری کاهش یافت، به‌طوری‌که آبیاری ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر سبب کاهش ۸ و ۱۴ درصدی محتوای کاروتنوئید نسبت به آبیاری ۴۰ میلی‌متر شد. استفاده از تیمار ملاتونین در تمام سطوح آبیاری کاروتنوئید را نسبت به شاهد افزایش (۱۵ تا ۲۳ درصد افزایش نسبت به شاهد) داد. بیشترین میزان کاروتنوئید (۰/۳۶۹ میلی‌گرم بر وزن تر) در

می‌یابد (Sharma et al., 2020). در تحقیق حاضر نیز کاهش آبیاری در گیاه فلفل باعث کاهش پارامترهای رشدی و عملکرد این گیاه در شرایط مزرعه شد که نشان‌دهنده حساسیت زیاد این گونه به کمبود آب است. همچنین نتایج نشان داد که، استفاده از تیمار ملاتونین سبب بهبود صفات رشدی و عملکرد گیاه در سطوح مختلف آبیاری شد. بهبود رشد و عملکرد گیاهان در شرایط تنش آبی با کاربرد خارجی ملاتونین در گیاهان شنبلیله، برنج و سویا نیز گزارش شده است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (Imran et al., 2021; Amiri et al., 2024; Khan et al., 2024). گزارش شده است که، ملاتونین با تعدیل فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی شرایط زیست گیاهان را در مواجهه با تنش خشکی تنظیم می‌کند و در نهایت تحمل گیاهان را در برابر شرایط تنش افزایش می‌دهد (Cui et al., 2017). تنظیم دستگاه فتوسنتزی و سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی فرآیندهای اصلی فیزیولوژیکی هستند که توسط ملاتونین تحت شرایط کمبود آب کنترل می‌شوند و از این طریق آثار تنش در گیاهان با کاربرد خارجی ملاتونین تعدیل می‌شود (Tiwari et al., 2020). همچنین ملاتونین برون‌زا با تنظیم گونه‌های فعال اکسیژن در گیاهان تحت تنش خشکی، پیری را به تأخیر می‌اندازد و به حفظ رشد گیاه در شرایط نامساعد تنش کمک می‌کند (Debnath et al., 2019). در تحقیق حاضر نیز تیمار ملاتونین سبب بهبود رنگدانه‌های فتوسنتزی، کاهش پرولین و مالون دی‌آلدهید شده و از این طریق رشد و عملکرد فلفل تند در شرایط تنش خشکی را بهبود داد. این نتایج نشان می‌دهد که تیمار ملاتونین با تأثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه سبب کاهش آثار تنش خشکی بر گیاه می‌شود.

نتایج نشان داد که کاهش آبیاری در گیاه فلفل تند سبب افزایش معنی‌دار تجمع پرولین شده و بیشترین میزان پرولین در آبیاری پس از ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر مشاهده شد. گزارش شده است که تولید املاح سازگار مختلف تحت عنوان محافظت‌کننده‌های اسمزی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های گیاهان برای مقابله با شرایط تنش اسمزی است (Imran et al., 2021). محافظت‌کننده‌های اسمزی شامل پروتئین‌های محلول، پرولین و اسیدآمینو آزاد کل نقش محافظتی گیاهان در برابر تنش را دارند و به تنظیم اسمزی سلول، تثبیت آنزیم‌ها، پروتئین، سم‌زدایی ROS، محافظت و یکپارچگی سلول کمک می‌کند (Dawood, 2016). تجمع پرولین در گیاهان، رطوبت بافت را حفظ، به جذب آب از محیط کمک و سلول‌ها را برای حفظ فعالیت‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طبیعی خود حمایت می‌کند (Kaur and Asthir, 2015). مطالعات بسیاری این یافته‌ها را در گیاهان مختلف تحت شرایط تنش خشکی تأیید کرده‌اند. علاوه‌براین بسیاری از محققان افزایش قند و پروتئین محلول را در شرایط تنش خشکی به عنوان مکانیزم محافظتی گیاهان گزارش کردند (Farouk and Al-Amri, 2019; Imran et al., 2021). از طرف دیگر، نتایج نشان داد که کاربرد ملاتونین به خصوص در غلظت ۲۰۰ میکرومولار سبب کاهش تجمع پرولین در شرایط مختلف رطوبتی شد. به‌طور مشابه با این نتایج، گزارش شده است که تیمار ملاتونین در غلظت‌های ۵۰ و ۱۰۰ میکرومولار، سبب کاهش تجمع پرولین در گیاهان سویا تحت تنش خشکی شد و از این طریق آثار تنش خشکی بر گیاه را کاهش داد (Imran et al., 2021). در تحقیقی دیگر، کاربرد ملاتونین در غلظت ۱۰۰ میکرومولار محتوای پرولین گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی را کاهش داد (Altaf et al., 2022). از آنجا که افزایش تولید پرولین در شرایط تنش نشان‌دهنده اثر سوء تنش بر گیاهان می‌باشد، کاهش پرولین در گیاه فلفل تیمار شده با ملاتونین می‌تواند نشان‌دهنده تحمل بهتر شرایط تنش با کاربرد خارجی ملاتونین باشد.

محتوای مالون دی‌آلدهید (MDA) به عنوان شاخص یکپارچگی ساختاری غشا در نظر گرفته می‌شود. محتوای MDA در شرایط تنش‌های محیطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سیالیت و تخریب هموستازی یونی غشا در گیاهان می‌شود. در واقع، افزایش MDA منعکس‌کننده آسیب غشای سلول است که در اثر آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش‌های سرما، شوری و خشکی در گیاهان ایجاد می‌شود

محتوای مالون دی‌آلدهید (MDA) به عنوان شاخص یکپارچگی ساختاری غشا در نظر گرفته می‌شود. محتوای MDA در شرایط تنش‌های محیطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سیالیت و تخریب هموستازی یونی غشا در گیاهان می‌شود. در واقع، افزایش MDA منعکس‌کننده آسیب غشای سلول است که در اثر آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش‌های سرما، شوری و خشکی در گیاهان ایجاد می‌شود

محتوای مالون دی‌آلدهید (MDA) به عنوان شاخص یکپارچگی ساختاری غشا در نظر گرفته می‌شود. محتوای MDA در شرایط تنش‌های محیطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سیالیت و تخریب هموستازی یونی غشا در گیاهان می‌شود. در واقع، افزایش MDA منعکس‌کننده آسیب غشای سلول است که در اثر آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش‌های سرما، شوری و خشکی در گیاهان ایجاد می‌شود

گزارش شده است. به عنوان مثال Altaf و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند که تنش کم آبی سبب کاهش معنی‌دار محتوای کلروفیل در گیاه گوجه‌فرنگی نسبت به شاهد شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. کاهش کلروفیل در شرایط تنش ممکن است به دلیل کاهش جذب عناصر غذایی مؤثر در بیوسنتز کلروفیل و یا تخریب کلروفیل موجود ناشی از افزایش تجمع رادیکال‌های آزاد باشد (Agathokleous *et al.*, 2020). نتایج تحقیقات حاضر نشان داد که کاربرد بیرونی ملاتونین اثرات منفی تنش خشکی را کاهش داده و باعث بهبود محتوای کلروفیل و کاروتنوئید در مقایسه با شاهد شد. گزارش شده است که تیمار ملاتونین با تأثیر بر فرآیند بیوسنتز کلروفیل، منجر به افزایش این رنگیزه فتوسنتزی شده و از این طریق رشد و عملکرد گیاهان در شرایط تنش را بهبود می‌دهد (Khan *et al.*, 2024). مطالعات نشان می‌دهد که اثرات ملاتونین روی رنگیزه‌های فتوسنتزی ممکن است مرتبط با افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها یا افزایش ظرفیت سیستم آنتی‌اکسیدانی گیاهان باشد (Xalxo and Keshavkant, 2019). از طرفی دیگر ممکن است کاربرد ملاتونین از طریق افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود بیوسنتز کاروتنوئیدها، آنتوسیانین‌ها و فلاونوئیدها که مطلوب برای بیوسنتز کلروفیل است، کلروفیل را از آسیب انواع اکسیژن فعال حفاظت کند و منجر به افزایش بیوسنتز این رنگیزه در گیاهان تحت تنش شود (Farouk and Al-Amir, 2019). همچنین Wang و همکاران (۲۰۱۳) بیان کردند که کاربرد ملاتونین بیان ژن‌های تخریب‌کننده کلروفیل (Senescence-associated gene (SAG12), pheida oxygenas) را متوقف کرده و همچنین باعث افزایش چرخه اسید آسکوربیک و گلووتایتون می‌شود و در نتیجه موجب کاهش گونه‌های فعال اکسیژن و تأخیر در پیری برگ‌های گیاه می‌شود. علاوه‌براین Shi و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که حفاظت از کلروفیل شامل کنترل پیری در برگ‌های گیاه با کاربرد ملاتونین ایجاد شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تیمار ملاتونین با کاهش آسیب اکسیداتیو منجر به حفظ کلروفیل در شرایط تنش شده و از این طریق به تداوم رشد گیاه در شرایط

(Morales and Munne-Bosch, 2019). شدت آسیب اکسیداتیو به غشا سلول به عنوان پراکسیداسیون لیپیدی معمولاً با MDA اندازه‌گیری می‌شود. در آزمایش حاضر با کاهش آبیاری گیاه فلفل محتوای MDA به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. افزایش MDA در اثر تنش خشکی در گیاهان پدید آمده عمومی بوده و در تحقیقات زیادی گزارش شده است (Altaf *et al.*, 2022). نتایج نشان داد که کاربرد ملاتونین سبب کاهش تجمع MDA در برگ‌های فلفل در شرایط آبیاری پس از ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر شد. به‌طور مشابه، Li و همکاران (۲۰۱۸) گزارش کردند که کاربرد ۱۰۰ میکرومولار ملاتونین با کاهش تجمع رادیکال‌های آزاد، حفظ کارایی فتوسنتزی و افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی باعث کاهش تجمع MDA شده و تحمل شرایط تنش توسط گیاه را افزایش داد. همچنین عین‌الدین و همکاران (۱۴۰۲) گزارش دادند که تیمار ملاتونین در غلظت ۱۵۰ میکرومولار سبب کاهش تجمع MDA در گیاه توت‌فرنگی تحت شرایط تنش آبی شد. در این رابطه گزارش شده است که در طی تنش، ملاتونین واکنش‌های تطبیقی متعددی مانند افزایش فتوسنتز، سرعت تعرق، جذب مواد معدنی، تنظیم هورمونی، متابولیسم قند و مهار ROS را افزایش می‌دهد و فعالیت آنزیم آنتی‌اکسیدانی را تنظیم کرده و آسیب اکسیداتیو به لیپیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک را کاهش می‌دهد (Tiwari *et al.*, 2020). بر این اساس کاربرد خارجی ملاتونین در گونه‌های گیاهی مختلف با کاهش آثار تنش خشکی بر گیاه سبب کاهش آسیب به غشاء و جلوگیری از تجمع مالون دی‌آلدهید شد (Debnath *et al.*, 2019).

یکی از آثار منفی تنش‌های محیطی بر گیاهان کاهش کلروفیل است که منجر به کاهش جذب انرژی نورانی شده و فرآیند فتوسنتز و تولید ماده گیاهی را کاهش می‌دهد (Agathokleous *et al.*, 2020). نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش آبیاری در گیاه فلفل تند در شرایط مزرعه سبب کاهش معنی‌دار کلروفیل a, b و کل شده و محتوای کاروتنوئید را نیز نسبت به شاهد کاهش داد. کاهش محتوای کلروفیل گیاهان در اثر تنش خشکی یک پدیده عمومی بوده و در تحقیقات زیادی

تنش کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش آبیاری فلفل تند در شرایط آب‌وهوایی شهرستان دره‌شهر سبب کاهش پارامترهای رشدی و عملکردی گیاه شد. همچنین کاهش آبیاری در گیاه فلفل منجر به کاهش کلروفیل و افزایش معنی‌دار پرولین و مالون دی‌آلدهید شد. نتایج نشان داد که

منابع

- عین‌الدین، محمدصفا، شکوهیان، علی‌اکبر، رسولزاده، علی، و همتی، آرش (۱۴۰۲). ارزیابی تأثیر اسید فولیک و ملاتونین بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم کاماروسا تحت تنش آبی. *فرآیند و کارکرد گیاهی*، ۱۲ (۵۷)، ۱۲۷-۱۴۲. <https://doi.org/10.22034/12.57.127>
- Agathokleous, E., Feng, Z., & Penuelas, J. (2020). Chlorophyll hormesis: Are chlorophylls major components of stress biology in higher plants. *Science of the Total Environment*, 726, 138637. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138637>
- Altaf, M. A., Shahid, R., Ren, M. X., Naz, S., Altaf, M. M., Khan, L. U., & Ahmad, P. (2022). Melatonin improves drought stress tolerance of tomato by modulating plant growth, root architecture, photosynthesis, and antioxidant defense system. *Antioxidants*, 11(2), 309. <https://doi.org/10.3390/antiox11020309>
- Amiri, H., Zamani, Z., Arnao, M. B., Ismaili, A., Gavyar, P. H. H., & Khodayari, H. (2024). Optimal concentration of melatonin enhances drought stress tolerance in fenugreek. *Acta Physiologiae Plantarum*, 46(2), 15. <https://doi.org/10.1007/s11738-023-03643-3>
- Arnon, D. T. (1949). Copper enzymes in isolation chloroplast phenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology*, 24, 1-15. <https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1>
- Chen, Q., Qi, W. B., Reiter, R. J., Wei, W., & Wang, B. M. (2009). Exogenously applied melatonin stimulates root growth and raises endogenous indoleacetic acid in roots of etiolated seedlings of *Brassica juncea*. *Journal of Plant Physiology*, 166(3), 324-328. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2008.06.002>
- Cui, G., Zhao, X., Liu, S., Sun, F., Zhang, C., & Xi, Y. (2017). Beneficial effects of melatonin in overcoming drought stress in wheat seedlings. *Plant Physiology and Biochemistry*, 118, 138-149. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2017.06.014>
- Dawood, M. G. (2016). Influence of osmoregulators on plant tolerance to water stress. *Sciences Agriculture*, 13(1), 42-58. <https://doi.org/10.15192/pscp.sa.2016.13.1.4258>
- Debnath, B., Islam, W., Li, M., Sun, Y., Lu, X., Mitra, S., & Qiu, D. (2019). Melatonin mediates enhancement of stress tolerance in plants. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(5), 1040. <https://doi.org/10.3390/ijms20051040>
- Farouk, S. & Al-Amri, S. M. (2019). Ameliorative roles of melatonin and/or zeolite on chromium-induced leaf senescence in marjoram plants by activating antioxidant defense, osmolyte accumulation, and ultrastructural modification. *Industrial Crops and Products*, 142, 111823. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111823>
- Gao, W., Feng, Z., Bai, Q., He, J., & Wang, Y. (2019). Melatonin-mediated regulation of growth and antioxidant capacity in salt-tolerant naked oat under salt stress. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(5), 1176. <https://doi.org/10.3390/ijms20051176>
- González-Dugo, V., Orgaz, F., & Fereres, E. (2007). Responses of pepper to deficit irrigation for paprika production. *Scientia Horticulturae*, 114(2), 77-82. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007.05.014>
- Imran, M., Latif Khan, A., Shahzad, R., Aaqil Khan, M., Bilal, S., Khan, A., & Lee, I. J. (2021). Exogenous melatonin induces drought stress tolerance by promoting plant growth and antioxidant defence system of soybean plants. *AoB Plants*, 13(4), plab026. <https://doi.org/10.1093/aobpla/plab026>
- Kaur, G. & Asthir, B. J. B. P. (2015). Proline: A key player in plant abiotic stress tolerance. *Biologia plantarum*, 59, 609-619. <https://doi.org/10.1007/s10535-015-0549-3>

استفاده از تیمار ملاتونین به صورت محلول پاشی‌برگی آثار خشکی در گیاه را کاهش داده و منجر به افزایش رشد و عملکرد آن در شرایط مزرعه شد. تیمار ملاتونین باعث افزایش کلروفیل و کاروتنوئید شده و محتوای پرولین و مالون دی‌آلدهید را نسبت به شاهد کاهش داد. بنابراین برای کاهش آثار تنش کم آبی در گیاه فلفل استفاده از تیمار ملاتونین (غلظت ۱۰۰ میکرومولار) توصیه می‌شود.

- Khan, Z., Jan, R., Asif, S., Farooq, M., Jang, Y. H., Kim, E. G., & Kim, K. M. (2024). Exogenous melatonin induces salt and drought stress tolerance in rice by promoting plant growth and defense system. *Scientific Reports*, 14(1), 1214. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-51369-0>
- Lee, J. J., Crosby, K. M., Pike, L. M., Yoo, K. S., & Leskovar, D. I. (2005). Impact of genetic and environmental variation on development of flavonoids and carotenoids in pepper (*Capsicum* Spp.). *Scientia Horticulturae*, 106, 341-352. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2005.04.008>
- Li, X., Brestic, M., Tan, D. X., Zivcak, M., Zhu, X., Liu, S., & Liu, F. (2018). Melatonin alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO₂ and enhances the cold tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat. *Journal of Pineal Research*, 64(1), e12453. <https://doi.org/10.1111/jpi.12453>
- Morales, M. & Munne-Bosch, S. (2019). Malondialdehyde: Facts and artifacts. *Plant Physiology*, 180(3), 1246-1250. <https://doi.org/10.1104/pp.19.00405>
- Ozgur, M., Ozcan, T., Akpınar-Bayizit, A., & Yilmaz-Ersan, L. (2011). Functional compounds and antioxidant properties of dried green and red peppers. *African Journal of Agricultural Research*, 6(25), 5638-5644. <https://doi.org/10.5897/AJAR11.709>
- Paquin, R. & Lechasseur, P. (1979). Observations sur une methode de dosage de la proline libre dans les extraits de plantes. *Canadian Journal of Botany*, 57, 1851-1854. <https://doi.org/10.1139/b79-233>
- Saleh, B. K., Omer, A., & Teweldemedhin, B. (2018). Medicinal uses and health benefits of chili pepper (*Capsicum* spp.): A review. *MOJ Food Process Technology*, 6(4), 325-328. <https://doi.org/10.15406/mojfpt.2018.06.00183>
- Shahrivar, Z., Abtahi, F., & Hatami, M. (2020). Effect of growth regulator salicylate on some physiological and biochemical parameters of peppermint (*Mentha piperita* L.) under drought stress. *Journal of Plant Research*, 32(4), 724-735.
- Sharma, A., Wang, J., Xu, D., Tao, S., Chong, S., Yan, D., Li, Z., Yuan, H., & Zheng, B. (2020). Melatonin regulates the functional components of photosynthesis, antioxidant system, gene expression, and metabolic pathways to induce drought resistance in grafted *Carya cathayensis* plants. *Science of the Total Environment*, 713, 136675. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136675>
- Shi, H., Jiang, C., Ye, T., Tan, D. X., Reiter, R. J., Zhang, H., Liu, R., & Chan, Z. (2014). Comparative physiological, metabolomic, and transcriptomic analyses reveal mechanisms of improved abiotic stress resistance in bermudagrass (*Cynodon dactylon* (L.) Pers.) by exogenous melatonin. *Journal of Experimental Botany*, 66, 681-694. <https://doi.org/10.1093/jxb/eru373>
- Stewart, R. R. & Bewley, J. D. (1980). Lipid peroxidation associated with accelerated aging of soybean axes. *Plant Physiology*, 65(2), 245-248. <https://doi.org/10.1104/pp.65.2.245>
- Tiwari, R. K., Lal, M. K., Naga, K. C., Kumar, R., Chourasia, K. N., Subhash, S., & Sharma, S. (2020). Emerging roles of melatonin in mitigating abiotic and biotic stresses of horticultural crops. *Scientia Horticulturae*, 272, 109592. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109592>
- Wang, P., Sun, X., Li, C., Wei, Z., Liang, D., & Ma, F. (2013). Long-term exogenous application of melatonin delays drought-induced leaf senescence in apple. *Journal of Pineal Research*, 54(3), 292-302. <https://doi.org/10.1111/jpi.12017>
- Xalxo, R. & Keshavkant, S. (2019). Melatonin, glutathione and thiourea attenuates lead and acid rain-induced deleterious responses by regulating gene expression of antioxidants in *Trigonella foenum graecum* L. *Chemosphere*, 221, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.029>
- Yang, X., Lu, M., Wang, Y., Wang, Y., Liu, Z., & Chen, S. (2021). Response mechanism of plants to drought stress. *Horticulturae*, 7(3), 50. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7030050>
- Zhang, N., Sun, Q., Zhang, H., Cao, Y., Weeda, S., Ren, S., & Guo, Y. D. (2015). Roles of melatonin in abiotic stress resistance in plants. *Journal of Experimental Botany*, 66, 647-656. <https://doi.org/10.1093/jxb/eru336>

The effect of melatonin on yield, growth traits and some physiological parameters of hot pepper under drought stress conditions

Mehdi Amozadeh¹, Fardin Ghanbari^{*1}, Raheel Movahedi²

¹ Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

² Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

(Received: 2024/01/29, Accepted: 2024/04/07)

Abstract

Melatonin has different and important roles in many aspects of plant growth and development. Recently, it has been found that melatonin has antioxidant properties and plays a vital role in the processes of germination, maturation, aging, cell protection, and resistance to biotic and abiotic stresses. In this study, the effect of different concentrations of melatonin (0, 50, 100, and 200 μM) on yield, growth traits and some biochemical characteristics of hot pepper (*Capsicum annuum*) under different levels of deficit irrigation (irrigation after 40, 80 and 120 mm of evaporation from a class A pan) was investigated. The split plot experiment was carried out in the form of a randomized complete block design with three replications. The results showed that the reduction of irrigation decreased the growth and yield of the plant and increased the content of proline and malondialdehyde. Application of melatonin at all irrigation levels improved the growth and performance of pepper in field conditions. Also, melatonin foliar application decreased the content of proline and malondialdehyde and increased chlorophyll and carotenoid compared to the control. The concentration of 200 μM melatonin had a better effect on the growth and yield of pepper than other concentrations. Also, the effectiveness of the melatonin hormone was observed more at the irrigation level of 120 mm of evaporation. In general, the results of this research showed that the use of melatonin (especially in concentrations of 100 and 200 μM) reduced the effects of drought stress in pepper plants by increasing the content of chlorophyll and reducing the accumulation of malondialdehyde and proline.

Keywords: Antioxidant, Chlorophyll, Drought stress, Evaporation pan

Corresponding author, Email: F.ghanbari@ilam.ac.ir