

بررسی اثر غلظت‌های مختلف آهن و بور بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بومادران (*Achillea millefolium* L.)

مریم یعقوب‌زاده^۱، احمد مهتدی^{۱*}، اطهر السادات جوانمرد^۱ و علی اکبر قطبی راوندی^۲

^۱ گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج

^۲ گروه علوم و زیست‌فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲)

چکیده

گیاهان برای رشد و نمو خود به عناصر غذایی ضروری نیاز دارند. آهن و بور از جمله عناصر ریزمغذی هستند که به مقدار خیلی کم مورد نیاز گیاهان هستند. این تحقیق به صورت گلدانی به منظور بررسی اثر آهن و بور بر گیاه بومادران، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آهن در سه سطح (صفر، ۵ و ۲۰ میکرومولار) و بور در سه سطح (۲۵، ۵۰ و ۷۵ میکرومولار) انتخاب شدند. نتایج نشان داد که اثر آهن، بور و برهم‌کنش آنها بر بیشتر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران معنی‌دار بود. آهن (۲۰ میکرومولار) و بور (۷۵ میکرومولار) و برهم‌کنش آنها موجب افزایش معنی‌دار شاخص‌های کلروفیل a ، b ، کلروفیل کل، نسبت کلروفیل a/b و کاروتنوئید نسبت به نمونه‌های شاهد (آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۲۵ میکرومولار) گردید. غلظت‌های مختلف بور بر محتوای آب نسبی تأثیری نداشت. هم‌چنین غلظت‌های مختلف بور و آهن منجر به تغییر معنی‌داری در شاخص وزن خشک ریشه نگردید. آهن به صورت معنی‌داری بر میزان آهن ریشه و اندام هوایی و هم‌چنین پروتئین محلول برگ تأثیر داشت در حالی که غلظت‌های مختلف بور منجر به تفاوت معنی‌دار در میزان آهن ریشه و پروتئین محلول برگ نگردید. حداکثر میزان آهن ریشه و اندام هوایی به ترتیب ۹۵۱ و ۶۲۰ میکروگرم برگرم وزن خشک به دست آمد. به صورت کلی، به نظر می‌رسد که تیمار گیاه بومادران با غلظت‌های ۲۰ میکرومولار آهن و ۷۵ میکرومولار بور منجر به افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشد و فیزیولوژیکی این گیاه می‌گردد.

کلمات کلیدی: عناصر ریزمغذی، کلروفیل، گیاهان دارویی، وزن خشک

مقدمه

بهداشتی اولیه به‌طور سنتی به گیاهان دارویی و تولیدات طبیعی وابسته هستند. مواد مؤثره این گیاهان با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می‌شود؛ ولی ساخت آنها تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. این عوامل محیطی باعث تغییر در رشد گیاهان دارویی و هم‌چنین کیفیت مواد مؤثره و مقدار آنها می‌شود (سپهری و همکاران، ۱۳۹۶). گیاهان دارویی ذخیره

گیاهان برای رشد و تکامل خود به عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف نیاز دارند (Alloway, 2008). رویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و تولید این گیاهان را آشکار کرده است. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی (WHO)، ۸۰ درصد مردم برای مراقبت‌های

* نویسنده مسؤل، نشانی پست الکترونیکی: a.mohtadi@yu.ac.ir

کارتونوئیدها در گیاهان می‌شود و به حفظ ساختار کلروپلاست‌ها کمک می‌کند (جعفری و روستا، ۱۳۹۶).

بور یک عنصر کم‌مصرف است که برای فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابولیکی در سلول از جمله چوبی‌شدن، سنتز دیواره سلولی، سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و حفظ تمامیت غشاء مورد نیاز است (Brown et al., 2002, Catav et al., 2018). بور اغلب به صورت اسید بوریک یکی از عناصر ضروری مورد نیاز برای رشد و توسعه متعادل در گیاهان است و بر روی بسیاری از کارکردهای گیاه از جمله فرآیند گلدهی و میوه‌دهی و جوانه‌زنی دانه‌گرده اثر دارد (عقیقی شاهرودی و همکاران، ۱۳۹۶). بور رشد دانه‌گرده و به‌ویژه لوله‌گرده را تحریک می‌کند (Marschner, 2012). در بسیاری از گیاهان، نقش عنصر بور طی دوره‌ی زایشی مهم‌تر از دوره‌ی رویشی است (Iqbal et al., 2017). کمبود بور یک مشکل فراگیر در جهان است. کمبود بور به‌طور معمول در خاک‌های آهکی رخ می‌دهد و باعث توسعه نامتعارف اندام‌های تولید مثلی می‌شود و در نتیجه عملکرد گیاه را کاهش می‌دهد (توجه و همکاران، ۱۳۹۴). هر چند که بور یک عنصر ریزمغذی است ولی مقادیر بیش از حد آن در محیط رشد گیاه باعث مسمومیت می‌شود (Eraslan et al., 2007). سمیت بور منجر به کاهش میزان فتوسنتز، کاهش تقسیم سلول‌های ریشه، کاهش رشد رویشی، کلروز، ایجاد لکه‌های نکروز برجسته قهوه‌ای بر روی برگ و در نهایت کاهش رشد و عملکرد محصول می‌شود (Turan et al., 2009). سطح کفایت و سمیت بور در بافت برگ بالغ گیاهان به ترتیب ۲۰۰-۱۰ و ۲۰۰-۵۰ قسمت در میلیون و برای آهن به ترتیب ۵۰۰-۱۰۰ و بیش از ۵۰۰ قسمت در میلیون (میلی‌گرم در کیلوگرم) است (کافی و همکاران، ۱۳۹۳).

بومادران با نام علمی *Achillea* از تیره کاسنی (Asteraceae) است. این جنس در ایران ۱۹ گونه گیاهی معطر و چند ساله دارد که هفت گونه آن انحصاری ایران است (جوادی و صالحی‌شانجاتی، ۱۳۹۰). بومادران (*Achillea millefolium* L.) گیاهی است خودرو، علفی و ریزوم‌دار که ساقه‌های مستقیم به ارتفاع یک متر دارد. مهم‌ترین ترکیبات

ژنتیکی هر کشوری هستند و به همراه داروها و مواد مشتق از آنها بخش مهمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند (امیری‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۴).

از بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، هفت عنصر شامل آهن، بور، منگنز، مس، کلر، روی و مولیبدن به مقدار کم مورد نیاز گیاهان هستند و به همین دلیل آنها را ریزمغذی می‌گویند (توحیدی، ۱۳۹۴). عناصر ریزمغذی تأثیر مثبتی در افزایش کارکرد کیفی و کمی گیاهان دارند (Ramroudi et al., 2011). کمبود عناصر ریزمغذی در گیاهان و محصولات کشاورزی، گسترش جهانی دارد به طوری که ۳۰ درصد خاک‌های جهان به کمبود آهن و روی مبتلا هستند (خیای و همکاران، ۱۳۸۹).

گیاهان در بین ریزمغذی‌های مختلف، بیشترین نیاز را به آهن دارند؛ به دلیل اینکه این عنصر بخشی از گروه کاتالیزوری بسیاری از آنزیم‌های مربوط به واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء است و برای ساخت کلروفیل مورد نیاز است (شرف‌الدین شیرازی و فاضلی، ۱۳۹۴). آهن در اعمال متابولیکی نظیر تثبیت نیتروژن، تولید رنگدانه، توسعه کلروپلاست و به‌عنوان کاتالیزور در فعالیت‌های آنزیمی از جمله آنزیم‌های چرخه گلیکولات و مسیر تنفس نوری دخالت دارد (رضائی‌چیان و همکاران، ۱۳۹۴). آهن عنصری غیرمتحرک است و کمبود آن در برگ‌های جوان دیده می‌شود (محمدی و همکاران، ۱۳۹۸). کمبود آهن در خاک باعث رنگ‌پریدگی در گیاه می‌شود که در بیشتر خاک‌های ایران آشکار است (پیرزاد و همکاران، ۱۳۹۲). مصرف آهن میزان فعالیت آنزیم نیترات‌رودکتاز را که برای چرخه اسیدهای آمینه لازم است، افزایش داده و یکی از عناصر مهمی است که در سوخت و ساز نیتروژن نقش دارد و در نتیجه باعث افزایش مقدار پروتئین در گیاه می‌شود (Briat et al., 2010). آهن باعث افزایش تنظیم‌کننده‌های رشد و افزایش سنتز کلروفیل در برگ‌های جوان می‌شود و در نتیجه فتوسنتز افزایش می‌یابد و مواد فتوسنتزی بیشتری به نقاط مختلف گیاه از جمله ساقه وارد می‌شود و در نهایت ارتفاع افزایش می‌یابد (Heidarzade et al., 2016). کمبود آهن باعث تجزیه ساختمان کلروپلاست می‌شود. وجود آهن باعث افزایش سنتز

3 mM KNO₃, 2 mM Ca(NO₃)₂, 1 mM NH₄H₂PO₄, 0.5 mM MgSO₄, 20 μM Fe(Na) EDTA, 1 μM KCl, 2 μM MnSO₄, 25 μM H₃BO₃, 2 μM ZnSO₄, 0.1 μM (NH₄)₆Mo₇O₂₄ دو هفته بعد از استقرار، گیاهان در گلدان تنک شدند و ۸ گیاه در هر گلدان باقی ماند. در مرحله چهارم برگ‌های گیاهان، تیمار آهن در سه سطح (صفر، ۵ و ۲۰ میکرومولار) و تیمار بور در سه سطح (۲۵، ۵۰ و ۷۵ میکرومولار) با افزودن نمک‌های Fe(Na)EDTA و H₃BO₃ به محلول غذایی هوگلدن به مدت دو هفته اعمال شد. pH محلول غذایی با محلول دو میلی‌مولار بافر MES و با استفاده از KOH در محدوده pH حدود ۶ ثابت نگه داشته شد. تیمارها هر پنج روز یک بار در محلول غذایی اعمال شد. آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۲۵ میکرومولار به‌عنوان شاهد آزمایش بود. هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل هشت گیاه بود. گلدان‌ها در اتاق کشت در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در روز و ۱۶ درجه سانتی‌گراد در شب و تناوب نوری ۱۲ ساعت نور و ۱۲ ساعت تاریکی نگهداری شدند.

پس از پایان مدت تیمار، گیاهان برداشت‌شده و ریشه‌ها و بخش‌های هوایی گیاهان مربوط به هر گلدان جداگانه در داخل پاکت‌های کاغذی مخصوص قرار گرفت و درون آن با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت کاملاً خشک شد. سپس وزن خشک آنها اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی از جمله کلروفیل *a*، کلروفیل *b* و کلروفیل کل با استفاده از روش Arnon (۱۹۴۹) و کاروتنوئید با استفاده از روش Lichtenthaler (۱۹۸۷) صورت گرفت. مقدار ۰/۰۱ گرم از برگ تازه گیاهان در هاون چینی به خوبی ساییده شد و سپس مقدار ۱/۵ میلی‌لیتر استون ۸۰٪ به آن اضافه شد و با سرعت ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت پنج دقیقه سانتریفیوژ گردید. پس از صاف کردن، میزان کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها در محلول رویی با استفاده از جذب محلول در طول موج‌های ۶۶۳، ۶۴۵ و ۴۷۰ نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکترومتر مدل Phyller Scientific SU-6100 اندازه‌گیری و محاسبه شده و برحسب میلی‌گرم بر گرم وزن تر گیاه گزارش گردید.

میزان محتوای آب نسبی (RWC) براساس رابطه زیر اندازه‌گیری شد (Martinez et al., 2004).

مورد استفاده در سرشاخه‌های گلدان آن ترکیبات پلی‌فنولی، روغن فرار، لاکتون و برخی از انواع فلاون‌ها، رزین، تانن، بتاین‌ها، آشیلین، نمک‌های پتاسیم، اسیدهای آلی، فسفات، نیترات و ترکیبات استیلین است (زاهدی خراسانی و همکاران، ۱۳۸۵). نتایج تحقیقات Ferrandiz و Alcaraz (۱۹۸۷) نشان داد که خاصیت ضدآنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی بومادران در قسمت‌های هوایی آن وجود دارد. میزان این ترکیبات ارزشمند در گیاه بومادران معمولاً اندک است و براساس برخی فاکتورهای محیطی مانند وضعیت تغذیه‌ای گیاه تغییر می‌نماید (Alvarenga et al., 2018). بهره‌مندی مؤثر از این گیاه در صنایع نیازمند افزایش میزان رشد و بیوماس تولیدی است. لذا القاء افزایش میزان رشد و بهینه‌سازی شرایط فیزیولوژیک یکی از اهداف مهم در راستای افزایش کارایی استفاده از این گیاه در صنایع مختلف تلقی می‌گردد. با توجه به کمبود اطلاعات مربوط به تأثیر عناصر کم‌مصرف آهن و بور بر فرآیندهای رشد و فیزیولوژیک گیاه بومادران، انجام چنین پژوهش‌های ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کمبود آهن و بیش‌بود بور بر شاخص‌های رشد و فیزیولوژیکی گیاه بومادران (*Achillea millefolium* L.) انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به‌صورت گلدانی در بهار ۱۳۹۸ در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج انجام گرفت. بذر گیاه بومادران (*Achillea millefolium*) از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه و پس از ضدعفونی با محلول هیپوکلریت سدیم ۵٪ و شستشو با آب مقطر کشت گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. واحدهای آزمایشی شامل گلدان‌هایی با قطر ۱۴ و ارتفاع ۱۳ سانتی‌متر بودند. گلدان‌ها توسط پرلیت که از قبل با دستگاه اتوکلاو ضدعفونی و سپس با آب مقطر شسته شده بودند، پر شدند. از مرحله کاشت تا جوانه‌زنی، آبیاری با آب مقطر انجام شد. سپس محلول غذایی یک دوم هوگلدن برای آبیاری گلدان‌ها استفاده شد. ترکیبات مورد استفاده در محلول غذایی تغییر یافته هوگلدن به‌صورت زیر بود:

میلی لیتر محلول برادفورد اضافه و جذب نمونه در طول موج ۵۹۵ نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتری خوانده گردید. غلظت پروتئین (میلی گرم بر گرم وزن تر) با استفاده از منحنی استاندارد و با کمک آلومین سرم گاوی محاسبه شد (Bradford, 1976).

تجزیه آماری داده‌های حاصل از انجام آزمایش‌های فاکتوریل در طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم‌افزار Graphed Pad Prism صورت گرفت. داده‌های آزمایش‌ها با سه تکرار زیستی به صورت میانگین \pm SEM ارائه گردید. جهت بررسی تفاوت‌های معنی‌دار بین تیمارهای مختلف، داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس (two-way ANOVA) و آزمون Tukey در سطح آماری پنج درصد تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج و بحث

تیمارهای آهن بر مقدار کلروفیل *a*، کلروفیل *b*، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌های گیاهان بومادران در سطح یک ده هزارم و بر نسبت کلروفیل *a/b* در سطح پنج صدم اثر معنی‌دار داشت و تیمارهای بور اثر معنی‌داری بر مقدار کلروفیل *a*، کلروفیل *b*، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها در سطح یک ده هزارم و بر مقدار آنتوسیانین‌های گیاه بومادران در سطح یک هزارم و بر نسبت کلروفیل *a/b* در سطح پنج صدم نشان داد (جدول ۱). تیمار همزمان آهن و بور بر میزان کلروفیل *a*، کلروفیل *b*، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها در سطح یک ده هزارم اثر معنی‌دار داشت و بر نسبت کلروفیل *a/b* اثر معنی‌داری را نشان نداد.

در هر سه تیمار آهن، با افزایش سطح بور میزان کلروفیل *a* و کلروفیل کل در نمونه‌های برگ گیاهان بومادران افزایش پیدا کرد (شکل ۱A, C). بیشترین آنها در سطح آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۷۵ میکرومولار مشاهده شد که نسبت به شاهد (آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۲۵ میکرومولار) به ترتیب ۱۶٪ و ۳۵٪ افزایش داشتند. در سطح آهن صفر، بیشترین مقدار

$RWC = [(وزن خشک - وزن آماس) - (وزن خشک - وزن تر)] \times 100$

برای اندازه‌گیری آنتوسیانین‌ها، برگ‌های تهیه‌شده از گیاه به وزن ۰/۰۵ گرم در هاون چینی و با مقدار ۱۰ میلی لیتر متانول اسیدی به نسبت حجمی ۱:۹۹ (متانول خالص (۹۹) و اسید کلریدریک خالص (۱)) کاملاً ساییده و عصاره در لوله‌های سرپیچ دار ریخته شد و به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی و دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. سپس به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد و جذب در طول موج ۵۵۰ نانومتر اندازه‌گیری شده و غلظت آنتوسیانین برحسب میلی‌گرم بر گرم وزن تر گیاه گزارش شد (Wagner, 1979).

جهت اندازه‌گیری میزان آهن در بافت‌های گیاهی، پس از خشک‌شدن بخش هوایی و ریشه در آون، نمونه‌ها کاملاً مخلوط شده و به قطعات کوچک خرد شدند. از هر نمونه ۰/۰۵ گرم ماده گیاهی برداشت و در لوله‌های ۱۰ میلی لیتری ریخته شد و پس از افزودن دو میلی لیتر اسید نیتریک ۶۵٪ به مدت ۱۲ ساعت در زیر هود قرار داده شد. در مرحله بعد به مدت دو ساعت در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد در حمام آب گرم هضم شدند. پس از سرد شدن یک میلی لیتر پراکسید هیدروژن اضافه گردید و مجدداً در حمام آب گرم در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد تا شفاف شدن قرار داده شد. پس از سرد شدن در دمای آزمایشگاه، حجم نمونه‌ها با افزودن آب مقطر به ۱۰ میلی لیتر رسانده شدند. در نهایت مقدار آهن با استفاده از دستگاه طیف‌سنج جذب اتمی مدل (Hitach-770-8324) اندازه‌گیری شد.

به منظور اندازه‌گیری پروتئین محلول برگ، مقدار ۰/۲ گرم از بافت برگ نگهداری‌شده در فریزر (دمای ۴۰- درجه سانتی‌گراد) در هاون چینی سرد و در ظرف یخ با ۲ میلی لیتر بافر فسفات ۰/۱ مولار با اسیدیته ۶/۸ هموزن شد و سپس به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ گردید (Kar and Mishra, 1976). سپس به ۵۰ میکرولیتر از فاز بالایی عصاره (سوپرناتانت) ۲/۵

جدول ۱- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر آهن و بور بر محتوای رنگیزه‌های کلروفیل، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها در گیاه بومادران

منابع تغییرات	درجه آزادی	کلروفیل <i>a</i>	کلروفیل <i>b</i>	کلروفیل کل	کلروفیل <i>a/b</i>	کاروتنوئیدها	آنتوسیانین‌ها
آهن	۲	۰/۷۸۲۱****	۰/۶۷۰۹****	۲/۴۷۱****	۰/۹۰۳۵*	۵/۴۶۱****	۷۹۴۵۶****
بور	۲	۰/۵۸۵۳****	۰/۲۷۵۲****	۱/۵۱۳****	۰/۸۹۹۳*	۳/۸۸۳****	۸۹۸۵***
آهن × بور	۴	۰/۱۳۹۵****	۰/۱۲۲۱****	۰/۴۳۵۶****	۰/۶۲۳۸ ^{ns}	۰/۸۷۳۱****	۱۴۹۵۲****
خطا	۱۸	۰/۰۲۹۸۱	۰/۰۰۷۵	۰/۰۱۵۹	۰/۲۳۷۸	۰/۰۴۵۴	۷۰۳/۸
ضریب تغییرات	درصد	۲/۶۴	۴/۸۸	۲/۸۷	۱۰/۳۴	۲/۸۴	۵/۰۷

^{ns}، *، ** و **** به ترتیب عدم تفاوت معنی‌دار و تفاوت معنی‌دار بین تیمارهای مختلف اعمال‌شده در سطوح احتمال پنج صدم، یک هزارم و یک ده هزارم را نشان می‌دهد.


۲۵ میکرومولار مشاهده گردید (شکل ۱B). در سطح آهن صفر و ۲۰ میکرومولار، بیشترین میزان آنتوسیانین در سطح بور ۷۵ میکرومولار مشاهده شد. در این تحقیق بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۲۵ میکرومولار یا شاهد بود و کمترین مقدار مربوط به سطح آهن صفر و بور ۵۰ میکرومولار بود که نسبت به شاهد (۰/۷۰٪) کاهش نشان داد (شکل ۲C).

آهن برای ساخت کاروتنوئیدها و کلروپلاست ضروری است، بنابراین با افزایش غلظت آهن، سنتز کاروتنوئیدها نیز افزایش می‌یابد. در گیاه کاهو محلول‌پاشی عنصر ریزمغذی آهن تأثیر فراوانی در افزایش میزان کاروتنوئید داشت (منظری توکلی و همکاران، ۱۳۹۳). افزایش میزان کاروتنوئید می‌تواند نقش حفاظتی برای گیاه در برابر رادیکال‌های آزاد اکسیژن داشته و با تشکیل گزانتوفیل، مانع از تخریب کلروفیل‌ها گردد (اقدسی و همکاران، ۱۳۹۷) کاروتنوئیدها به‌عنوان آنتی‌اکسیدان‌های بیولوژیکی نقش بسیار مهمی در حفاظت از بافت‌های گیاهی دارند. به‌نحوی که عدم حضور کاروتنوئیدها باعث آسیب فتواکسیداتیو شدید در بافت‌های گیاهی می‌شود (Gill and Tuteja, 2010). آنتوسیانین‌ها رنگدانه‌های محلول در آب که متعلق به خانواده فلاونوئیدها هستند به‌عنوان گیرنده رادیکال‌های آزاد عمل می‌کنند و باعث محافظت گیاهان در برابر تنش‌های اکسیداتیو می‌شوند. این رنگدانه‌ها در مقابل

کلروفیل *b* در سطح بور ۵۰ میکرومولار مشاهده شد که نسبت به شاهد ۸۹٪ افزایش داشت. در سطح آهن ۵ و ۲۰ میکرومولار، بیشترین مقدار کلروفیل *b* در سطح بور ۷۵ میکرومولار مشاهده شد (شکل ۱B). بیشترین مقدار نسبت کلروفیل *a/b* مربوط به آهن صفر و بور ۷۵ میکرومولار بود (شکل ۲D).

بور باعث افزایش شدت فتوسنتز در برگ‌ها، افزایش تجمع ماده خشک در گیاه، بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از اندام‌های رویشی به زایشی و افزایش محتوای کلروفیل می‌شود (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۰). معمولاً در شرایط بور اضافی نسبت کلروفیل *a/b* افزایش می‌یابد (Hegazi et al., 2018). بور در متابولسیم نیتروژن تأثیر مثبت دارد و از این طریق باعث افزایش کلروفیل می‌شود (Hassanzadeh et al., 2016). آهن عنصری اساسی برای گیاهان است که نقش مهمی در عملکردهای سلولی و فیزیولوژیکی از متابولیسم تا رشد و نمو از جمله سنتز کلروفیل دارد (Alvarenga et al., 2015). عناصر ریزمغذی، آنزیم‌های دخیل در ساخت کلروفیل را فعال کرده و استفاده از آنها باعث افزایش میزان انواع کلروفیل می‌شود (Mohammadzadeh Toutouchi and Amirnia, 2016).

بیشترین میزان کاروتنوئیدها در گیاه بومادران در تمامی سطوح آهن در سطح بور ۷۵ میکرومولار مشاهده شد و کمترین میزان کاروتنوئیدها در سطح آهن ۵ میکرومولار و بور




شکل ۱- اثر برهم کنش آهن و بور بر مقدار رنگیزه‌های فوتوسنتزی در گیاه بومادران (*Achillea millefolium*). (A) کلروفیل *a* و (B) کلروفیل *b*، (C) کلروفیل کل. حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف است.

غیرمستقیم مقدار آنتوسیانین افزایش می‌یابد که احتمالاً دلیل افزایش آنتوسیانین با کاربرد آهن همین می‌باشد (حاجی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۹).

چنانچه در جدول ۲ مشاهده می‌شود، آهن بر وزن خشک

تنش‌هایی مانند ماورابنفش، خشکی، درجه حرارت کم، فلزات سنگین و غیره افزایش پیدا می‌کنند (پارسا مطلق و همکاران، ۱۳۹۶). به‌واسطه افزایش مقدار رنگدانه‌های غیرآنزیمی توسط کاربرد آهن، از تخریب کلروفیل جلوگیری شده و به‌طور



شکل ۲- اثر برهم‌کنش آهن و بور بر مقدار رنگیزه‌های فتوسنتزی در گیاه بومادران (*Achillea millefolium*). (A) نسبت کلروفیل a/b، (B) کاروتنوئیدها و (C) آنتوسیانین‌ها. حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنی‌دار بین تیمارهای مختلف می‌باشد.

اثر بور بر وزن خشک و تر بخش هوایی و طول ریشه و اندام هوایی در سطح یک ده هزارم معنی‌دار بوده و بر وزن خشک و تر ریشه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. اثر بر هم‌کنش آهن و بور بر وزن خشک و تر بخش هوایی و طول ریشه در سطح

بخش هوایی و طول ریشه در سطح یک ده هزارم و بر وزن ریشه و اندام هوایی در سطح احتمال یک هزارم اثر معنی‌دار داشت، ولی غلظت‌های مختلف آهن تفاوت معنی‌داری در شاخص‌های وزن خشک ریشه و طول اندام هوایی ایجاد نکرد.

جدول ۲- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر آهن و بور بر محتوای وزن خشک اندام هوایی و ریشه، وزن تر اندام هوایی و ریشه، و طول اندام هوایی و ریشه در گیاه بومادران

منابع تغییرات	درجه آزادی	وزن خشک اندام هوایی	وزن خشک ریشه	وزن تر اندام هوایی	وزن تر ریشه	طول اندام هوایی	طول ریشه
آهن	۲	۲۵۱۸ ^{****}	۹۵/۸۱ ^{ns}	۳۸۶۸۱ ^{***}	۷۴۶۵۲ ^{***}	۲/۲۵۲ ^{ns}	۴۲/۶۴ ^{****}
بور	۲	۴۷۳۰ ^{****}	۲۱/۴۸ ^{ns}	۲۳۷۶۷۰ ^{****}	۱۹۵۱ ^{ns}	۱۶/۴۶ ^{****}	۱۲۹/۶ ^{****}
آهن × بور	۴	۷۳۳۵ ^{****}	۱۶۴/۲ ^{ns}	۷۲۱۴۴۳ ^{****}	۷۲۰۴ ^{ns}	۷/۱۹۳ ^{***}	۲۲/۵۶ ^{****}
خطا	۱۸	۵۷/۵۹	۵۶/۴۱	۳۳۴۸	۳۳۵۳	۰/۷۴۷۷	۱/۷۰۱
ضریب تغییرات	درصد	۲/۳۲	۵۳/۷۵	۱/۷۲	۲۴/۹	۱۶/۹	۶/۵۸

^{ns}، ^{***} و ^{****} به ترتیب عدم تفاوت معنی دار و تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف اعمال شده در سطوح احتمال یک هزارم و یک ده هزارم را نشان می دهد.


تأثیرگذاری عناصر کم مصرف در انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به سمت اندام های هوایی است. با وجود آنکه بور یکی از عناصر کم مصرف اساسی برای رشد و نمو گیاهان است، به نظر می رسد که گیاه بومادران (*A. millefolium*) نیاز بالایی به این عنصر ندارد (Alvarenga et al., 2015). مشابه این تحقیق، مطالعات قبلی نیز نشان داد که غلظت های سمی بور باعث کاهش وزن خشک و تر گیاه زیتون، گوجه فرنگی و پسته شده است (Rostami et al., 2017). به طور کلی سمیت بور می تواند منجر به کاهش تقسیم سلولی و رشد ریشه شود (Ardic et al., 2009). مصرف کودهای دارای عنصر آهن می تواند با فعال کردن سیستم های آنزیمی و فعالیت های متابولیکی باعث افزایش تولید انرژی، سنتز پروتئین و قندها و در نتیجه توسعه سطوح برگ شود که در نهایت به صورت افزایش ماده خشک ملاحظه می شود (شرف الدین شیرازی و فاضلی، ۱۳۹۴).

اثر آهن بر میزان آهن اندام هوایی و ریشه، پروتئین محلول برگ و محتوای آب نسبی برگ به ترتیب در سطح یک صدم، یک هزارم، یک ده هزارم و یک صدم معنی دار بود. حداکثر میزان آهن ریشه و اندام هوایی به ترتیب ۹۵۱ و ۶۲۰ میکروگرم برگرم وزن خشک بدست آمد. اثر معنی دار بور بر میزان آهن ریشه و پروتئین محلول برگ به ترتیب در سطح یک صدم و یک ده هزارم مشاهده گردید و بر میزان آهن اندام هوایی و بر محتوای آب نسبی اثر معنی داری را نشان نداد. اثر برهم کنش

یک ده هزارم و بر طول اندام هوایی در سطح یک هزارم معنی دار بود و بر وزن خشک و تر ریشه تفاوت معنی داری نداشت.

در سطح آهن صفر و ۵ میکرومولار، با افزایش میزان بور مقدار وزن خشک اندام هوایی کاهش یافت. در سطح آهن ۲۰ میکرومولار، بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی در سطح بور ۵۰ میکرومولار مشاهده شد. کمترین مقدار وزن خشک اندام هوایی مربوط به سطح آهن ۵ میکرومولار و بور ۷۵ میکرومولار است که نسبت به شاهد، ۵۰٪ کاهش داشته است (شکل ۳A).

در شرایط مصرف توأم عناصر غذایی کم مصرف، عملکرد و رشد گیاه بیش از مصرف انفرادی این عناصر افزایش می یابد (عقیقی شاهرودی و همکاران، ۱۳۹۶). مطالعات انجام شده توسط جم و همکاران (۱۳۹۴) نشان داد که عملکرد سیب زمینی تحت تأثیر محلول پاشی کودهای ریز مغذی به صورت معنی داری افزایش یافت. بور نقش کلیدی در انتقال آب و مواد غذایی از ریشه به اندام هوایی دارد. همچنین به طور معنی داری باعث افزایش سطح برگ، محتوای کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ ها و در نتیجه باعث افزایش تجمع ماده خشک در گیاهان می شود. مرادی تلاوت و فتحی (۱۳۸۶) گزارش کردند که در کلزا مصرف بور باعث افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی می شود. افزایش ماده خشک نشان دهنده



شکل ۳- اثر سطوح مختلف عناصر آهن و بور بر میزان (A) وزن خشک بخش هوایی و (B) پروتئین محلول برگ گیاه بومادران (*Achillea millefolium*). حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف می باشد.

جدول ۳- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر تیمارهای آهن و بور بر محتوای آهن اندام هوایی و ریشه، پروتئین محلول برگ و محتوای آب نسبی در گیاه بومادران

محتوای آب نسبی	پروتئین محلول برگ	آهن ریشه	آهن اندام هوایی	درجه آزادی	منابع تغییرات
۹۰/۰۲**	۹۵/۵۱****	۱۱۴۴۷۷***	۳۶۳۷۷**	۲	آهن
۱۹/۷۲ ^{ns}	۱۲/۳۱****	۷۲۸۲۰**	۷۳۱۰۷ ^{ns}	۲	بور
۴/۹۳۱ ^{ns}	۱۰/۳۱****	۱۷۱۷۸ ^{ns}	۱۳۴۶۶*	۴	آهن × بور
۱۰/۱۰	۰/۲۸۷۶	۷۳۴۳	۳۷۳۰	۱۸	خطا
۴۳/۱۸	۲/۷۳	۲۲/۹۷	۳۴/۳۹	درصد	ضریب تغییرات

ns، *، **، *** و **** به ترتیب عدم تفاوت معنی دار، معنی داری در سطوح احتمال پنج صدم، یک صدم، یک هزارم و یک ده هزارم را نشان می دهند.

گیاهان ایجاد نکرد (جدول ۳).

در سطح آهن صفر و ۵ میکرومولار، بیشترین مقدار پروتئین محلول برگ در سطح بور ۵۰ میکرومولار و در سطح

آهن و بور بر میزان آهن اندام هوایی و پروتئین محلول برگ به ترتیب در سطح پنج صدم و یک ده هزارم معنی دار بوده ولی تفاوت معنی داری در میزان آهن ریشه و محتوای آب نسبی

نقش دارد، پس می‌توان انتظار داشت که با اعمال تیمار آهن در گیاهانی که علایم کمبود این عنصر را نشان می‌دهند، پروتئین‌سازی افزایش یابد (محمدی و همکاران، ۱۳۹۸). مطالعات انجام‌شده توسط Nasef و همکاران (۲۰۰۶) نشان داد که کاربرد بور باعث افزایش توأم میزان روغن و پروتئین در بادام زمینی شد و در توضیح گزارش خود عنوان کردند تأثیر محلول‌پاشی ممکن است به نقش این عنصر در واکنش‌های متابولیکی اساسی مرتبط باشد. هم‌چنین بور در تعدادی از مسیرهای متابولیکی مانند انتقال قندها، تعرق، متابولیسم کربوهیدرات و ایندول استیک اسید نقش اساسی دارد (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۰).

نتیجه‌گیری

در این پژوهش افزودن همزمان مواد مغذی آهن و بور در محیط‌کشت باعث افزایش معنی‌دار شاخص‌های فتوسنتزی از قبیل کلروفیل *a*، کلروفیل *b*، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها و هم‌چنین افزایش معنی‌دار پروتئین محلول شد. غلظت‌های مختلف بور تفاوت معنی‌داری در طول ریشه ایجاد نکرد ولی غلظت‌های ۵ و ۲۰ میکرومولار آهن باعث افزایش معنی‌دار طول ریشه گردید. به‌صورت کلی به‌نظر می‌رسد تیمار گیاه بومادران با غلظت‌های آهن ۲۰ میکرومولار و بور ۷۵ میکرومولار بیشترین تأثیر را در شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارد.

آهن ۲۰ میکرومولار، بیشترین مقدار پروتئین در سطح بور ۷۵ میکرومولار مشاهده شد. بالاترین مقدار پروتئین مربوط به بالاترین سطح آهن و بالاترین سطح بور بود که نسبت به شاهد ۲۷٪ افزایش داشت و کمترین مقدار پروتئین مربوط به سطح آهن صفر و بور ۷۵ میکرومولار بود (شکل ۳B).

افزایش میزان بور منجر به کاهش میزان آب نسبی می‌شود که احتمالاً به‌دلیل کاهش دسترسی به آب برای فرآیند توسعه سلولی و کاهش فشار تورژسانس است که باعث پلاسمولیز و پژمردگی سلول‌های گیاهی می‌شود (Rostami et al., 2017).

مطالعات انجام‌شده توسط Brown و همکاران (۲۰۰۷) نشان داد که در اثر مصرف آهن و روی مقدار کل کربوهیدرات‌ها، نشاسته و پروتئین دانه افزایش می‌یابد و هم‌چنین آهن در ساخت دو گروه اصلی پروتئین‌ها به‌عنوان گیرنده و دهنده الکترون در واکنش‌های تنفس، در ساختار پروتئین‌هایی نظیر لگ هموگلوبین و هم‌چنین در فرآیندهای وابسته به نور در فتوسنتز تأثیر بسزایی دارد. آهن برای ساخت پروتئین‌ها ضروری است به‌طوری‌که تعداد ریبوزوم‌های سلول‌های برگ با کمبود این عنصر کاهش پیدا می‌کنند (امیری نژاد و همکاران، ۱۳۹۴). آهن در ساخت پروتئین‌ها دخالت دارد و از طریق افزایش فردوکسین باعث افزایش احیای نیترات و تبدیل هیدرات‌های کربن به پروتئین می‌شود (وزیری کته شوری و همکاران، ۱۳۹۲). از آنجایی که آهن از مهم‌ترین عناصری است که در متابولیسم نیتروژن و سطح برگ گیاه

منابع

- اقدسی، س.، مدرس ثانوی، ع.، آقا علیخانی، م. و کشاورز، ح. (۱۳۹۷) اثر تنش کم آبی و محلول‌پاشی آهن و منگنز بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی علوفه‌ای ماش سبز (*Vigna radiata* L.) تحت تنش کم آبی. فرآیند و کارکرد گیاهی ۷: ۱۱۵-۱۰۱.
- امیری نژاد، م.، اکبری، غ.، باقی‌زاده، ا.، اله دادی، ی. و شهبازی، م. (۱۳۹۴) اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز. به‌زراعی کشاورزی ۱۷: ۸۶۶-۸۵۵.
- توجه، م.، کریمیان، ن.، رونقی، ع.، یربی، ج.، حمیدی، ر. و علما، و. (۱۳۹۴) اثر سطوح فسفر و بور بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم کلزا در شرایط کشت گلخانه‌ای. علوم فنون کشت‌های گلخانه‌ای ۶: ۹۹-۱۱۲.
- پارسا مطلق، ب.، رضوانی مقدم، ب.، قربانی، ر. و ساردویی، ذ. (۱۳۹۶) بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ۳۳: ۹۴۰-۹۲۸.

- پیرزاده، ع.، طوسی، پ. و درویش‌زاده، ر. (۱۳۹۲) اثر محلول‌پاشی عناصر آهن و روی بر صفات گیاهی و میزان اسانس آنیسون. علوم زراعی ایران ۱۵: ۱۲-۲۳.
- توحیدی، م. (۱۳۹۴) تأثیر زمان مصرف محلول‌پاشی کود کامل ریزمغذی بر عملکرد و اجرای عملکرد ماش (*Vigna radiate L.*) تحت تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهی ۷: ۵۷-۵۰.
- جوادی، ح. و صالحی شانجانی، پ. (۱۳۹۰) مقایسه برخی صفات جوانه‌زنی و بینه بذور جمعیت‌های مختلف گونه بومادران (*Achillea wilhelmsii C. Koch*) در شرایط شاهد و پیش‌سرما. علوم و تحقیقات بذر ایران ۵: ۲۷-۳۹.
- جعفری، ح. و روستا، ح. ر. (۱۳۹۶) اثر منابع مختلف آهن بر پارامترهای رویشی و فیزیولوژیک دو رقم کاهو تجاری. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای ۸: ۲۱-۳۲.
- جم، ا.، عبادی، ع. و پرمون، ق. (۱۳۹۴) نقش عناصر ریزمغذی آهن و روی در عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۹: ۱۹۰-۱۷۷.
- حاجی‌زاده، س.، جبارزاده، ز. و رسولی صدقیانی، م. ح. (۱۳۹۹) بهبود ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ژبریا رقم دانی (*Gerbera jamesonii*) با کاربرد همزمان فولیک اسید و نانو کلات آهن. فرآیند و کارکرد گیاهی ۹: ۲۲۴-۲۰۷.
- خیاوی، م.، خورشیدی بنام، م.، آفتاب بدری، م.، آذرآبادی، س.، فرامرزی، ع. و عمارت پرداز، ج. (۱۳۸۹) تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و بور بر عملکرد و برخی صفات کیفی دانه دو رقم کلزا (*Brassica napus L.*). دانش آب و خاک ۲۰: ۳۱-۴۵.
- رضائی چیان، ا.، زهتاب سلماسی، س.، پیرزاده، ع. و رحیمی، ا. (۱۳۹۴) اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه‌بهار (*Calendula officinalis L.*). علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) ۲۹: ۹۵-۱۰۲.
- زاهدی خراسانی، م.، طاهریان، ع.، وفایی، ع.، رجیبی، م. و رشیدی‌پور، ع. (۱۳۸۵) ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه‌های گیاه بومادران (*Achillea millefolium*) بر تعدیل اضطراب در موش کوچک آزمایشگاهی. علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۷: ۱۷۶-۱۷۱.
- سپهری، ع.، چیت‌ساز، ا.، قره باغلی، ن. و ثمن، م. (۱۳۹۶) اثر سولفات روی و آهن بر عملکرد و محتوای کامفرول گیاه دارویی کاسنی (*Cichorium intybus L.*). فناوری و تولیدات گیاهی ۷: ۹۹-۱۱۱.
- شرف‌الدین شیرازی، س. و فاضلی، ف. (۱۳۹۴) اثر میکروکلات آهن و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن باغی (*Thymus daenensis Celak*). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ۳: ۳۷۴-۳۸۲.
- عزیزی، خ.، نوروزیان، ع.، حیدری، س. و یعقوبی، م. (۱۳۹۰) بررسی تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی و بور بر عملکرد، برخی شاخص‌های رشد، میزان روغن و پروتئین بذر کلزا (*Brassica napus L.*) در شرایط اقلیمی خرم‌آباد. دانش زراعت ۱۹: ۱-۱۵.
- عقیقی شاهرودی، م.، عمیدی، ح. و طباطبایی، س. ج. (۱۳۹۶) اثر محلول‌پاشی آهن، بور و سلنیوم بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (*Stevia rebaudiana Bertoni*) تحت تنش شوری کلرید سدیمی. فیزیولوژی محیطی گیاهی ۱۲: ۱-۱۸.
- کافی، م.، بزویی، ا.، صالحی م.، کمندی، ع.، معصومی، ع. و نباتی، ج. (۱۳۹۳) فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان. چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد.
- محمدی، ص.، مهتدی، ا. و موحدی دهنوی، م. (۱۳۹۸) تأثیر غلظت‌های مختلف آهن بر رشد و جذب عناصر توسط گیاه کتان روغنی (*Linum usitatissimum L.*) تحت تنش شوری. فرآیند و کارکرد گیاهی ۸: ۴۶۳-۴۷۷.

- مرادی تلاوت، م. و فتحی، ق. (۱۳۸۶) واکنش متفاوت ژنوتیپ‌های گلزا به مصرف بر. مجله علمی کشاورزی ۳۰: ۱۳۷-۱۲۵.
- منظری توکلی، م.، باقری، و. و روستا، ح. (۱۳۹۳) مقایسه کارایی منابع مختلف آهن بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک کاهو در شرایط قلیایی در سیستم هیدروپونیک. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای ۵: ۴۸-۴۱.
- وزیری کته شوری، س.، دانشور، م.، سهرابی، ا. و نظریان فیروزآبادی، ف. (۱۳۹۲) تأثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی (*Cicer arietinum* L.). به زراعی کشاورزی ۱۵: ۳۰-۱۷.
- Alcaraz, M. J. and Ferrandiz, M. L. (1987) Modification of arachidonic metabolism by flavonoids. *Journal of Ethnopharmacology* 21: 209-229.
- Alloway, B. J. (2008) *Zinc in Soils and Crop Nutrition*. 2nd Ed. Published by IZA and IFA Brussels, Belgium and Paris, France.
- Alvarenga, I., Boldrin, P. F., Pacheco, F. V., Torres, S., Bertolucci, S. K. V. and Pinto, J. E. B. (2015) Effects on growth, essential oil content and composition of the volatile fraction of *Achillea millefolium* L. cultivated in hydroponic systems deficient in macro- and microelements. *Scientia Horticulturae* 197: 329-338.
- Alvarenga, I., Pacheco, F. V., Alvarenga, A. A., Bertolucci, S. K. V. and Pinto, J. E. B. (2018) Growth and production of volatile compounds of yarrow (*Achillea millefolium* L.) under different irrigation depths. *Anais da Academia Brasileira de Ciencias* 90: 3901-3910.
- Ardic, M., Sekmen, A. H., Turkan, I., Tokur, S. and Ozdemir, F. (2009) The effects of boron toxicity on root antioxidant systems of two chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars. *Plant and Soil* 314: 99-108.
- Arnon, D. I. (1949) Copper enzyme in isolated chloroplast and polyphenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology* 24: 1-15.
- Bradford, M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye-binding. *Analytical Biochemistry* 38: 248-252.
- Brown, G. R., Helen, W. M. and Sugrue, R. J. (2007) Respiratory syncytial virus assembly occurs in GM1-rich regions of the host-cell membrane and alters the cellular distribution of tyrosine phosphorylated caveolin-1. *Journal of General Virology* 83: 1841-1850.
- Brown, P. H., Bellaloui, N., Wimmer, M. A., Bassil, E. S., Ruiz, J., Hu, H., Pfeiffer, F. D. and Romheld, V. (2002) Boron in plant biology. *Plant Biology* 4: 211-229.
- Briat, J. F., Duc, C., Ravet, K. and Gaymard, F. (2010) Ferritins and iron storage in plant. *Biochimica et Biophysica Acta* 1800: 806-814.
- Catav, S. S., Genc, T. O., Kesik Oktay, M. and Kucukakyuz, K. (2018) Effect of boron toxicity on oxidative stress and genotoxicity in Wheat (*Triticum aestivum* L.). *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology* 100: 502-508.
- Eraslan, F., Inal, A., Gunes, A. and Alpaslan, M. (2007) Boron toxicity alters nitrite reductase activity, proline accumulation, membrane permeability, and mineral constituents of tomato and pepper plants. *Journal of Plant Nutrition* 30: 981-994.
- Gill, S. S. and Tuteja, N. (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. *Plant Physiology and Biochemistry* 48: 909-930.
- Hassanzadeh, A., Heidari, M., Khoshghalb, J. and Ghorbani Ghozhdi, H. (2016) Effects of nitrogen and foliar application of boron on yield and some physiological characteristics in karela (*Momordica charantia* L.). *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 32: 634-644.
- Hegazi, E. S., El-Motaium, R. A., Yehia, T. A. and Hashim, M. E. (2018) Effect of foliar boron application on boron, chlorophyll, phenol, sugars and hormones concentration of olive (*Olea europaea* L.) buds, leaves, and fruits. *Journal of Plant Nutrition* 41: 749-765.
- Heidarzade, A., Esmaeili, M. and Abbasi, R. (2016) Response of soybean to molybdenum and iron spray under well-watered and water deficit conditions. *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences* 4: 37-46.
- Iqbal, S., Farooq, M., Cheema, S. A. and Afzal, I. (2017) Boron seed priming improves the seedling emergence, growth, grain yield and grain biofortification of bread wheat. *International Journal of Agriculture and Biology* 19: 177-182.
- Kar, M. and Mishra, D. (1976) Catalase, peroxides and polyphenoloxides activities during rice leaf senescence. *Plant Physiology* 57: 315-319.
- Lichtenthaler, H. K. (1987) Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods in Enzymology* 148: 350-382.
- Marschner, H. (2012) *Mineral Nutrition of Higher Plants*. 3rd Ed. Academic Press, London.
- Martinez, J. P., Lutts, S., Schanck, A., Bajji, M. and Kinet, J. M. (2004) Is osmotic adjustment required for water stress resistance in the Mediterranean shrub *Atriplex halimus* L? *Journal of Plant Physiology* 161: 1041-1051.

- Mohammadzadeh Toutounchi, P. and Amirnia, R. (2016) Effect of foliar application of micronutrients on some morphological traits of Fenugreek (*Trigonella foenumgraecum* L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 32: 301-308.
- Nasef, M. A., Nadia Badran M. and Amal El-Hamide, F. A. (2006) Response of peanut to foliar spray with boron and/or Rhizobium inoculation. Journal of Applied Sciences Research 2: 1330-1337.
- Ramroudi, M., Keilha Jaleh, M., Galavi, M., Seghatoleslami, M. J. and Baradran, R. (2011) The effect of various micronutrient foliar applications and irrigation regimes on quantitative and qualitative yields of isabgo (*Plantago ovata* Forsk). Agroecology 3: 219-226.
- Rostami, H., Tabatabaei, S. J. and Zare Nahandi, F. (2017) Effects of different boron concentration on the growth and physiological characteristics of two olive cultivars. Journal of Plant Nutrition 40: 2421-2431.
- Turan, M. A., Taban, N. and Taban, S. (2009) Effect of calcium on the alleviation of boron toxicity and localization of boron and calcium in cell wall of wheat. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37: 99-103.
- Wagner, G. J. (1979) Content and vacuole/extra vacuole distribution of neutral sugars, free amino acids and anthocyanins in protoplast. Plant Physiology 64: 88-93.

Effect of different concentrations of iron and boron on growth and physiological properties of *Achillea millefolium* L.

Maryam Yaghobzadeh¹, Ahmad Mohtadi^{*1}, Athar Sadat Javanmard¹, Ali Akbar Ghotbi Ravandi²

¹Department of Biology, Faculty of Science, Yasouj University

²Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University

(Received: 02/06/2021, Accepted: 24/08/2021)

Abstract

Plants need essential nutrients for their growth and development. Iron and boron are micronutrients that are needed by plants in very small concentrations. This study was conducted as a pot experiment to investigate the effect of iron and boron on *Achillea millefolium* in a factorial randomized complete design with three replications. Iron at three levels (0, 5 and 20 μM) and boron at three levels (25, 50 and 75 μM) were selected. The results showed that the effects of iron, boron and their interaction on most of the growth and physiological indices of *Achillea millefolium* were significant. Iron (20 μM) and boron (75 μM) and their interaction significantly increased chlorophyll a, b, total chlorophyll content, chlorophyll a / b ratio, carotenoid compared to the control samples (20 μM iron and 25 μM boron). Different concentrations of boron had no effect on relative water content. Also, different concentrations of boron and iron did not lead to a significant change in the root dry weight. Iron significantly influenced root and shoot iron concentration and soluble leaf protein. Boron had no significant effect on shoot iron concentration, but changed other two indices significantly. The maximum amount of root and shoot iron was 951 and 620 $\mu\text{g/g DW}$, respectively. In conclusion, it seemed that treatments of *Achillea millefolium* with iron (20 μM) and boron (75 μM) lead to significant increase in growth and physiological parameters of this plant.

Keywords: Chlorophyll, Dry weight, Medicinal plants and Micronutrients.

Corresponding author, Email: a.mohtadi@yu.ac.ir