

واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

فردین مومنی^۱، مختار قبادی^{۱*}، سعید جلالی هنرمند^۱ و پرویز شکاری^۲

^۱ به ترتیب گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷)

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و مصرف کودهای روی و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک نخود رقم ILC482 آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. دو سطح آبیاری (دیم = W_1 و آبیاری تکمیلی در مرحله به نیام رفتن = W_2) به عنوان کرت اصلی و ترکیب تیمارهای کود روی از منبع سولفات روی در چهار سطح (صفر، ۴۰، ۶۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم در سه سطح (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک مورد مطالعه در گیاه نخود به جز محتوای کلروفیل **a** و آب نسبی از دست رفته‌ی برگ‌ها معنی‌دار شد. اثر کود روی نیز بر همه صفت‌ها (محتوای پرولین، پروتئین دانه، عدد کلروفیل متر، کلروفیل **a**، کلروفیل **b**، کلروفیل کل، RWL و RWD) معنی‌دار بود. اثر کود پتاسیم بر همه پارامترها به جز عدد کلروفیل متر معنی‌دار شد. نتایج نشان داد که انجام آبیاری تکمیلی، عدد کلروفیل متر، کلروفیل **b**، کلروفیل کل و محتوای نسبی آب برگ‌ها را افزایش داد. در شرایط تنفس خشکی، محتوای پرولین برگ و میزان پروتئین دانه بیش از تیمار آبیاری تکمیلی بود. همچنین در همه صفت‌ها به جز عدد کلروفیل متر کاربرد کود پتاسیم سبب بهبود صفات فیزیولوژیک شد. مصرف ۴۰ کیلوگرم کود روی سبب بهبود شاخص‌های فیزیولوژیک در گیاه نخود گردید. در شرایط آبیاری تکمیلی و به ترتیب مصرف ۴۰ و ۱۰۰ کیلوگرم از کودهای روی و پتاسیم، گیاه از وضعیت فیزیولوژیکی بهتری برخوردار بوده و بالاترین میزان عملکرد (۱۸۵۶ کیلوگرم در هکتار) را نیز تولید نمود.

واژه‌های کلیدی: پروتئین، پرولین، تنفس خشکی، کلروفیل، کود، نخود.

مقدمه:

آن در طول فصل رشد در مناطق خشک و نیمه‌خشک باعث شده است که نیاز آبی گیاهان زراعی به قدر کافی تأمین نشده و گیاهان با کمبود آب مواجه شوند (Sexana and Otoole, 2000). همچنین تحت شرایط خشکی، گیاهان عموماً پاسخ‌های فیزیولوژیکی از قبیل بستن روزنده‌ها، کاهش یا توقف فتوستز،

نخود زراعی (*Cicer arietinum* L.) در ایران حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی را به خود اختصاص می‌دهد که از این مقدار حدود ۹۸ درصد آن به صورت دیم کشت می‌گردد (بی‌نام، ۱۳۹۱). عدم وجود بارندگی کافی و پراکنش غیر یکنواخت

برگی پتاسیم تا حدی تأثیر مضر تنفس آب بر فتوستز و عوامل مربوط به فتوستز را از طریق کاهش نیازمندی‌های گیاهان تحت تنفس آب به مواد غذایی کاهش می‌دهند. مصرف برگی پتاسیم بطور معنی‌داری میزان پروولین را افزایش داده است (Bansal and Nagarajans, 1983).

عنصر روی برای رشد عادی و تولید مثل گیاهان، حیوانات و انسان‌ها ضروری می‌باشد و زمانی که میزان روی مورد نیاز برای گیاهان ناکافی باشد، عملکرد و کیفیت آنها نقصان می‌یابد (ملکوتی و همایی, ۱۳۸۳). کاربرد کود روی، میزان فتوستز و رشد زود هنگام گیاه را بیشتر می‌کند و همچنین ثبت نیتروژن، پروتئین دانه و عملکرد را بهبود می‌بخشد. استفاده بلند مدت از کودهای شیمیایی ماکرو به دلیل اسیدی شدن خاک و عدم وجود عناصر ریز مغذی در این کودها، خصوصیات مطلوب فیزیکوشیمیایی خاک را کاهش می‌دهند (Adediran *et al.*, 2004). کودهای دامی به دلیل دارا بودن عناصری نظیر روی و مس سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک شده و اثرات کمبود آب را کاهش می‌دهند. به همین دلیل استفاده مستقیم از کودهای روی به عنوان کودهای ریزمغذی سبب افزایش کارایی گیاهان و افزایش عملکرد آنها در شرایط تنفس می‌گردد (Adediran *et al.*, 2004).

نخود یکی از گیاهان زراعی مهم در استان کرمانشاه می‌باشد به طوری که استان از نظر سطح زیر کشت و تولید، دارای رتبه اول در بین استان‌های مختلف می‌باشد (بی‌نام، ۱۳۹۱). نتایج حاصل از کار محققان مختلف روی نخود نشان داد که تنفس خشکی سبب کاهش عملکرد در این گیاه می‌گردد (Mansur, *et al.*, 2010; Khurgami and Rafiee, 2009) همچنین روی و پتاسیم از عناصری هستند که می‌توانند تحمل گیاهان زراعی را در برابر خشکی افزایش دهند. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد نخود زراعی در شرایط آبیاری تکمیلی و مصرف کود پتاسیم و روی بود.

مواد و روش‌ها:

آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۷-۸۸ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. محل انجام

افزایش نسبت ریشه به ساقه و کاهش قسمت‌های رویشی را نشان می‌دهند (Secenji *et al.*, 2005). در این شرایط، مدیریت صحیح زراعی می‌تواند مفید باشد. یکی از راههای مدیریت صحیح زراعی در این شرایط، انجام آبیاری تکمیلی می‌باشد. در برخی شرایط از آبیاری بصورت مکمل بارش برای افزایش تولید نخود بهره گرفته می‌شود.

تنظیم اسمزی کاهش در پتانسیل شیره سلولی از طریق افزایش مواد محلول در داخل سلول است (Blum, 1996). علاوه بر این، اسموولیت‌های سازگار نظیر پروولین و بتائین در افزایش تحمل اثرات کمبود آب ناشی از تنفس شوری، خشکی و سرما نیز مؤثر هستند (Rhodes and Hanson, 1993). تنفس خشکی باعث افزایش محتوای پروولین گیاهان مختلف از جمله گلرنگ گردیده است (موحدی دهنی و همکاران, ۱۳۸۳). نه تنها تنفس خشکی باعث افزایش میزان پروولین در گیاهان می‌شود، در برخی موارد گزارش شده است که کاربرد برخی کودها نیز مقدار این اسموولیت را در گیاه افزایش می‌دهد (Martines *et al.*, 1994). گزارش شده که تنفس خشکی موجب کاهش میزان کلروفیل در برگ‌ها می‌شود (Kuroda *et al.*, 1990). کاهش غلظت کلروفیل در شرایط تنفس خشکی به افزایش فعالیت آنزیم کلروفیلاز نسبت داده شده است (Ashraf *et al.*, 1994). تنفس‌های محیطی از جمله خشکی بر روی تمامی ترکیبات درونی گیاهان مختلف از جمله پروتئین‌ها اثر می‌گذارند. تنفس آب در مرحله پر شدن دانه می‌تواند میزان پروتئین دانه را افزایش دهد. افزایش میزان پروتئین‌های ذخیره‌ای در گندم در شرایط تنفس خشکی گزارش شده است. تنفس‌هایی از قبیل خشکی و شوری روی محتوای نسبی آب برگ‌ها اثر گذاشته و افزایش در شدت این تنفس‌ها باعث کاهش میزان آب نسبی برگ‌های نخود می‌شود (Garg and Singla, 2009). کاهش محتوای نسبی آب برگ‌ها در گیاه یونجه تحت تأثیر تنفس خشکی گزارش شده است (El-Sayed, 1992).

پتاسیم عنصری ضروری برای همه موجودات زنده می‌باشد. این عنصر در حفظ پتانسیل اسمزی و جذب آب خیلی مهم و ضروری است و تأثیر مثبتی بر بسته شدن روزنه‌ها داشته و تحمل گیاه در برابر تنفس آب را افزایش می‌دهد. مصرف

رسم منحنی استاندارد تخمین زده شد. جذب اصلی پرولین با قرار گرفتن در فرمول زیر محاسبه گردید (Bates *et al.*, 1973):

$$\frac{بر گرم برگ تازه}{(میلی لیتر تولوئن \times میکرو گرم بر میلی لیتر پرولین)} = \frac{میکرو گرم بر مول}{(میلی گرم از نمونه) / (۱۷ \times ۱۱۵ میکرو گرم بر مول)}$$

استخراج و اندازه‌گیری میزان پروتئین دانه: برای اندازه‌گیری پروتئین دانه ابتدا پروتئین‌های دانه‌های نخود استخراج گردید. پس از استخراج پروتئین‌ها، منحنی استاندارد پروتئین‌ها به کمک پروتئین سرم آلبومن گاوی رسم گردید و بر اساس همین منحنی میزان جذب پروتئین‌ها با دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۹۵ نانومتر قرائت گردید و میزان آنها تخمین زده شد (Bradford, 1976).

اندازه‌گیری شاخص کلروفیل برگ (سبزینگی): با استفاده از دستگاه کلروفیل متر (SPAD502, Minolta, Japan) بدون تخریب بافت‌های گیاهی، جوانترین برگ انتخاب و میزان کلروفیل تخمین زده شد (Yamada and Fukutoku, 1986).

سنجهش میزان کلروفیل a و b: برای سنجش میزان کلروفیل a و b مقدار ۰/۵ گرم برگ تازه را با استفاده از نیتروژن مایع پودر نموده پس از ساتریفیوژ نمودن محلول با استفاده از مایع شفاف بالایی میزان جذب آنها برای تعیین غلظت کلروفیل‌های a و b کلروفیل کل در طول موج‌های ۶۴۵ و ۶۶۳ نانومتر و با استفاده از روابط زیر تعیین گردید (Bruisma, 1963):

$$\text{Chl-a (mg/ml)} = [(12.7(\text{ABS}663) - 2.69(\text{ABS}645)) \times V] / (1000 \times W)$$

$$\text{Chl-b (mg/ml)} = [(22.9(\text{ABS}645) - 4.69(\text{ABS}663)) \times V] / (1000 \times W)$$

$$\text{Chl-ab (mg/ml)} = [(20.2(\text{ABS}645) + 8.02(\text{ABS}663)) \times V] / (1000 \times W)$$

Mیزان جذب در طول موج‌های مورد نظر (نانومتر) = ABS

W = وزن نمونه‌ی اندازه‌گیری شده (گرم)

V = حجم نمونه استخراج شده (میلی لیتر)

محتوای آب نسبی برگ‌ها (RWC): برای اندازه‌گیری محتوای آب نسبی برگ‌ها، نمونه برداری‌ها از برگ‌های انتهایی و جوان گیاه انجام و پس از توزیں، آنها را درون آب مقطر گذاشته و وزن اشباع آنها محاسبه شد. خشک نمودن آنها، وزن خشک

آزمایش با مختصات طول جغرافیایی ۴۷ درجه و نه دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۲۱ دقیقه با ارتفاع ۱۳۱۹ متر از سطح دریا قرار دارد. متوسط بارندگی محل ۴۸۰-۴۵۰ میلی‌متر می‌باشد. خاک منطقه آزمایش دارای بافت رسی بود. بر اساس آزمون خاکشناسی، خاک منطقه دارای اسیدیته معادل ۷/۶۶ ۱/۲۲ درصد کربن آلی، ۱/۰۲ میلی‌گرم در کیلوگرم روم روی، ۳۴۸ میلی‌گرم در کیلوگرم پتانسیم قابل دسترس (سلیمانی و اصغرزاده، ۱۳۸۹) و ۹/۴ میلی‌گرم در کیلوگرم فسفر بود. خصوصیات هواشناسی محل انجام آزمایش نیز در جدول ۱ نشان داده شده است.

آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، دو سطح تیمار رطوبتی (دیم = W_1 و آبیاری تکمیلی در مرحله به نیام رفتن = W_2) به عنوان کرت اصلی و ترکیب تیمارهای کود روی از منبع سولفات روی در چهار سطح (صفرا، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار) و کود پتانسیم از منبع سولفات پتانسیم در سه سطح (صفرا، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. هر تکرار شامل ۲۴ واحد آزمایشی بود. درون هر واحد آزمایشی شش ردیف به فواصل ۲۵ سانتی متر و به طول چهار متر کشت شدند. فاصله بین ILC-482 (رضائیان زاده و همکاران، ۱۳۹۰) استفاده گردید. بذور نخود قبل از کاشت با قارچ‌کش کاربوكسین تیرام ضدغوفنی شدند. قبل از شروع غلافدهی نخود، با سه سوین به میزان سه کیلوگرم در هکتار علیه آفت هلیوپتیس (*Heliothis armigera*) سمپاشی انجام گرفت. پس از اعمال تیمارها، نمونه برداری‌ها انجام شد و صفت‌های فیزیولوژیک به ترتیب زیر اندازه‌گیری شد.

محتوای پرولین برگ‌ها: برای اندازه‌گیری محتوای پرولین برگ‌ها نمونه‌های تازه برگی پس از نمونه برداری از برگ‌های جوان بالایی پس از اعمال تیمارها و یک بار انجام شد و به کمک نیتروژن مایع پودر و پس از اضافه نمودن اسید سولفوسالیسیلیک ۲/۳ درصد به آنها وعبور از کاغذ صافی پرولین با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۲۰ نانومتر و

جدول ۱- خصوصیات هواشناسی محل انجام آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۷-۸۸

ماههای سال														
	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فوردين	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	جمع	
میزان بارندگی (mm)	۳۴۲	۰	۰	۳	۸	۵۸	۱۸	۶۷	۳۳	۵۷	۹۸	۰		
دماي حداقل (°C)		۸	۹	۱۰	۱۱	۹	۶	-۵	-۷	-۱۲	-۱۰	-۲	۵	
دماي حداکثر (°C)	۳۴	۲۹	۳۸	۳۱	۲۶	۲۲	۲۱	۱۹	۱۶	۱۸	۲۸	۳۲		

نتایج و بحث:

محتوای پرولین: نتایج نشان داد که تأثیر تمام تیمارها و بر هم کنش آنها روی محتوای پرولین برگ‌ها معنی‌دار شد (جدول ۲). در این مطالعه، تنفس خشکی سبب افزایش میزان پرولین در برگ‌های نخود گردید به طوری که در تیمار آبیاری تکمیلی میزان پرولین حدود ۱۵ درصد نسبت به تیمار عدم آبیاری کاهش داشت (جدول ۳). گزارش‌هایی در ارتباط با افزایش پرولین آزاد تحت شرایط تنفس اعلام شده است (Taher, 1988). عدهای از محققین علت افزایش محتوای پرولین در شرایط وقوع تنفس خشکی را تحریب پروتئین‌ها ذکر نموده‌اند (Taher, 1988). خشکی نه تنها رشد و نمو گیاهان را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تغییر در مسیر برخی از فرآیندهای متابولیسمی نیز می‌گردد. این تغییرات می‌تواند گیاه را در مقابل استرس مقاوم سازد. در واقع سازش با خشکی به واکنش‌هایی نیاز دارد تا از طریق آن فرآیندهای متابولیسمی اولیه ادامه پیدا کند و گیاه را برای مقابله با آن آماده کند (Sunka *et al.*, 2003). در طی خشکی دراز مدت، انتقال مواد به علت کاهش آب قابل دسترس، منجر به تغییر غلاظت برخی از متابولیتها می‌شود. از سوی دیگر، میزان محلول‌های سازگار به خشکی نظیر قندها، قندهای الکلی، آمینواسیدهای ویژه نظری پرولین، گلیسین و بتائین افزایش می‌یابد (During, 1992). افزایش در میزان پرولین از جمله واکنش‌هایی است که گیاهان مختلف از جمله نخود برای کاهش پتانسیل اسمزی خود و مقابله با تنفس خشکی از خود بروز می‌دهند. آزمایشات روی گیاهان مختلف تحت تنفس خشکی نیز این واقعیت را اثبات می‌کند (موحدی دهنوی و همکاران، ۱۳۸۳). همچنین کاهش رطوبت پاسخ‌هایی نظیر تحریب

محاسبه شده و با توجه به رابطه زیر محتوای نسبی آب برگ‌ها

محاسبه گردید (Cornic, 1994):

$$(\%)RWC = \frac{(\text{وزن خشک} - \text{وزن برگ تازه})}{(\text{وزن خشک} - \text{وزن برگ اشباع شده})} \times 100$$

اندازه گیری کاهش آب نسبی برگ‌ها (RWD): به منظور

اندازه گیری میزان کاهش نسبی آب برگ، ابتدا میزان آب نسبی برگ را بدست آورده و از رابطه زیر مقدار کاهش آب نسبی برگ اندازه‌گیری شد:

آب نسبی از دست رفته برگ‌ها = $100 - \text{کاهش نسبی آب برگ}$

اندازه گیری آب نسبی از دست رفته برگ‌ها (RWL):

برای اندازه‌گیری این صفت، نمونه‌ها به دو قسمت هم وزن تقسیم شدند. به وسیله یک قسمت از برگ‌ها، ابتدا وزن تازه آنها را محاسبه و آنگاه نمونه‌ها را به مدت پنج ساعت در آب مقطر قرار داده و بعد از این مدت وزن اشباع برگ‌ها بدست آمد. یک قسمت دیگر برگ‌ها به مدت ۵ ساعت در هوای آزاد قرار داده شد و پس از ثبت وزن پژمردگی، آنها را در آون در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده و پس از این مدت، وزن خشک آنها نیز محاسبه شد و با استفاده از این رابطه میزان آب از دست رفته برگ‌ها محاسبه گردید:

$$(\%)RWL = \frac{(\text{وزن پژمردگی} - \text{وزن تازه})}{(\text{وزن خشک} - \text{وزن اشباع})} \times 100$$

عملکرد دانه: در زمان رسیدگی کامل دو ردیف میانی هر کرت برداشت و عملکرد دانه کل بوته‌ها اندازه‌گیری شد.

آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون LSD در سطح ۵ درصد استفاده گردید.

جدول ۲- بجزیه واریانس میانات از پریوریتیک و عدگرد دانه تغییر نجت شرایط مختلف رطوبتی و مضرات کودهای پاپسم و روی میانگین مرتعلات

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه نخود تحت شرایط مختلف رطوبتی و مصرف کودهای پتابسیم و روی

عملکرد دانه (kg/ha)	RWL (درصد)	RWD (درصد)	RWC (درصد)	کلروفیل کل (mg/g)	کلروفیل ب (mg/g)	کلروفیل آ (mg/g)	عدد کلروفیل مترا (mg/g)	پروتئین دانه (mg/g)	پرولین (میکرومول برگم)	سطح آبیاری
										روی (kg/ha)
۱۶۶۷/۳۱	۰/۴۵	۲۸/۴۲	۷۱/۵۷	۸/۹۰	۲/۸۹	۶/۰۰	۲۳/۲۴	۱/۴۷	۰/۱۹	آبیاری تکمیلی
۹۶۹/۱۰	۰/۳۸	۴۴/۹۱	۵۵/۰۸	۸/۰۰	۲/۱۶	۵/۸۳	۲۰/۷۳	۱/۵۱	۰/۲۲	عدم آبیاری
۳۳/۴۴	۰/۱۸	۳/۶۷	۳/۶۷	۰/۴۲	۰/۴۰	۰/۶۵	۲/۷۷	۰/۰۲	۰/۰۱	LSD
										پتابسیم
۱۲۶۰/۴۵	۰/۳۶	۳۴/۵۵	۶۵/۴۵	۷/۹۲	۲/۱۳	۵/۷۸	۲۱/۲۹	۱/۴۲	۰/۱۹	۰
۱۳۰۸/۵۷	۰/۴۶	۴۰/۳۹	۵۹/۶۰	۸/۹۷	۲/۷۶	۶/۳۰	۲۱/۴۷	۱/۵۳	۰/۲۱	۲۰
۱۳۶۶/۷۰	۰/۴۴	۳۷/۸۵	۶۲/۱۴	۸/۵۹	۲/۸۴	۵/۷۴	۲۱/۹۷	۱/۵۲	۰/۱۹	۴۰
۱۳۲۷/۱۱	۰/۴۰	۳۳/۸۸	۶۶/۱۱	۸/۳۳	۲/۳۹	۵/۹۴	۲۳/۲۱	۱/۵۱	۰/۱۹	۶۰
۳۶/۷۲	۰/۰۵	۳/۳۶	۲/۳۶	۰/۳۸	۰/۲۸	۰/۳۳	۱/۳۲	۰/۰۳	۰/۰۰	LSD
										میزان
۱۲۵۳/۶۹	۰/۴۳	۳۴/۹۲	۶۵/۰۷	۹/۰۱	۲/۸۱	۶/۱۹	۲۱/۸۷	۱/۵۵	۰/۲۰	۰
۱۳۳۶/۳۰	۰/۳۸	۳۸/۵۸	۶۱/۴۲	۸/۱۲	۲/۵۱	۵/۶۰	۲۲/۱۰	۱/۴۳	۰/۲۰	۵۰
۱۳۶۴/۶۳	۰/۴۳	۳۶/۵۰	۶۳/۴۹	۸/۲۳	۲/۲۶	۵/۹۶	۲۱/۹۹	۱/۵۰	۰/۱۸	۱۰۰
۳۱/۸۰	۰/۰۴	۲/۹۱	۲/۹۱	۰/۳۳	۰/۲۴	۰/۲۹	۱/۱۵	۰/۰۲	۰/۰۰	LSD

دهنی و همکاران، ۱۳۸۳). همچنین گزارش شده که مصرف کود روی در گیاه گلنگ تحت شرایط تنش خشکی کمک شایانی به امر تنظیم اسمزی در این گیاه نموده است، بنابراین در مقاومت به خشکی آنها اثر دارد (موحدی دهنی و همکاران، ۱۳۸۳). نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که افزودن کودهای شیمیایی در محلول غذایی در محیط کشت گیاهان گوجه فرنگی و خیار، میزان پرولین در این گیاهان افزایش یافت (Martines *et al.*, 1994).

پروتئین دانه: اثر تمامی تیمارها به جز اثر متقابل آبیاری و کود روی، بر محتوای پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر نخود معنی‌دار گردید (جدول ۲). آبیاری تکمیلی سبب کاهش میزان پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر نسبت به تیمار عدم آبیاری گردید. در بین تیمارهای مصرف کود روی، بیشترین میزان پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در تیمار مصرف ۲۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که این مقدار با تیمار شاهد که در آن کمترین میزان پروتئین ذخیره‌ای بذر به دست آمد اختلاف

پروتئین‌های محلول و انباست برخی اسید آمینه‌های آزاد نظیر پرولین را جهت حفظ تنظیم فشار اسمزی سلول به دنبال دارد (Yamada and Fukutoku, 1986).

میزان پرولین در تیمار مصرف ۲۰ کیلوگرم در هکتار کود روی بیشتر از سایر تیمارهای کود روی بود. همچنین مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود پتابسیم سبب کاهش میزان پرولین نسبت به سایر مقادیر مصرف این کود گردید (جدول ۳). اثر متقابل سه گانه نشان داد که در تیمار عدم مصرف کود پتابسیم به همراه مصرف ۲۰ کیلوگرم در هکتار کود روی در شرایط عدم آبیاری بالاترین میزان پرولین برگ‌ها به مقدار ۰/۲۵ میکرومول بر گرم وزن تازه‌ی برگ‌ها بدست آمد. همچنین عدم مصرف کود روی به همراه مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود پتابسیم در تیمار آبیاری تکمیلی سبب کاهش میزان پرولین برگ‌ها به کمترین میزان در بین تمامی تیمارها گردید (جدول ۴). در آزمایشی مشابه کاربرد کود روی تحت شرایط تنش خشکی سبب افزایش میزان پرولین در گیاه گلنگ گردید (موحدی

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر میزان پروتئین (میکرومول برگم) در برگ نخود

عدم آبیاری						آبیاری تکمیلی					
سطوح روی (kg/ha)						سطوح روی (kg/ha)					
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰
۰/۲۰ d-g	۰/۱۸ f-h	۰/۲۵ a	۰/۲۰ d-g	۰/۲۱ b-e	۰/۲۰ d-g	۰/۲۰ d-h	۰/۱۹ e-h	۰			
۰/۱۷ hi	۰/۱۹ e-h	۰/۲۴ ab	۰/۲۲ a-d	۰/۱۹ e-h	۰/۲۱ c-f	۰/۲۰ d-g	۰/۲۰ d-g	۰/۲۰ d-g	۰/۲۰ d-g	۰/۲۰ d-g	۵۰
۰/۲۰ e-h	۰/۱۹ e-h	۰/۱۹ f-h	۰/۱۸ gh	۰/۱۶ ij	۰/۱۹ e-h	۰/۲۳ a-c	۰/۱۵ j	۰/۱۵ j	۰/۱۵ j	۰/۱۵ j	۱۰۰

مقادیری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر میزان پروتئین دانه نخود (mg/g)

عدم آبیاری						آبیاری تکمیلی					
سطوح روی (kg/ha)						سطوح روی (kg/ha)					
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰
۱/۵۹ a	۱/۵۵ ab	۱/۵۵ ab	۱/۵۸ ab	۱/۵۷ ab	۱/۵۲ a-c	۱/۵۳ a-c	۱/۵۷ ab	۰			
۱/۵۴ ab	۱/۴۹ b-d	۱/۵۳ a-c	۱/۴۲ de	۱/۴۹ b-d	۱/۴۳ c-e	۱/۴۴ c-e	۱/۱۰ f	۰			
۱/۵۰ a-d	۱/۵۴ ab	۱/۵۴ ab	۱/۳۹ e	۱/۴۰ e	۱/۵۷ ab	۱/۵۶ ab	۱/۴۴ c-e	۰/۱۵۷	۰/۱۵۷	۰/۱۵۷	۱۰۰

مقادیری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

تنش خشکی سبب افزایش میزان پروتئین های ذخیره ای در بذر گردید (Mansourifar et al., 2011). همچنین کاهش رطوبت، پاسخ هایی نظری تخریب پروتئین های محلول و انباشت برخی اسید آمینه های آزاد را جهت حفظ تنظیم فشار اسمزی سلول به دنبال دارد (Yamada and Fukutoku, 1986). افزایش میزان پروتئین دانه را در شرایط تنش خشکی به کاهش قابل توجه وزن دانه نسبت داده اند که این افزایش میزان پروتئین در بذر گندم سبب افزایش کیفیت دانه و افزایش خاصیت نانوایی آن ها می شود (متقی و همکاران، ۱۳۸۸).

محتوای کلروفیل برگ ها: نتایج نشان داد که اثر اکثر اثرهای ساده و متقابل به جز اثر ساده آبیاری بر کلروفیل a و اثر کود پتاسیم بر عدد کلروفیل متر، معنی دار گردید (جدول ۲). در تیمار عدم آبیاری، عدد کلروفیل متر، کلروفیل b و کلروفیل کل به طور معنی داری نسبت به تیمار آبیاری تکمیلی کاهش یافت (جدول ۳). تنش آبی سبب کاهش معنی دار کلروفیل b در گیاه سویا گردید (قریانی و نیاکان، ۱۳۸۴). کاهش در محتوای کلروفیل ها به احتمال زیاد به دلیل افزایش کاتابولیسم کلروفیل ها و تخریب رنگدانه های فتوستراتزی

معنی داری داشت. در بین تیمارهای مصرف کود پتاسیم نیز بیشترین میزان پروتئین های ذخیره ای بذر در تیمار عدم مصرف کود بدست آمد (جدول ۳). اثر متقابل سه گانه نیز نشان داد که بیشترین میزان پروتئین های ذخیره ای بذر به میزان ۱/۵۹ میلی گرم بر گرم وزن بذر در تیمار عدم آبیاری به همراه مصرف ۶۰ کیلوگرم در هکتار کود روی و عدم مصرف کود پتاسیم حاصل شد. این در حالی بود که کمترین میزان پروتئین ذخیره ای به میزان ۱/۱ میلی گرم بر گرم وزن بذر در شرایط آبیاری تکمیلی و مصرف ۵۰ کیلوگرم کود پتاسیم به همراه عدم مصرف کود روی بدست آمد (جدول ۵).

صرف کودهای مختلف نظیر کود روی و نیتروژن سبب افزایش میزان واردات نیتروژن از قسمت های رویشی گیاه به دانه شده و این افزایش غلظت سبب افزایش درصد پروتئین دانه می گردد (Kim and Paulsen, 1986). مقادیر بالاتر کودی سبب کاهش میزان پروتئین دانه از این مقادیر گردید زیرا این افزایش در مصرف کود سبب شده تا بخش قابل توجهی از کل محتوای نیتروژن به جای اسید آمینه یا پروتئین به صورت یون های نیترات درآید (امام و نیک نژاد، ۱۳۷۲). افزایش شدت

جدول ۶- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر غلظت عدد کلروفیل متر در نخود

عدم آبیاری				آبیاری تکمیلی				سطوح روی (kg/ha)			
سطوح روی (kg/ha)				سطوح روی (kg/ha)				سطوح پتاسیم (kg/ha)			
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰
۲۲/۴۳ c-f	۱۸/۶۳ f-h	۲۴/۲۳ a-d	۲۱/۹۳ c-f	۲۱/۶۰ c-f	۱۹/۴۰ e-h	۲۳/۰۶ c-e	۲۳/۷۳ a-d	۰			
۲۱/۸۰ c-f	۲۱/۸۶ c-f	۱۷/۱۰ f-h	۲۱/۱۰ c-g	۲۲/۴۰ c-f	۲۷/۳۰ ab	۲۰/۰۶ d-h	۲۵/۱۶ a-c	۵۰			
۲۷/۶۶ a	۲۰/۷۶ d-g	۱۶/۶۶ gh	۱۴/۶۳ h	۲۳/۴۰ b-e	۲۳/۹۰ a-d	۲۷/۷۰ a	۲۱/۲۰ c-g	۱۰۰			

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

جدول ۷- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر غلظت کلروفیل b (mg/g) در نخود

عدم آبیاری				آبیاری تکمیلی				سطوح پتاسیم (kg/ha)			
سطوح روی (kg/ha)				سطوح روی (kg/ha)							
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰				
۱/۹۴ ef	۲/۲۹ de	۲/۳۲ de	۱/۸۸ ef	۲/۹۶ cd	۳/۵۰ bc	۲/۷۱ cd	۲/۸۹ cd	۰			
۱/۸۲ ef	۱/۸۱ ef	۱/۸۹ ef	۱/۷۲ ef	۳/۲۰ bc	۲/۹۲ cd	۲/۸۰ cd	۱/۹۵ ef	۵۰			
۱/۵۹ ef	۱/۷۱ ef	۱/۷۲ ef	۱/۲۸ f	۲/۸۱ cd	۲/۸۰ cd	۳/۹۴ a	۳/۰۵ cd	۱۰۰			

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

عدد کلروفیل متر نیز در تیمار عدم آبیاری و عدم مصرف روی به همراه مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم بدست آمد. با توجه به اینکه میزان کلروفیل برگ با فراهمی کودها در ارتباط میباشد (ملکوتی و همانی، ۱۳۸۳) به نظر میرسد که در تیمارهای مصرف کود روی و پتاسیم، مواد لازم جهت ساخت کلروفیل بیشتر در اختیار گیاه بوده و میزان کلروفیل در آنها بیشتر از تیمارهای عدم مصرف این کودها میباشد. بیشترین میزان کلروفیل آ (جدول ۸) و کلروفیل کل (جدول ۹) در تیمار آبیاری تکمیلی به همراه عدم مصرف پتاسیم و مصرف ۴۰ کیلوگرم روی بدست آمد. کمترین میزان کلروفیل آ و کلروفیل کل نیز در تیمار عدم آبیاری و مصرف ۴۰ کیلوگرم روی به همراه مصرف ۵۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. در آزمایشی مشابه گزارش گردید که کاربرد کود روی سبب افزایش محتوای عدد کلروفیل متر در گیاه گلنگ گردید (موحدی دهنی و همکاران، ۱۳۸۳). آنها همچنین در این گزارش اظهار داشتند که مصرف روی، میزان کلروفیل را در این گیاه در شرایط تنش خشکی بهبود داده است که میتوان در ایجاد مقاومت به خشکی ارقام در محیط‌های مختلف توجه

میباشد که این فرآیند نیز خود نتیجه‌ی فراهم نبودن عوامل لازم جهت ستز کلروفیل و تخریب ساختمان آن در شرایط تنش میباشد (احمدی موسوی و همکاران، ۱۳۸۴).

صرف کود روی، میزان عدد کلروفیل متر را افزایش داد به طوری که در میزان ۶۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار عدد کلروفیل متر حاصل شد. همچنین بیشترین میزان کلروفیل آ مربوط به میزان مصرف ۲۰ کیلوگرم روی در هکتار و در بین سطوح پتاسیم بیشترین میزان کلروفیل آ مربوط به عدم مصرف پتاسیم بود. بیشترین میزان کلروفیل ب مربوط به میزان مصرف ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم روی در هکتار و در بین سطوح پتاسیم بیشترین میزان کلروفیل ب مربوط به عدم مصرف پتاسیم بود. بیشترین میزان کلروفیل کل مربوط به میزان مصرف ۲۰ کیلوگرم روی در هکتار و در بین سطوح پتاسیم بیشترین میزان کلروفیل کل در حالت عدم مصرف پتاسیم بدست آمد (جدول ۳). مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه نشان داد که بیشترین میزان محتوای عدد کلروفیل متر (جدول ۶) و کلروفیل ب (جدول ۷) در تیمار آبیاری تکمیلی به همراه مصرف ۱۰۰ کیلوگرم پتاسیم و ۲۰ کیلوگرم روی بدست آمد. کمترین میزان

جدول ۸- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر غلظت کلروفیل آ (mg/g) در نخود

آبیاری تکمیلی										سطوح پتاسیم (kg/ha)
عدم آبیاری					سطوح روی (kg/ha)					سطوح پتاسیم (kg/ha)
6۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۰	سطوح پتاسیم (kg/ha)
۶/۲۲ ^{a-e}	۶/۱۵ ^{a-f}	۶/۶۷ ^{ab}	۵/۹۹ ^{b-f}	۶/۰۷ ^{a-f}	۶/۹۸ ^a	۵/۵۰ ^{d-g}	۵/۶۲ ^{c-g}	۰	۰	
۴/۹۴ ^g	۳/۹۸ ^h	۶/۶۲ ^{ab}	۵/۲۲ ^{fg}	۶/۳۱ ^{a-e}	۵/۴۸ ^{d-g}	۶/۱۸ ^{a-f}	۶/۰۴ ^{a-f}	۵۰	۵۰	
۵/۹۰ ^{b-g}	۶/۴۴ ^{a-d}	۶/۱۷ ^{a-f}	۵/۳۲ ^{e-g}	۶/۱۶ ^{a-f}	۵/۴۲ ^{e-g}	۵/۷۶ ^{b-g}	۶/۵۰ ^{a-c}	۱۰۰	۱۰۰	

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

جدول ۹- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر غلظت کلروفیل کل (mg/g) در نخود

آبیاری تکمیلی										سطوح پتاسیم (kg/ha)
عدم آبیاری					سطوح روی (kg/ha)					سطوح پتاسیم (kg/ha)
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۰	سطوح پتاسیم (kg/ha)
۸/۱۶ ^{d-f}	۹/۴۵ ^{bc}	۹/۳۱ ^{bc}	۷/۸۸ ^{i-h}	۹/۰۴ ^{b-d}	۹/۶۸ ^a	۸/۲۱ ^{c-f}	۸/۵۲ ^{b-i}	۰	۰	
۶/۷۷ ^{ij}	۵/۷۹ ^k	۹/۵۱ ^{ab}	۶/۹۵ ^{hi}	۹/۵۲ ^{ab}	۸/۴۱ ^{c-f}	۸/۹۹ ^{b-e}	۷/۹۹ ^{d-g}	۵۰	۵۰	
۷/۵۰ ^{g-i}	۸/۱۶ ^{d-f}	۷/۹۰ ^{e-h}	۶/۶۱ ^{ij}	۸/۹۸ ^{b-e}	۸/۲۲ ^{c-f}	۸/۹۱ ^{b-e}	۹/۵۵ ^{ab}	۱۰۰	۱۰۰	

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

به درون گیاه هدایت یافته است. پایین آمدن RWC و کاهش تورژسانس در بافت‌های گیاهی می‌تواند اولین اثر تنش خشکی باشد که به طور طبیعی رشد سلول و اندازه نهایی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد (El-Kheir *et al.*, 1994). نتایج حاصل از اثر متقابل سه گانه نشان داد که بیشترین میزان RWC در تیمار آبیاری تکمیلی به همراه عدم مصرف کود روی و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسیم حاصل شد و کمترین میزان آن نیز در تیمار عدم آبیاری تکمیلی به همراه مصرف ۴۰ کیلوگرم کود روی و ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسیم حاصل شد (جدول ۲). تحقیقات نشان داده که بالا بودن RWC سبب می‌شود که نشت الکتروولیتها در آنها کمتر رخ داده و از پایداری غشایی Jiang and Huang (, 2002). بین سطوح تیمار کود سولفات روی، بیشترین میزان RWC مربوط به میزان مصرف ۶۰ کیلوگرم کود سولفات روی در هکtar و کمترین میزان RWC مربوط به عدم مصرف کود سولفات روی حاصل شد. به نظر می‌رسد که مصرف روی باعث افزایش RWC و در نتیجه مقاومت بیشتر گیاه نخود به تنش خشکی شده است (جدول ۳). بین سطوح تیمار کود

خاصی به نقش این گونه عناصر نمود. کلروپلاست و رنگدانه‌های فتوستتیزی موجود در گیاه از کمبود آب اثر می‌پذیرند. به عنوان مثال، تنش خشکی سبب هیدرولیز پروتئین های تیلاکوئیدی و کاهش مقدار کلروفیل‌های آ و ب می‌گردد (Synerri *et al.*, 1993). بر اساس این گزارش تجزیه‌ی این پروتئین‌های کلروپلاستی منع با ارزشی جهت شکل‌های قابل تحرک نیتروژن به محض ورود به شرایط تنش می‌باشد.

محتوای نسبی آب برگ‌ها (RWC): اثر تمامی تیمارها بر محتوای نسبی آب برگ‌ها معنی دار شد (جدول ۲). نتایج نشان که عدم آبیاری سبب کاهش معنی دار RWC گردید (جدول ۳). این نتایج با گزارش سایر محققین بر روی نخود، سبب زمینی و فلفل مطابقت داشت (منصوری‌فر و همکاران، ۱۳۹۱ و خورشیدی بنام و همکاران، ۱۳۸۱)، (Ebadi *et al.*, 2000) و (Ehrler *et al.*, 1985).

از آنجایی که محتوای نسبی آب برگ، یک شاخص مناسب برای تنش آبی گیاه است، بنابراین، از نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان دریافت که تنش آبی اعمال شده بر متابولیسم گیاه نخود مؤثر بوده و حرکت آب در جهت کاهش پتانسیل آب

جدول ۱۰- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر میزان RWC (درصد) در نخود

عدم آبیاری										آبیاری تکمیلی		
سطح روی (kg/ha)					سطح روی (kg/ha)					سطح پتاسیم (kg/ha)		
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰					
۵۳/۲۰ g-k	۶۲/۲۹ e-g	۵۲/۸۱ h-k	۵۸/۹۲ f-i	۷۶/۴۳ a-c	۷۵/۱۷ b-c	۶۹/۷۷ c-e	۷۱/۹۶ b-d
۴۷/۵۲ j-k	۵۰/۵۷ i-k	۵۲/۸۷ h-k	۵۳/۸۴ g-k	۸۰/۵۵ ab	۷۰/۵۹ c-e	۶۱/۷۱ e-h	۷۳/۸۸ bc	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۶۱/۸۱ e-h	۴۴/۶۶ k	۵۶/۴۸ f-j	۴۸/۲۰ k	۷۷/۱۳ a-c	۶۹/۵۸ c-e	۶۴/۱۹ d-f	۸۴/۸۶ a	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند

جدول ۱۱- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر میزان RWD (درصد) در نخود

عدم آبیاری										آبیاری تکمیلی		
سطح روی (kg/ha)					سطح روی (kg/ha)					سطح پتاسیم (kg/ha)		
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰					
۴۴ a-f	۴۰ c-f	۴۷ ab	۲۲ g	۴۰ a-c	۴۰ a-c	۴۳ a-f	۳۷ c-g
۴۱ b-f	۲۸ fg	۴۵ a-e	۲۶ e-g	۳۲ d-g	۴۳ a-f	۳۷ ab	۲۹ c-g	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۳۱ d-g	۴۶ a	۳۶ c-f	۴۴ a-f	۴۱ a-f	۴۲ a-c	۴۰ c-f	۳۷ c-g	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

مقداری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

بیشترین میزان RWD در تیمار عدم آبیاری تکمیلی به همراه مصرف ۴۰ کیلوگرم کود روی و ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسیم حاصل شد (جدول ۱۱).

آب نسبی از دست رفته برگ‌ها (RWL): اثر تمامی تیمارها به جز اثر آبیاری، اثر متقابل آبیاری در کود روی و اثر متقابل آبیاری در پتاسیم بر RWL معنی دار شد (جدول ۲). در گیاه لوبیا بیشترین میزان RWC و RWL در تیمار آبیاری تکمیلی بدست آمد و در تیمار عدم آبیاری مقداری آنها کمتر بود (Ferrat and Lovat, 1999).

روی، بیشترین میزان RWL مربوط به میزان مصرف ۲۰ روی، بیشترین میزان RWL مربوط به هکتار و کمترین میزان RWL مربوط به عدم مصرف کود روی بود. بین سطوح تیمار کود پتاسیم نیز بیشترین میزان RWL مربوط به عدم مصرف و همچنین مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان RWL مربوط به مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم میباشد (جدول ۳). نتایج حاصل از اثر متقابل سه گانه نشان داد که بیشترین میزان RWL در تیمار عدم آبیاری تکمیلی به همراه مصرف ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی و مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود سولفات پتاسیم حاصل شد و کمترین میزان

سولفات پتاسیم، بیشترین میزان RWC مربوط به عدم مصرف کود پتاسیم و کمترین میزان RWC مربوط به مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار بود. تغییرات RWC در گیاهان مختلف و در شرایط متفاوت به قابلیت نگه داری تورم برگ‌ها تحت شرایط تنش بستگی دارد (Bansal and Nagarajans, 1983). بیشتر اوقات در شرایطی که RWC به کمتر از ۵۰ درصد برسد به تدریج کارکردهای فیزیولوژیک گیاه مختلط می‌گردد که اگر این روند ادامه پیدا کند در نهایت مرگ یاخته فرا می‌رسد (کافی و همکاران، ۱۳۷۸).

کاهش آب نسبی برگ‌ها (RWD): اثر تمامی تیمارها روی کاهش آب نسبی برگ‌ها معنی دار شد (جدول ۲). کاهش آب نسبی برگ‌ها در تیمار آبیاری تکمیلی بیشتر از عدم آبیاری RWD بود. در بین سطوح تیمار کود روی، بیشترین میزان RWD مربوط به میزان مصرف ۲۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان RWD مربوط به میزان ۶۰ کیلوگرم کود در هکتار بود. همچنین در بین سطوح تیمار کود پتاسیم نیز بیشترین میزان RWD مربوط به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان RWD مربوط به عدم مصرف پتاسیم بود (جدول ۳). مقایسه میانگین اثر متقابل سه گانه نشان داد که

جدول ۱۲- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر میزان RWL (درصد) در نخود

عدم آبیاری		آبیاری تکمیلی		سطوح روی (kg/ha)		سطوح روی (kg/ha)		سطوح پتاسیم (kg/ha)	
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	
۴۶/۷۹ ^{a-e}	۳۷/۷۰ ^{e-g}	۳۰/۲۲ ^{g-i}	۴۱/۰۷ ^{c-f}	۲۳/۵۶ ^{i-k}	۲۴/۸۲ ^{ij}	۴۷/۱۸ ^{a-d}	۲۸/۰۳ ^{h-j}	۰	
۵۲/۴۷ ^{ab}	۴۹/۴۲ ^{a-c}	۴۷/۳۲ ^{a-d}	۴۶/۱۵ ^{a-e}	۱۹/۴۴ ^{jk}	۲۹/۴۰ ^{g-i}	۳۸/۲۸ ^{d-g}	۲۶/۱۱ ^{ij}	۵۰	
۳۸/۸ ^{d-g}	۵۵/۳۳ ^a	۴۳/۵۱ ^{b-f}	۵۰/۷۹ ^{ab}	۲۲/۶۶ ^{i-k}	۳۰/۴۱ ^{g-i}	۳۵/۸۰ ^{f-h}	۱۵/۱۳ ^k	۱۰۰	

مقادیری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

جدول ۱۳- مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری×روی×پتاسیم بر عملکرد دانه در بوته نخود (کیلوگرم در هکتار).

عدم آبیاری		آبیاری تکمیلی		سطوح روی (kg/ha)		سطوح روی (kg/ha)		سطوح پتاسیم (kg/ha)	
۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	۶۰	
۸۶۴/۱۶ ^k	۹۱۰/۲۵ ^{ijk}	۹۶۹/۵۸ ^{ghi}	۹۲۳/۶۲ ^{hijk}	۱۵۷۱/۱۱ ^{ef}	۱۴۸۹/۲۲ ^f	۱۶۱۱/۵۶ ^{cde}	۱۷۲۱/۳۴ ^b	۰	
۸۸۰/۰۲ ^{jk}	۱۰۳۰/۴۷ ^g	۱۰۷۰/۳۲ ^g	۱۰۰۷/۰۴ ^{ghi}	۱۶۴۵/۴۰ ^{cde}	۱۷۱۴/۴۸ ^b	۱۶۷۹/۶۹ ^{bed}	۱۶۹۵/۹۴ ^{bc}	۵۰	
۹۰۸/۳۵ ^{ijk}	۱۰۰۰/۷۹ ^{ghi}	۱۰۴۳/۰۹ ^g	۱۰۲۱/۳۷ ^{gh}	۱۶۸۱/۷۰ ^{bcd}	۱۷۵۱/۰۰ ^b	۱۸۵۶/۸۳ ^a	۱۶۷۹/۰۱ ^{bcde}	۱۰۰	

مقادیری که حرف مشترکی با هم ندارند در سطح آماری پنج درصد تفاوت معنی دار با هم دارند.

آبیاری×روی×پتاسیم بر عملکرد دانه در نخود نشان داد که بیشترین عملکرد دانه به میزان ۱۸۵۶/۸۳ کیلوگرم در هکتار مربوط به آبیاری تکمیلی، ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود سولفات روی و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم حاصل شد و کمترین عملکرد دانه به میزان ۸۶۴/۱۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به عدم آبیاری و عدم مصرف کودهای سولفات روی و سولفات پتاسیم حاصل شد (جدول ۱۳). هنگامی که تنش های محیطی مؤثر بر عملکرد نهایی در طول دوره رشد و نمو اتفاق می افتد، بخشی از عملکرد که در اوایل مرحله زایشی تشکیل می شود (تعداد غلاف در بوته)، عمدتاً بیشترین عکس العمل را نسبت به آن تنش نشان می دهنده. به نظر می رسد که فراهم بودن آب کافی سبب افزایش پوشش سبز، دوام سطح سبز و طول دوره رشد گیاه نخود گردید. مجموعه این عوامل منجر به افزایش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و در نهایت عملکرد دانه در واحد سطح شده است.

نتیجه گیری:

کاهش عملکرد دانه در نخود همراه با کاهش برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی مهم از جمله محتوای کلروفیل ^a

آن نیز در تیمار آبیاری تکمیلی به همراه عدم مصرف کود روی و پتاسیم حاصل شد (جدول ۱۲).

عملکرد دانه: اثر آبیاری و سطوح مختلف کودهای روی و پتاسیم و اثر متقابل سه گانه آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود (جدول ۲). آبیاری تکمیلی عملکرد دانه در واحد سطح را نسبت به تیمار عدم آبیاری حدود ۷۰ درصد افزایش داد (جدول ۳). نتایج حاصل از تحقیقات منصور و همکاران (۲۰۱۰) و خورگامی و رافعی (۲۰۰۹) تائید کننده این موضوع می باشد. مصرف روی در سطح ۴۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر سطوح تیماری دارای بیشترین میانگین عملکرد دانه با میزان ۱۳۶۶/۷ کیلوگرم در هکتار بود که پس از آن سطح ۶۰ کیلوگرم روی قرار گرفت. نهایتاً عدم مصرف روی دارای کمترین میانگین عملکرد دانه با میزان ۱۲۶۰/۴۵ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۳). بنابراین مصرف ۴۰ کیلوگرم روی در هکتار از طریق افزایش در میزان تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و افزایش شاخص برداشت باعث افزایش عملکرد دانه به میزان حدود ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به حالت عدم مصرف کود روی شد. این نتیجه با نتایج گرووال و همکاران (۱۹۹۷) مطابقت داشت. مقایسه میانگین اثر متقابل

تحمل گیاه به تنش خشکی دخالتی نداشته ولی با وقوع تنش خشکی در صد آن افزایش یافته است. مصرف کود روی در حد بهینه‌ی ۴۰ کیلوگرم سبب بهبود پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه نخود شده و همراه با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود پتانسیم سبب تولید بالاترین میزان عملکرد دانه نخود در شرایط محل اجرای آزمایش شد.

کلروفیل b و کلروفیل کل و محتوای آب نسبی برگها می‌باشد و می‌توان این گونه بیان نمود که بین این پارامترها و عملکرد دانه رابطه مستقیم وجود دارد. زمانی که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد دانه گردید محتوای پرولین برگ‌ها افزایش یافته است و این نشانه افزایش پایداری گیاه نمود در برابر تنش در اثر تولید این اسمولیت می‌باشد که در این مطالعه این امر به وقوع پیوسته است. اگر چه افزایش درصد پروتئین دانه در

منابع:

- کافی، م.، لاهوتی، م. زند، ح. شریفی، ر. و گلدانی، م. (۱۳۷۸) فیزیولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- متقی، م.، نجفیان، گ. و بی همتا، م. ر. (۱۳۸۸) اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و کیفیت نانوایی ژنتیک‌های گندم هگراپلوبیید، مجله علوم زراعی ۳: ۳۰۶-۲۹۰.
- ملکوتی، م. ج. و همائی، م. (۱۳۸۳) حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک. چاپ دوم. دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
- منصوری فر، س.، شعبان، م.، قبادی، م. و صباح پور، س. ح. (۱۳۹۱) خصوصیات فیزیولوژیک ارقام نخود زراعی تحت اثر تنش خشکی و کود نیتروژن آغازگر. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران ۵: ۵۶-۵۳.
- موحدی دهنوی، م.، مدرس ثانوی، ع. م. سروشزاده، ع. و جلالی، م. (۱۳۸۳) تغییرات میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول‌پاشی روی و متگز. بیان ۹: ۱۱۰-۹۳.
- Adediran, J. A., Taiwo, L. B. Akande, M. O. Sosulu, R. A. and Idowu, O. J. (2004) Application of organic and inorganic fertilizers for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria. *Journal of Plant Nutrition* 27: 1163- 1181.
- Ashraf, M. Y., Azimi, A. R. Khan, A. H. and Ala, S. A. (1994) Effect of water stress and total phenols, peroxide activity and chlorophyll content in wheat. *Acta Physiologia Plantarum* 16: 185-191.
- Bansal, K. C. and Nagarajans, S. (1983) Measurment of desiccation tolerance in potato leaves. *Indian Journal of Plant Physiology* 264: 418-420.
- Bates, I. S., Waldren, R. P. and Teare, I. D. (1973) Rapid determination of proline for water-stress studies. *Plant and Soil* 39: 205-207.
- احمدی موسوی، ع.، منوچهری کلانتری، خ. و ترکزاده، م. (۱۳۸۴) اثر نوعی براسینوسترولید بر مقدار تجمع مالون دآلدیید، پرولین، قند و رنگیزه‌های فتوستترزی در گیاه کلزا تحت تنش کم آبی، مجله زیست‌شناسی ایران ۴: ۲۶۷-۲۵۹.
- امام، م. و نیک نژاد، م. (۱۳۷۲) مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی، انتشارات دانشگاه شیراز.
- بی‌نام (۱۳۹۱) آمارنامه کشاورزی. جلد اول: محصولات زراعی. سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
- خورشیدی بنام، م.، رحیم‌زاده خوبی، ب. ف. میرهادی، م. ج. و نورمحمدی، ق. (۱۳۸۱) بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل رشد ارقام مختلف سیب زمینی، مجله علوم زراعی ایران ۱: ۵۸-۴۸.
- رضائیان زاده، ا.، پارسا، م.، گنجعلی، ع. و نظامی، ا. (۱۳۹۰) واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود به آبیاری تكمیلی در مراحل مختلف فنولوژی، نشریه آب و خاک ۲۵: ۱۰۹۵-۱۰۸۰.
- سلیمانی، ر. و اصغرزاده، ا. (۱۳۸۹) تأثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران ۱: ۱-۸.
- قریانی، م. و نیاکان، م. (۱۳۸۴) بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان قندهای محلول، پروتئین، پرولین، ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز گیاه سویا رقم ۵۵۱-۵۳۷.

- Kim, N. I. and Paulsen, GM. (1986) Response of yield attributes of isogenic tall, semi dwarf, and double dwarf winter wheats to nitrogen fertilizer and seeding rates. *Crop Science* 156: 197-205.
- Kuroda, M., Qzawa, T. imagawa, H. (1990) Changes in chloroplast peroxidase activities in relation to chlorophyll loss in barley leaf segments. *Physiologia Plantarum* 80: 555-560.
- Mansourifar, C., Shaban, M. Ghobadi, M. and Rostami Ajirlu, A. (2011) Effect of drought stress and N fertilizer on yield, yield components and grain storage proteins in chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars. *African Journal of Plant Science* 5: 634-642.
- Mansur C. P. Y., Palled, B, Salimath, P. M., Halikatti, S. I. (2010) An analysis of dry matter production, growth and yield in kabuli chickpea as influenced by dates of sowing and irrigation levels. *Karnataka Journal of Agricultural Sciences* 23: 457-460.
- Martines, V., Nnez, J. Orrizl, M. and Cerdá, A. (1994) Changes in amino acid and organic acid composition in tomato and cucumber plants in relation to salinity and nitrogen nutrition. *Journal of Science* 11:201-218.
- Rhodes, D. and Hanson, A. D. (1993) Quaternary ammonium and quaternary sulfonium compounds in higher plants. *Plant Physiology* 44: 357-384.
- Secenji, M, Lendvai, A, Hajosne, Z, Dudits, D and Gyorgyey, J. (2005) Experimental system for studying long-term drought stress adaptation of wheat cultivars. *Acta Biologica Szegediensis* 49: 51-52.
- Sexana, N. P. and O'toole, J. C. (2000) Field screening for drought tolerance in crop plants with emphasis on rice. 1th International workshop on field screening for drought tolerance in rice. ICRISAT Patanchero, India.
- Sunka, R., Bartels, D. and Kirch, H. H. (2003) Over expression of a stress inducible dehydrogenas gene from *Arabidopsis thaliana* in transgenic plants improves stress tolerance. *The Plant Journal* 35: 452-464.
- Synerri, C. I. M., Pizino, C. and Navariizzo, F. (1993) Chemical changes and O₂ production in thylakoid membrane under water stress. *Plant Physiology* 87: 211-216.
- Taher, A. (1988) Physiologia and lipid change in some upland rice (*Oryza sativa* L.) cultivars grown under drought stress. College Laguna (Philippines) pp: 162
- Yamada, Y. and Fukutoku, Y. (1986) Effect of water stress on soybean stress. Soybean in tropical and sub- tropical cropping system. The Asian Vegetable Research & Development Center, Shanbue, Taiwan, China Chapter 48: 373-382.
- Blum, A. (1996) Crop response to drought and the interpretation of adaptation. *Plant Growth Regulators* 20: 135-148.
- Bradford, M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Annual Biochemistry*. 72: 248-254.
- Bruisma, J. (1963) the quantitative analysis of chlorophyll a & b in plant extract. *Photochemical Photobiology* 12: 241-249.
- Cornic, G. (1994) Drought stress and high light effects on leaf photosynthesis. In: N.R. Baker and J.R. Bowyer (Eds.). *Photoinhibition of Photosynthesis. From Molecular Mechanisms to the Field* 297-313.
- During, H. (1992) Evidence for osmotic adjustment to drought in grapevines (*Vitis vinifera* L.). *VITIS Journal of Grapevine Research* 23. 1-10.
- Ebad, A., Heydarie sharifabad, H. Hashemie dezfulli, A. and Tahmasebi, Z. (2000) Effect of water deficit on accumulation of accord metabolits in different varieties of alfalfa. *Journal of Reasearch & Business* 48: 64-67.
- Ehrler, W. L., Bucks, D. A. and Nakayama, F. S. (1985) Relation among relative leaf water contents, growth and rubber accumulation in Guyaule. *Crop Science* 25: 779- 782.
- El-Kheir, M. S. A., Kandil, S. A. and Mekki, B. B. (1994) Physiological response of two soybean cultivars grown under stress conditions as affected by CCC treatment. *Egypt. Journal Physiolical Science* 18: 179-200.
- El-Sayed, H. (1992) Proline metabolism during water stress in sweet pepper (*Capsicum annum* L.) plant. *Phyton* 32:255-261.
- Ferrat, I. L. and Lovat, C. J. (1999) Relation between relative water content, nitrogen pools and growth of *Phaseolus vulgaris* L. and *P. acutifolius*, A. Gray during water deficit. *Crop Science* 39: 467-474.
- Garg, N., Singla, R. (2009) Variability in the response of chickpea cultivars to short-term salinity, in terms of water retention capacity, membrane permability and osmo-protection. *Turkish Journal of Agriculture* 33: 1-7.
- Grewal, H. S., Zhonggu, L., Graham, R. D. (1997) Influence of subsoil zinc on dry matter production, seed yield and distribution of zinc in oilseed rape genotypes differing in zinc efficiency. *Plant and Soil*, 192: 181-189.
- Jiang, Y., and Huang, B. (2002) Protein alternations in tall fescue in response to drought stress and abscisic acid. *Crop Science* 42: 202-207.
- Khurgami, A. and Rafiee, M. (2009) Drought stress, supplemental irrigation and plant densities in chickpea cultivars. *African Crop Science Conference Proceedings* 9: 141 – 143.