

مقاله پژوهشی

اثر تیمار کلشی سین و القای پلی پلوئیدی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی رقم کاشف چای (*Camellia sinensis* cv. *Kashef*)

صنم صفائی چایی کار* و کوروش فلکرو

پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲)

چکیده

چای (*Camellia sinensis* L. O. Kuntze) متعلق به خانواده تناسه و به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان اقتصادی جهان دارای خواص درمانی فراوانی بوده و به عنوان نوشیدنی مفرح مورد مصرف قرار می گیرد. القا پلی پلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی جهش زا یکی از روش های به نژادی گیاهان دارویی به منظور افزایش قابلیت تولید متابولیت های ثانویه است. به منظور بررسی تأثیر تیمار کلشی سین بر القا پلی پلوئیدی و مقایسه تغییرات صفات مختلف در گیاهان تتراپلوئید حاصله و دیپلوئید (شاهد) رقم کاشف چای، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت های مختلف کلشی سین (صفر، ۰/۲، ۰/۵ و ۱ درصد) و مدت زمان (۳ و ۶ روز متوالی) در سه تکرار انجام شد. برای تعیین سطح پلوئیدی، بررسی های مورفولوژیکی، میکروسکوپی و شمارش کروموزوم انجام شد. تعداد کروموزوم در گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید به ترتیب برابر با $2n=2x=30$ و $2n=4x=60$ ثبت گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که غلظت ۰/۵٪ کلشی سین در مدت زمان شش روز متوالی با بازدهی ۱۲/۸۲٪ مناسب ترین تیمار برای تولید گیاهان تتراپلوئید است. القای پلی پلوئیدی باعث ایجاد تغییرات معنی دار در اندازه برگ، محتوی کلروفیل و کاروتنوئید و افزایش ترکیب های فیتوشیمیایی مانند پلی فنل، کافئین و فعالیت آنتی اکسیدانی در شاخساره های تتراپلوئید نسبت به دیپلوئید گردید. همچنین شاخص تراکم روزنه در گیاهان تتراپلوئید نسبت به دیپلوئید کاهش معنی داری را نشان داد. براساس نتایج این آزمایش، افزایش سطح پلوئیدی موجب افزایش ترکیب های آنتی اکسیدانی و برخی ترکیبات فیتوشیمیایی در گیاه دارویی چای گردید.

کلمات کلیدی: آنتی اکسیدان، چای، پلی فنل، تتراپلوئیدی، کافئین

مقدمه

روستایی، کاهش فقر و امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. در ایران، چای در استان های شمالی کشور (گیلان و مازندران) به دلیل جایگاه و اهمیت بالایی که در بخش کشاورزی، صنعت و بازرگانی داراست، از جمله محصولات استراتژیک به شمار می رود (غلامی و همکاران، ۱۳۸۵). میزان تولید چای در کشور، سالانه حدود ۳۰ هزار تن چای خشک

چای با نام علمی *Camellia sinensis* L. O. Kuntze گیاهی است چند ساله و همیشه سبز از خانواده Theaceae که دارای خواص دارویی فراوانی بوده و به عنوان نوشیدنی مفرح مورد مصرف قرار می گیرد (Lv et al., 2021). چای به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان اقتصادی جهان، نقش مهمی در توسعه

* نویسنده مسؤل، نشانی پست الکترونیکی: safaei.sanam@gmail.com; safaie@areeo.ac.ir

است و با توجه به اینکه مصرف سرانه چای خشک در کشور ایران ۱/۲ کیلوگرم است، این میزان تولید، بخشی از مصرف سرانه کشور را تأمین می‌کند (بی‌نام، ۱۳۹۹). چای دارای ترکیبات پلی‌فنلی (فلاونوئید) است، پلی‌فنل‌ها ۳۵-۳۰ درصد ماده خشک چای را شامل می‌شوند (Chaturvedula and Prakash, 2011). مهم‌ترین ترکیبات پلی‌فنلی موجود در چای کاتچین‌ها هستند (Labbe and Bazinet, 2006)، که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد سرطانی و ضد جهش‌زایی بوده و اثرات مفیدی در بدن انسان دارند (Hara, 2001; Banon et al., 2007). کافئین موجود در چای از فاکتورهای مهمی است که در کنترل کیفیت نوشیدنی چای (خصوصیات چشایی چای) در سطح ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد و دارای اهمیت ویژه‌ای است (Sinija and Mishra, 2009). نتایج مطالعات سیتوژنتیکی انجام شده روی گونه *Camellia sinensis* نشان داده که تعداد کروموزوم‌ها برابر $2n=2x=30$ است (Chaudhuari, 1992).

القا مصنوعی پلی‌پلوئیدی، ابزار توانمندی در به‌نژادی بسیاری از گیاهان از جمله گیاهان دارویی است (Niazian and Nalousi, 2020). روش القای پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین باعث افزایش محتوی DNA گیاهان می‌شود و پتانسیل تولید متابولیت‌های ثانویه را افزایش می‌دهد (Dhawan and Lavania, 1996). به دلیل اهمیت گیاهان دارویی و افزایش تقاضا برای داروهای مبتنی بر متابولیت‌های ثانویه گیاهی، پلی‌پلوئیدی می‌تواند ابزار مفیدی برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی باشد (Madani et al., 2021). میزان متابولیت‌های ثانویه در ژنوتیپ‌های پلی‌پلوئید گیاهان دارویی بیشتر از والدین دیپلوئیدشان گزارش شده است (Salma et al., 2017; Pradhan et al., 2018). پلی‌پلوئیدی در بسیاری از گیاهان دارویی از جمله آب‌بشقایب (*Centella asiatica*)، بذرابلنج‌مشبک (*Hyoscyamus reticulatus*)، نعنا هندی (*Pogostemon cablin*)، پرتقال ماندارین (*Citrus reticulata*) و سیب‌زمینی وحشی (*Solanum commersonii*) منجر به افزایش متابولیت‌های ثانویه شده است (Kaensaksiri et al., 2011; Madani et al., 2015; Widoretno, 2016).

است و با توجه به اینکه مصرف سرانه چای خشک در کشور ایران ۱/۲ کیلوگرم است، این میزان تولید، بخشی از مصرف سرانه کشور را تأمین می‌کند (بی‌نام، ۱۳۹۹). چای دارای ترکیبات پلی‌فنلی (فلاونوئید) است، پلی‌فنل‌ها ۳۵-۳۰ درصد ماده خشک چای را شامل می‌شوند (Chaturvedula and Prakash, 2011). مهم‌ترین ترکیبات پلی‌فنلی موجود در چای کاتچین‌ها هستند (Labbe and Bazinet, 2006)، که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد سرطانی و ضد جهش‌زایی بوده و اثرات مفیدی در بدن انسان دارند (Hara, 2001; Banon et al., 2007). کافئین موجود در چای از فاکتورهای مهمی است که در کنترل کیفیت نوشیدنی چای (خصوصیات چشایی چای) در سطح ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد و دارای اهمیت ویژه‌ای است (Sinija and Mishra, 2009). نتایج مطالعات سیتوژنتیکی انجام شده روی گونه *Camellia sinensis* نشان داده که تعداد کروموزوم‌ها برابر $2n=2x=30$ است (Chaudhuari, 1992).

القا مصنوعی پلی‌پلوئیدی، ابزار توانمندی در به‌نژادی بسیاری از گیاهان از جمله گیاهان دارویی است (Niazian and Nalousi, 2020). روش القای پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی‌سین باعث افزایش محتوی DNA گیاهان می‌شود و پتانسیل تولید متابولیت‌های ثانویه را افزایش می‌دهد (Dhawan and Lavania, 1996). به دلیل اهمیت گیاهان دارویی و افزایش تقاضا برای داروهای مبتنی بر متابولیت‌های ثانویه گیاهی، پلی‌پلوئیدی می‌تواند ابزار مفیدی برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی باشد (Madani et al., 2021). میزان متابولیت‌های ثانویه در ژنوتیپ‌های پلی‌پلوئید گیاهان دارویی بیشتر از والدین دیپلوئیدشان گزارش شده است (Salma et al., 2017; Pradhan et al., 2018). پلی‌پلوئیدی در بسیاری از گیاهان دارویی از جمله آب‌بشقایب (*Centella asiatica*)، بذرابلنج‌مشبک (*Hyoscyamus reticulatus*)، نعنا هندی (*Pogostemon cablin*)، پرتقال ماندارین (*Citrus reticulata*) و سیب‌زمینی وحشی (*Solanum commersonii*) منجر به افزایش متابولیت‌های ثانویه شده است (Kaensaksiri et al., 2011; Madani et al., 2015; Widoretno, 2016).

شناخته‌شده‌ترین اثر پلی‌پلوئیدی در گیاهان، بزرگ شدن اندازه سلول است. با توجه به افزایش اندازه سلول، پلی‌پلوئیدها از نظر مورفولوژیکی و ریخت‌شناسی با دیپلوئیدها تفاوت دارند. به‌عنوان مثال در پلی‌پلوئیدها اندازه اندام‌هایی نظیر برگ‌ها، گل‌ها و میوه‌ها از همتای دیپلوئیدشان بزرگ‌تر است (Ovrebo and Edgar, 2018). اتوپلی‌پلوئیدها روزنه بزرگ‌تری نسبت به دیپلوئیدها دارند و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تغییرات در سطوح پلوئیدی استفاده می‌شوند (Salma et al., 2017). اخیراً Corneillie و همکاران (۲۰۱۹) با تحقیقی که روی (*Arabidopsis thaliana*) انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که پلی‌پلوئیدی منجر به تغییر دیواره سلولی و ترکیب قندی می‌شود. این تغییرات می‌تواند بر ساختارهای درگیر در تولید، ترشح و ذخیره‌سازی اسانس‌ها، مستقل از اندازه آنها تأثیر بگذارد.

بارندگی محدود در مناطق چای کاری تولید شوند (Alam and Razaq, 2015).

در رابطه با القای پلی پلوئیدی و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی چای ایران اطلاعاتی در دسترس نیست. این تحقیق با هدف بررسی امکان سنجی القای پلی پلوئیدی در رقم کاشف چای و در نهایت بهره گیری آن برای تولید گیاهان تتراپلوئید با ویژگی های فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی بالاتر اجرا گردید.

مواد و روش ها

تهیه مواد گیاهی، طرح آزمایشی و اعمال تیمارها: نهال های دو ساله (تکثیر غیرجنسی) رقم کاشف چای از ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فشالم به ستاد پژوهشکده چای انتقال و در گلدان های پلاستیکی کشت و گلدان ها در فضای مخصوص (سایه بان) نهال های چای نگهداری گردیدند. در مرحله ۲ تا ۳ برگی شاخساره های فعال، تیمار کلشی سین با غلظت های صفر، ۰/۲، ۰/۵ و ۱ درصد (وزنی/حجمی) و زمان های ۳ و ۶ روز متوالی با اعمال بر مریستم انتهایی شاخساره های فعال توسط تکنیک گلوله پنبه ای انجام گردید (Sebasthiampillai, 1976; Goswami and Sharma; 1979) (شکل ۱). به منظور استقرار و جذب بهتر کلشی سین در محل مریستم، به تمامی تیمارهای مورد استفاده مقدار ۴-۵ قطره توئین ۲۰ افزوده شد. پس از تیمار، به منظور جلوگیری از تبخیر کلشی سین و خشک شدن گلوله های پنبه ای، شاخساره های مورد نظر با پاکت های پلاستیکی مشبک پوشانده شد و در پایان دوره تیمار، پاکت ها برداشته شدند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار طی سال های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شد.

شناسایی مقدماتی شاخساره های تغییر یافته: پس از رشد جوانه های زنده و رسیدن به مرحله ۴-۵ برگی، بررسی مقدماتی سطح پلوئیدی کلیه شاخساره های تیمار شده با کلشی سین ابتدا از طریق بررسی و مقایسه مشخصات و ویژگی های ظاهری با شاخساره های شاهد (تیمار نشده) انجام

پلی پلوئیدی در گونه های *Camellia* ممکن است منجر به تنوع فنوتیپی گردد. به طور کلی در چای، تری پلوئیدها نسبت به دیپلوئیدها قوی تر، سخت تر و متحمل به سرما هستند (Simura and Osone, 1956). مطالعات مورفولوژیک و آناتومیک پلی پلوئیدهای چای، محدوده وسیعی از تنوع فنوتیپی و خصوصیات آناتومیکی نظیر فراوانی و اندازه روزنه را نشان داده است (Chaudhuari, 1992). میانگین تعداد روزنه در گیاهان تتراپلوئید، تری پلوئید و دیپلوئید چای به ترتیب ۲۱/۹، ۳۲/۵ و ۴۱/۴ گزارش گردیده است (Ahmed and Singh, 1993). طبق گزارش Shiyani و Depeng (۱۹۸۹) تعداد کلروپلاست سلول های محافظ گونه های دیپلوئید، تریپلوئید و تتراپلوئید چای به ترتیب ۱۶، ۲۴ و ۳۲ بیان گردید. در اکثر موارد نشان داده شده که پلی پلوئیدی در چای میزان عملکرد را افزایش می دهد (Jayasuriya and Govindarajulu, 1975; Sharma and Ranganathan, 1986; Gunasekera and Ranatunga, 2003; Alam and Razaq, 2015) ولی این مورد همیشه صدق نمی کند و مواردی وجود دارد که افزایش پلی پلوئیدی منجر به کاهش تولید گردیده است (Banerjee, 1994; Wachira, 1992b). هر چند، تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها در سطوح پلوئیدی مشابه از لحاظ عملکرد می تواند وجود نداشته باشد. در موارد خاص، که تریپلوئیدها عملکرد بالاتری از دیپلوئیدها دارند، به پتانسیل برای گزینش و یا توسعه ارقام پلی پلوئید با عملکرد بالا دلالت دارد. با این اوصاف، توانایی ریشه دهی، اندازه برگ و وزن خشک برگ تریپلوئیدها و تتراپلوئیدها بیشتر از دیپلوئیدها است در حالی که در پنتاپلوئیدها و آنیپلوئیدهای چای کمتر است (Baberjee, 1992b). سطوح مختلف پلوئیدی، اثرات متفاوتی را بر فیزیولوژی گیاه چای می گذارد. گیاهان تتراپلوئید و تری پلوئید چای به دلیل افزایش اندازه سلول، قدرت و سختی بیشتری دارند، حال آن که، گیاهان تری پلوئید به دلیل افزایش اندازه سلول ها و عقیمی، می توانند قدرت بیشتری داشته باشند. القای پلی پلوئیدی با استفاده از مواد شیمیایی ابزار مهمی برای بهبود فیزیولوژی و تولید گیاهان شناخته شده است، بنابراین، گیاهان پلی پلوئید چای باید برای غلبه بر مشکل عملکرد پایین و



شکل ۱- تیمار مریستم انتهایی شاخساره‌های فعال با غلظت‌های مختلف کلسی سین توسط تکنیک گلوله پنبه‌ای

بزرگنمایی $40 \times$ بررسی شدند. با استفاده از این روش تعدادی از گیاهان مشکوک به پلی‌پلوئیدی تفکیک شدند.

ارزیابی سطح پلوئیدی از طریق سیتوزنتیک: ابتدا حدود $0/5$ تا 1 سانتی‌متر از جوانه شاخساره فعال، جدا و در داخل ظرف نمونه‌گیری حاوی مخلوط آب‌مقطر و یخ قرار داده و پس از انتقال به آزمایشگاه، قسمت انتهایی مریستم توسط تیغ اسکالپل جدا و برای مدت 8 ساعت به محلول پیش‌تیمار آلفا برومونفتالین منتقل شدند (عاشوری، 1387 ؛ عاشوری و همکاران، 1397). پس از خارج کردن جوانه‌ها از محلول پیش‌تیمار، شستشو و در محلول تثبیت‌کننده کارنوی (۱ قسمت اسید استیک و سه قسمت اتانول) در یخچال نگهداری گردیدند و با گذشت 24 ساعت برای مدت 30 دقیقه در آب جاری شستشو داده شدند (عاشوری، 1387 ؛ عاشوری و همکاران، 1397). جوانه‌ها در محلول اسید کلریدیک (HCl) یک نرمال به مدت 20 دقیقه در حمام آبی 60 درجه سانتی‌گراد هیدرولیز و پس از شستشو رنگ‌آمیزی با رنگ استوارسین $1/5$ درصد صورت گرفت (عاشوری، 1387 ؛ عاشوری و همکاران، 1397). در مرحله آخر نمونه‌ها روی لام قرار داده شد و بعد از اسکواش، شمارش کروموزوم توسط میکروسکوپ نوری (Nikon eclipse 50i) با بزرگنمایی $100 \times$ انجام شد.

شد. بدین ترتیب که گیاهان مشکوک به پلی‌پلوئیدی با ویژگی‌های تأخیر در رشد پس از اعمال تیمار، تفاوت در اندازه برگ به‌صورت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن، شکل و رنگ برگ (که معمولاً تیره‌تر از گیاهان شاهد بودند) در مقایسه با گیاهان شاهد گزینش شده (Ng'etich and Wachira, 1992; Banerjee, 1992) و ویژگی‌های مختلف اندازه‌گیری شدند.

بررسی خصوصیات روزنه: گیاهانی که در مرحله اول از طریق بررسی صفات ظاهری گزینش شده بودند، در مرحله دوم با استفاده از روش میکروسکوپی بررسی و غربال شدند. برای مشاهده روزنه‌ها، برگ سوم هر یک از گیاهان مشکوک به پلی‌پلوئیدی انتخاب و جدا و سپس اپیدرم زیرین برگ با استفاده از لاک ناخن جدا شد. به‌این منظور بخشی از برگ ($10 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$) که ترجیحاً فاقد رگبرگ اصلی هستند، با استفاده از لاک‌ناخن پوشانده، پس از 5 تا 10 دقیقه خشک شده، سپس با استفاده از یک تیغ تیز حاشیه‌های نمونه را به شکل چهارگوش درآورده، نوار چسبی شفاف روی آن چسبانده، و با انگشت شست فشار داده تا اپیدرم کاملاً به چسب متصل شود. سپس چسب که اپیدرم به‌صورت لایه شفاف بسیار نازکی به آن چسبیده است، جدا و روی لام چسبانده شد (Smith et al., 1989). ویژگی‌های روزنه نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری (Nikon eclipse 50i) با

عکس برداری از نمونه های تهیه شده با استفاده از دوربین Nikon مدل E-100 که بر روی میکروسکوپ نوری مدل Nikon eclipse 50i نصب شده بود به مانیتور منتقل و ذخیره شد. از هر تیمار تعداد ۱۵ اسلاید و از هر اسلاید تعداد پنج سلول انتخاب و شمارش کروموزوم آنها انجام شد و به این صورت در دو گروه طبقه بندی شدند: ۱- سلول های دیپلوئید که تغییر تعداد کروموزوم را نشان ندادند و ۲- سلول های تتراپلوئید که تعداد کروموزوم آنها دو برابر تعداد کروموزوم سلول های دیپلوئید بود. در ادامه داده های هر گروه دیپلوئید و تتراپلوئید براساس درصد محاسبه شد (اکبری و همکاران، ۱۳۹۸).

ارزیابی برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و

فیتوشیمیایی: پس از تعیین بهترین غلظت و مدت زمان اعمال کلشی سین (غلظت ۰/۵ درصد و مدت زمان شش روز متوالی) برای القا پلی پلوئیدی که با انجام عمل اسکواش و شمارش کروموزومی حاصل شد، برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی در نهال های تکثیری، مورد بررسی قرار گرفتند.

طول و عرض برگ سوم: طول و عرض برگ سوم با

استفاده از خط کش اندازه گیری شد.

اندازه گیری کلروفیل و کاروتنوئید: اندازه گیری

کلروفیل های a و b به روش آرنون (Arnon, 1949) و کاروتنوئید کل به روش Price و Hendry (۱۹۹۱) انجام گرفت. به ۰/۲ گرم نمونه برگ سیبیده در ازت مایع، ۱۰ میلی لیتر استون سرد ۸۰٪ اضافه گردید، سپس ۱۵ دقیقه در ۶۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. قسمت رویه شناور نمونه ها به آرامی با سمپلر برداشته و به تیوپ های درب دار منتقل و پس از افزودن ۹ میلی لیتر استون سرد ۸۰٪ به حجم ۱۰ میلی لیتر رسانده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل Hanon ساخت چین میزان جذب در طول موج های ۴۸۰ (کاروتنوئید)، ۶۴۵ (کلروفیل b) و ۶۶۳ (کلروفیل a) نانومتر خوانده شدند. برای تنظیم دستگاه، از استون سرد ۸۰٪ به عنوان بلانک استفاده شد.

اندازه گیری مقدار پلی فنل: ۰/۲ گرم برگ سبز خشک

آسیاب شده توزین و در لوله آزمایش در بن ماری ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد و با ۵ میلی لیتر متانول که قبلاً تا ۷۰ درجه سانتی گراد گرم شده است، مخلوط گردید. مخلوط حاصل به مدت ۱۰ دقیقه حرارت داده و در این مدت دو بار عمل هم زدن در ۵ و ۱۰ دقیقه تکرار شد. پس از خنک شدن، فاز رویی از کاغذ صافی عبور و به لوله مدرج ۱۰ میلی لیتری انتقال یافت. این عملیات مجدداً تکرار شده و عصاره حاصل از دو مرحله با محلول متانول در دمای اتاق به حجم ۱۰ میلی لیتر رسانده شد. یک میلی لیتر از این عصاره با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسید. یک میلی لیتر از عصاره استخراج شده چای، ۵ میلی لیتر معرف فولین سیوکالتوفنل و ۴ میلی لیتر محلول کربنات سدیم در مدت ۳ تا ۸ دقیقه در لوله آزمایش مخلوط شدند. جذب محلول تهیه شده و استاندارد گالیک اسید پس از یک ساعت نگهداری در دمای اتاق در طول موج ۷۶۵ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل Hanon ساخت کشور چین خوانده شد (استاندارد ملی ایران، ۱۳۸۵). با استفاده از رابطه ۴ درصد پلی فنل کل به دست آمد (استاندارد ملی ایران، ۱۳۸۵)

رابطه ۴

$$A_{\text{sample}} \times V_{\text{sample}} \times d \times 100 / (S_{\text{std}} \times m_{\text{sample}} \times 1000000) = \text{درصد پلی فنل کل}$$

A_{sample} : میزان جذب نمونه در طول موج ۷۶۵ نانومتر؛

V_{sample} : حجم نمونه؛ d : ضریب رقت؛ S_{std} : شیب خط منحنی

استاندارد و m_{sample} : جرم نمونه

فعالیت آنتی اکسیدانی: ۰/۱ گرم برگ سبز خشک آسیاب

شده با ۱۰ میلی لیتر متانول به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. پس از رسیدن به دمای محیط، از کاغذ صافی عبور داده شد. یک میلی لیتر از محلول رویی صاف شده با متانول به نسبت ۱:۱۰ رقیق شد. محلول ۰/۰۳ درصد DPPH (در متانول) تهیه شده و جذب آن بلافاصله در ۵۱۷ نانومتر خوانده شد. ۳۰۰ میکرو لیتر از محلول صاف شده اصلی و ۳۰۰ میکرو لیتر از محلول رقیق شده با ۳ میلی لیتر محلول ۰/۰۳ درصد DPPH (در متانول) به شدت مخلوط شده

نمونه‌های تتراپلوئید $2n=4x=60$ به دست آمد (شکل ۲). نتایج تجزیه واریانس در رابطه با اثرات ساده تیمارهای مختلف نشان‌دهنده اثر معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد غلظت کلشی‌سین و مدت زمان تیمار بر درصد احتمالی گیاهان تتراپلوئید برای رقم مورد مطالعه بود (جدول ۱). همچنین اثر متقابل غلظت کلشی‌سین و مدت زمان تیمار نیز در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان تتراپلوئیدی برای رقم کاشف (شکل ۳)، در غلظت ۰/۵ درصد کلشی‌سین و مدت زمان شش روز متوالی مشاهده شد. Heo و همکاران (۲۰۱۶) به این نتیجه دست یافتند که در *Lilium leichtlinii* طولانی‌ترین مدت تیمار همراه با کم‌ترین غلظت کلشی‌سین در القای پلی‌پلوئیدی مؤثر است. بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز نشان دادند که تیمار با کلشی‌سین یک روش کارآمدتری جهت مضاعف‌سازی کروموزوم در گیاهان است اما واکنش به کلشی‌سین بسته به گونه‌های گیاهی متفاوت است (Sarathum et al., 2010; Blasco et al., 2015; Zhang et al., 2008).

Sebasthiampillai (۱۹۷۶) از طریق تیمار جوانه‌های انتهایی با محلول آبی ۰/۲ و ۰/۵ درصد کلشی‌سین و مدت زمان ۵-۶ روز متوالی موفق به تولید ۱۳/۵ درصدی گیاهان تتراپلوئید چای گردید. Goswami و Sharma (۱۹۷۹) با استفاده از غلظت‌های ۱ و ۲ درصد کلشی‌سین به مدت ۷-۵ روز به روش غوطه‌ور نمودن جوانه‌های انتهایی در محلول کلشی‌سین به موفقیت ۱۷-۶ درصدی دست یافتند. غلظت مؤثر برای القای پلی‌پلوئیدی در گیاهان مختلف متفاوت است. از آنجایی که منطقه مرکزی مریستم مسئول تولید سلول‌های انتهایی ساقه است، دو برابر کردن کروموزوم‌های این ناحیه، باعث ایجاد بافت پلی‌پلوئید انتهایی در منطقه تیمار شده می‌گردد. از این رو به نظر می‌رسد گیاهان پلی‌پلوئید خالص در نتیجه دو برابر شدن موفق و مناسب سلول‌های تیمار شده در تمام لایه‌های بافتی منطقه مرکزی در ناحیه مریستمی بوجود می‌آیند که در نهایت گیاهانی با سلول‌های تتراپلوئید تولید می‌شود (Jones et al., 2008). تحقیقات نشان می‌دهد که در

و ۳۰ دقیقه در دمای اتاق باقی ماند. عصاره‌ها در ۵۱۷ نانومتر در مقابل شاهد متانول خوانده شدند. درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از رابطه ۵ به دست آمد (Priptideevch and Machan, 2011).

رابطه ۵

$$\text{ADPPH 0} = 100 \times (\text{ADPPH 0} - \text{A}_{\text{sample}}) / \text{ADPPH 0}$$

ADPPH 0: میزان جذب محلول DPPH؛ A_{sample}: میزان جذب


نمونه در طول موج ۵۱۷ نانومتر

اندازه‌گیری میزان کافئین: برای اندازه‌گیری درصد کافئین، یک گرم برگ سبز خشک در دکانتور با ۵ میلی‌لیتر آمونیاک مخلوط شد. استخراج با ۱۰۰ میلی‌لیتر حلال کلروفرم در چهار مرتبه انجام شد. با استفاده از ۱۰ میلی‌لیتر محلول پتاس در دکانتور ناخالصی‌ها از عصاره جدا گردید. سپس عصاره حاصل با عبور از یک گرم سولفات سدیم خشک صاف شد. پس از تهیه رقت از عصاره حاصل، میزان جذب محلول در طول موج ۲۷۶ نانومتر با اسپکتروفتومتر تعیین گردید. درصد کافئین نمونه از طریق مقایسه با منحنی استاندارد کافئین محاسبه شد (Lakin, 1989).


نتایج با استفاده از نرم افزار SAS 9.4 (SAS-Institute-Inc, 2014) تجزیه و میانگین‌ها با آزمون توکی در سطح احتمال ۵ درصد مقایسه شدند، مقایسه صفات مختلف بین گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید با استفاده از آزمون آماری t انجام گرفت.

نتایج و بحث

ارزیابی تغییرات پلوئیدی به روش سیتوژنتیکی: نتایج حاصل از بررسی سطح پلوئیدی گیاه تیمار شده با سطوح مختلف کلشی‌سین در دو زمان مختلف با استفاده از شمارش کروموزومی بررسی شد. پس از مطالعه و عکس‌برداری از اسلاید نمونه شاهد، عدد کروموزومی در رقم کاشف چای $2n=2x=30$ به دست آمد (شکل ۲) که مشابه با نتایج سایر محققین (غلامی و همکاران، ۱۳۸۵؛ عاشوری و همکاران، ۱۳۹۷) است. تعداد کروموزوم‌های سلول‌های سوماتیکی در



شکل ۲- تعداد کروموزوم در نمونه‌های دیپلوئید ($2n=2x=30$) و تتراپلوئید ($2n=4x=60$) رقم کاشف چای



شکل ۳- اثر متقابل غلظت و مدت زمان تیمار کلشی سین بر درصد تتراپلوئیدی در رقم کاشف چای

جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس القا تتراپلوئیدی پس از تیمار با کلشی سین در رقم کاشف چای

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات
غلظت	۳	۱۱۸/۹۵**
مدت زمان	۱	۱۶/۵۷**
غلظت × مدت زمان	۳	۱۵/۷۰**
اشتباه آزمایشی	۱۶	۰/۲۸
ضریب تغییرات (%)		۱۱/۷۰

^{ns} و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۱٪.

تأثیر تتراپلوئیدی بر خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی: نتایج بررسی‌های خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی گیاهان شاهد و تحت تیمار غلظت کلشی سین نشان

بسیاری از گیاهان، تیمار مریستم انتهایی به طور مؤثری در به وجود آمدن گیاه تتراپلوئید مؤثر است (Malekzade et al., 2010).

(2010).

جدول ۲- مقایسه میانگین برخی از ویژگی‌های مورفولوژیکی و آناتومیکی در گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید رقم کاشف چای

ویژگی‌های بررسی شده	میانگین گیاهان تتراپلوئید	میانگین گیاهان دیپلوئید
طول برگ (mm)	۱۴۵/۴ ^a	۱۱۱/۳ ^b
عرض برگ (mm)	۵۷/۵۶ ^a	۴۵/۱۴ ^b
تراکم روزنه (mm ²)	۸۱/۲۳ ^b	۱۲۹/۹۴ ^a
طول روزنه (μm)	۵۸/۳۰ ^a	۴۷/۷۰ ^b
عرض روزنه (μm)	۴۸/۲۱ ^a	۳۹/۱۴ ^b


میانگین‌هایی که در هر ردیف حروف غیرمشابه دارند از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار هستند (آزمون t).

ترجمه را تحت تأثیر قرار داده و با افزایش یا کاهش بیان و یا حتی خاموش شدن ژن‌ها، بسیاری از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه را تغییر می‌دهد (Adams and Wendel, 2005).

خصوصیات روزنه: در مقایسه تراکم روزنه در یک میلی-متر مربع از نقاط مختلف موجود در سطح پشت برگ در ۱۰ نمونه از گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید در مرحله توسعه کامل برگ‌ها، نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ در تعداد روزنه در واحد سطح برگ بین گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید وجود دارد (جدول ۲ و شکل ۴). نمونه‌های تتراپلوئید دارای تراکم روزنه‌ای کمتری (۸۱/۲۳) در هر میلی‌متر مربع) بودند در حالی که نمونه‌های دیپلوئید تراکم روزنه بیشتری (۱۲۹/۹۴) در هر میلی‌متر مربع داشتند (جدول ۲). افزایش سطح پلوئیدی هسته اغلب موجب تغییرات ساختاری نظیر تراکم روزنه، افزایش اندازه سلول‌های روزنه و تعداد کلروپلاست در سلول‌های نگهبان می‌گردد (Hassanzadeh et al., 2020). تراکم روزنه تحت تأثیر عوامل خارجی مانند دما و محتوای آب بافت‌ها قرار نمی‌گیرد و شمارش روزنه روشی مناسب، آسان و قابل اعتماد است که می‌تواند برای تعیین سطح پلوئیدی استفاده شود (Silva et al., 2000). تراکم روزنه همبستگی منفی شدیدی با افزایش سطح پلوئیدی دارد و این همبستگی منفی می‌تواند به‌عنوان ابزار متمایزکننده‌ای در گیاهان با سطوح پلوئیدی متفاوت مورد استفاده قرار گیرد (ایزدی جلودار و همکاران، ۱۴۰۰). کاهش تراکم روزنه ممکن است

داد که از نظر برخی خصوصیات دارایی تفاوت‌هایی به شرح زیر هستند:

طول و عرض برگ: بررسی شکل برگ در رقم کاشف چای نشان داد که برگ‌های گیاهان تتراپلوئید از نظر اندازه (جدول ۲) دارای طول و عرض بیشتری نسبت به گیاهان دیپلوئید بودند که با نتایج ارائه‌شده توسط Shafaroodi Malekzadeh و همکاران (۲۰۱۱)، در ریحان، Afshar Mohammadian و همکاران (۲۰۱۳) در لیموترش و Chen (۲۰۱۶) در گیاه دارویی درخت چای مشابهت دارد. افزایش چشمگیر در اندازه برگ با افزایش غلظت و مدت زمان تیمار کلشی‌سین، و در نتیجه افزایش پلی‌پلوئیدی احتمالاً در نتیجه سازگاری بیشتر گیاهان پلی‌پلوئید با محیط است که با نتایج Escandon و همکاران (۲۰۰۷) روی گیاه دارویی بنگدانه که انگیزش پلوئیدی منجر به برگ‌های بزرگتر شد هماهنگی دارد. علاوه بر این برگ‌های گیاهان تتراپلوئید چین خورده و نا صاف بودند و از لحاظ ضخامت، ضخیم‌تر از گیاهان دیپلوئید بودند (شکل ۴). در گیاه بادرشبو (Omidbaigi et al., 2010) گزارش شده انگیزش تتراپلوئیدی علاوه بر تعداد برگ در بسیاری از موارد بر رنگ، شکل، ضخامت و افزایش عرض و اندازه دندانه‌های برگ تأثیر می‌گذارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که افزایش سطح پلوئیدی هسته اغلب باعث تغییرات آناتومی و ساختاری در گیاهان می‌گردد و هر یک با توجه به نوع گونه با یک فنوتیپ بروز می‌کند. در کل القای پلی‌پلوئیدی ضمن افزایش میزان DNA الگو، با تحریک مکانیسم‌هایی در سلول، نسخه‌برداری و



شکل ۴- مقایسه اندازه و تراکم روزنه‌ها و تغییرات مورفولوژیکی بعد از اعمال تیمار کلشی سین در رقم کاشف چای (2x) دیپلوئید و (4x) تتراپلوئید (بزرگنمایی 40x)

طول و عرض روزنه بزرگ‌تر از همتای دیپلوئید خود بودند و اختلاف بین آنها معنی‌دار بوده است (جدول ۲). دلیل افزایش اندازه روزنه‌ها و کاهش تعداد آنها را می‌توان با افزایش سطح ژنوم و تعداد کروموزوم مرتبط دانست. در تحقیقی که روی گیاه زنیان (*Trachyspermum ammi* L.) انجام شده نتایج

به دلیل افزایش اندازه سلول در گیاهان تتراپلوئید نسبت به گیاهان دیپلوئید باشد (Hassanzadeh *et al.*, 2020). کاهش تراکم روزنه در گیاهان تتراپلوئید سورگوم دو رنگ (*Sorghum bicolor*) و جعفری گزارش شده است (Ardabili *et al.*, 2015; Nasirvand *et al.*, 2018). گیاهان تتراپلوئید از لحاظ

شده بر روی *Lablab purpureus* نشان داد که میزان کلروفیل در گیاهان تتراپلوئید نسبت به گیاهان دیپلوئید افزایش می‌یابد (Dheer *et al.*, 2014). افزایش کلروفیل ناشی از افزایش تعداد کلروپلاست در سلول‌های نگهبان است (Bagheri and Mansouri, 2015).

محتوای پلی‌فنل، کافئین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی: در رقم کاشف چای افزایش سطح پلوئیدی تأثیر معنی‌داری را در میزان پلی‌فنل، کافئین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی شاخساره‌های تتراپلوئید نسبت به دیپلوئید داشت. بر این اساس، بیشترین میزان پلی‌فنل در شاخساره‌های تتراپلوئید با میزان ۱۶/۷۹ درصد نسبت به ۱۴/۶۱ درصد در گیاهان دیپلوئید بوده است (جدول ۳). سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل به روش DPPH در نمونه‌های حاصل نشان داد که شاخساره‌های تتراپلوئید دارای بالاترین فعالیت با میزان ۹۷/۲۴ درصد در مقایسه با هم‌تای دیپلوئید خود با میزان ۹۵/۱۸ درصد بوده است (جدول ۳). محتوی کافئین در شاخساره‌های تتراپلوئید ۳/۳۶ درصد نسبت به ۲/۶۸ درصد در شاخساره‌های دیپلوئید بود (جدول ۳). به دلیل افزایش تعداد کروموزم‌ها و ژن‌های وابسته و در نتیجه میزان بیان ژن‌ها، طی افزایش سطح پلوئیدی، در بسیاری موارد غلظت متابولیت‌های ثانویه و مواد فیتوشیمیایی دفاعی در گیاه افزایش می‌یابد (Ayyobi *et al.*, 2017). زمانی که مانند اکثر گیاهان دارویی، اندام‌های رویشی گیاه منبع متابولیت‌های ثانویه باشند، دست‌ورزی سطح پلوئیدی مانند مضاعف‌سازی مستقیم کروموزومی اتوپلی‌پلوئیدی یا آلوپلی‌پلوئیدی روشی سریع در بهبود و تولید ترکیب‌های ارزشمند دارویی است (Das and Lavania, 1998; Ayyobi *et al.*, 2017). به منظور بررسی کیفیت ارقام تریپلوئید چای، میزان کافئین و کاتچین ۹۷ نتاج در حال تفرق، والدین تتراپلوئید و دیپلوئید را مورد بررسی قرار دادند. سطح کافئین و کاتچین نتاج تریپلوئید با والدین دیپلوئیدشان مقایسه شدند. بعضی از نتاج نسبت به والدین دیپلوئیدشان، کلون‌های با کیفیت بهتری بودند. اکثر نتاج حاصل از تلاقی گونه دیپلوئید *C. sinensis* و گونه تتراپلوئید، هتروزیس بالایی را از لحاظ کافئین و کاتچین

حاکی از آن است که افزایش طول و عرض روزنه در گیاهان تتراپلوئید ناشی از افزایش سطح برگ بوده است (Sadat Noori *et al.*, 2017). نتایج این تحقیق با یافته‌های به‌دست آمده در ریحان (Omidbaigi *et al.*, 2010a)، آرابیدوپسیس (Miller *et al.*, 2012)، پونه کوهی (Ghani *et al.*, 2014)، مارچوبه (Shiga, 2009)، گل جعفری (Sajjad *et al.*, 2013) و بابونه کبیر (سحرخیز، ۱۳۸۵) که نشان دادند گیاهان تتراپلوئید دارای تعداد روزنه کمتر و اندازه روزنه بزرگتری نسبت به گیاهان دیپلوئید هستند، مطابقت دارد. مزیت تغییر اندازه اندام‌های گیاهی در اثر القای پلی‌پلوئیدی، سازگاری بیشتر گیاهان با محیط است؛ در واقع پلی‌پلوئیدها ممکن است قدرت زنده‌مانی بیشتری نسبت به اجداد دیپلوئید خود در برابر عوامل نامساعد محیطی داشته باشند، زیرا با افزایش اندازه سلول روزنه، توانایی گیاه در حفظ آب و ایجاد تعادل آبی بیشتر است.

تأثیر تتراپلوئیدی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی، محتوای کلروفیل: نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد (جدول ۳) که میزان کلروفیل a و b در برگ نمونه‌های تتراپلوئید (به ترتیب ۲/۴۳ و ۰/۲۷۸۰ میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) نسبت به نمونه‌های دیپلوئید (به ترتیب ۱/۰۶ و ۰/۱۷۰ میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) بیشتر و همچنین میزان کاروتنوئید در برگ نمونه‌های تتراپلوئید (۰/۸۳۱۸ میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) نسبت به نمونه‌های دیپلوئید (۰/۳۵۷۵ میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) بیشتر بود. از آنجا که فرض بر آن است که با دوبرابر شدن ژنوم فعالیت متابولیکی سنتز rRNA و نسخه‌برداری افزایش می‌یابد، این افزایش می‌تواند بر میزان تنفس، فعالیت ژنی، تنوع و میزان فعالیت آنزیم‌ها و انتقال الکترون در فتوسنتز تأثیر داشته باشد (Ravandi *et al.*, 2014; Nagymihaly *et al.*, 2017). در تحقیقی گیاهان تتراپلوئید و دیپلوئید آکاسیا از نظر میزان کلروفیل با یکدیگر مقایسه شدند، مشاهده شد که میزان کلروفیل در گیاهان تتراپلوئید آکاسیا به‌طور معنی‌داری بیشتر از گیاهان دیپلوئید است (Mathura *et al.*, 2006). مطالعه انجام

جدول ۳- مقایسه میانگین برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی در گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید رقم کاشف چای

ویژگی‌های بررسی شده	میانگین گیاهان تتراپلوئید	میانگین گیاهان دیپلوئید
کلروفیل a (mg/g FW)	۲/۴۳ ^a	۱/۰۶ ^b
کلروفیل b (mg/g FW)	۰/۲۷۸۰ ^a	۰/۱۷۰ ^b
کاروتنوئید (mg/g FW)	۰/۸۳۱۸ ^a	۰/۳۲۷۵ ^b
پلی فنل (درصد)	۱۶/۷۹ ^a	۱۴/۶۱ ^b
فعالیت آنتی‌اکسیدانی (درصد)	۹۷/۲۴ ^a	۹۵/۱۸ ^b
کافئین (درصد)	۳/۳۶ ^a	۲/۶۷ ^b

میانگین‌هایی که در هر ردیف حروف غیرمشابه دارند از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار هستند (آزمون t).

نتیجه‌گیری

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت ۰/۵ درصد کلشی‌سین به مدت شش روز متوالی بهترین تیمار جهت القای پلی‌پلوئیدی در رقم کاشف چای است. همچنین بررسی‌های بیشتر و مقایسه بین خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید نشان داد که گیاهان تتراپلوئید از نظر صفات اندازه برگ، اندازه روزنه، میزان کلروفیل a، b، کاروتنوئید، پلی‌فنل، کافئین و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نسبت به گیاهان دیپلوئید برتری داشتند، لذا روش اصلاحی مبتنی بر پلی‌پلوئیدی رقم کاشف چای مفید و قابل توصیه است. ضمن اینکه پلی‌پلوئیدی با تغییرات ساختاری، نمودی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گسترده‌ای در گیاهان همراه است که نتیجه آن ایجاد تنوع گسترده برای انتخاب به‌ویژه برای سازگاری بیشتر به تنش‌های محیطی است که می‌تواند کاربردهای بالقوه برای اصلاح گیاهان دارویی به خصوص آن دسته از گیاهانی که از اندام رویشی آنها به‌طور تجاری استفاده می‌شود، داشته باشد.

نشان دادند. در تحقیقی که بر روی گیاه خشخاش (*Papaver somniferum*) انجام شده القای پلی‌پلوئیدی باعث ایجاد تغییرات معنی‌دار در افزایش ترکیب‌های فیتوشیمیایی مانند فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی‌اکسیدان کل در گیاهان پلی‌پلوئید نسبت به دیپلوئید گردید (Madani et al., 2019). به‌طور کلی اتوپلی‌پلوئیدی در بسیاری از گیاهان دارویی از قبیل پیچ امین‌الدوله (*Lonicera japonica*) (Kong et al., 2017) و اطلسی (Griesbach and Kam, 1995) سبب افزایش فنل کل، فلاونوئید و آنتی‌اکسیدان کل شد. در گیاه دارویی *Camellia sasanqua* افزایش سطح پلوئیدی، افزایش در غلظت کاتچین‌ها، اگزتراکین‌ها و کافئین‌ها را در پی داشته است (Jesus-Gonzalez and Weathers, 2003). افزایش تعداد کروموزوم‌ها و مقدار ژن‌های وابسته می‌تواند در بعضی موارد بیان و غلظت متابولیت‌های ثانویه و مواد شیمیایی دفاعی را افزایش دهد، با این حال این مورد در همه گیاهان صادق نیست و ممکن است در بعضی موارد ارتباط مشخصی بین مقدار، تعداد کپی ژن، خاموش شدن ژن و بیان متابولیت‌های ثانویه وجود نداشته و مکانیسم مولکولی دقیق که مشخص کند القای پلی‌پلوئیدی دقیقاً در کدام بخش متابولیت‌های ثانویه اثر می‌گذارد مبهم است (Buggs et al., 2009).

منابع

اکبری، ر.، فهمیده، ل. و فاضلی‌نسب، ب. (۱۳۹۸) بررسی امکان تولید پلی‌پلوئیدی و اثر آن بر محتوای فنلی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی زنیان جمعیت پاکستان. فرآیند و کارکرد گیاهی ۳۲: ۳۲۳-۳۱۱.

- ایزدی جلودار، ن.، چمنی، ا.، شکوهیان، ع. ا. و اصغری زکریا، ر. (۱۴۰۰) القا پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق ویژگی‌های سیتولوژیکی در گل سوسن (*Lilium dandie*). مجله پژوهش‌های تولید گیاهی ۲۸: ۳۳-۴۴.
- بی‌نام. (۱۳۹۹) اطلاعات تولید و تجارت چای در سال ۱۳۹۹. در دسترس <https://www.irantea.org>
- سحرخیز، م. ج. (۱۳۸۵) تأثیر برخی از عوامل اقلیمی و سطح پلوئیدی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیتنی بابونه کبیر (*Tanacetum partenium* L.). پایان نامه دکتری تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
- عاشوری، ذ. (۱۳۸۷) مطالعه سیوژنتیکی کلون‌های انتخابی چای (*Camellia sinensis*) در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
- عاشوری، ذ.، صفایی چایی کار، ص. و فلکرو، ک. (۱۳۹۷) بررسی سیوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای (*Camellia sinensis*) در ایران. مجله به‌نژادی نهال و بذر ۳: ۲۴۳-۲۴۵.
- غلامی، م.، فلکرو، ک. و گمار، م. (۱۳۸۵) بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های چای به کمک مطالعه سیوژنتیک. نهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.
- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (۱۳۸۵) چای سبز و سیاه - اندازه‌گیری مواد اختصاصی آن قسمت اول: تعیین مقدار کل پلی‌فنل‌ها - روش رنگ‌سنجی با استفاده از معرف. شماره ۸۹۸۶-۱.
- Adams, K. L. and Wendel, J. F. (2005) Novel patterns of gene expression in polyploid plants. *TRENDS in Genetics* 21: 539-543.
- Afshar Mohammadian, M., Omid, Z., Poorakbari, R. and Asadi Abkenar, A. (2013) Investigation of effect of polyploidy on some anatomical characteristics and antioxidant components of *Citrus aurantifolia*. *Journal of Plant Researches* 26: 238-246.
- Ahmed, N. and Singh, I. D. (1993) A technique for rapid identification of ploidy level in tea. *Two and a Bud* 40: 31-33.
- Alam, H. and Razaq, M. (2015) Induced polyploidy as a tool for increasing tea (*Camellia sinensis* L.) production. *Journal of Northeast Agricultural University* 22: 43-47.
- Ardabili, G. S., Zakaria, R. A. and Zare, N. (2015) In vitro induction of polyploidy in *Sorghum bicolor* L. *Cytologia* 80: 495-503.
- Arnon, D. I. (1949) Copper enzymes in isolated chloroplast polyphenol oxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology* 24: 1-15.
- Ayyobi, N., Hosseini, B. and Fattahi, M. (2017) Induction effects of colchicine and chitosan on rosmarinic acid production in hairy root cultures of Zarrin-Giah (*Dracocephalum kotschy* Boiss.). *Journal of Molecular and Cellular Research (Iranian Journal of Biology)* 30: 1-30.
- Bagheri, M. and Mansouri, H. (2015) Effect of induced polyploidy on some biochemical parameters in *Cannabis sativa* L. *Applied Biochemistry and Biotechnology* 175: 2366-2375.
- Banerjee, B. (1992) Selection and breeding of tea. In: *Tea Cultivation to Consumption*. (eds. Willson, K. G. and Clifford, M. N.) Pp. 53-86. Chapman and Hall, London.
- Banon, S., Diaz, P., Rodriguez, M., Garrido, M. D. and Price, A. (2007) Ascorbate, green tea and grape seed extracts increase the shelf life of low sulphite beef patties. *Meat science* 77: 626-633.
- Blasco, M., Badenes, M. L. and Naval, M. (2015) Colchicine-induced polyploidy in loquat (*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)* 120: 453-461.
- Buggs, R. J. A., Doust, A. N., Tate, J. A., Koh, J., Soltis, K., Feltus, F. A. and Soltis, D. E. (2009) Gene loss and silencing in *Tragopogon miscellus* (Asteraceae): Comparison of natural and synthetic allotetraploids. *Heredity* 103: 73-81.
- Corneille, S., De Storme, N., Van Acker, R., Fangel, J. U., De Bruyne, M., De Rycke, R., ... and Boerjan, W. (2019) Polyploidy affects plant growth and alters cell wall composition. *Plant Physiology* 179: 74-87.
- Caruso, I., Lepore, L., De Tommasi, N., Dal Piaz, F., Frusciante, L., Aversano, R. and Carputo, D. (2011) Secondary metabolite profile in induced tetraploids of wild *Solanum commersonii* Dun. *Chemistry and biodiversity* 8: 2226-2237.
- Chaturvedula, V. S. P. and Prakash, I. (2011) The aroma, taste, color and bioactive constituents of tea. *Journal of Medicinal Plants Research* 5: 2110-2124.
- Chaudhuari, T. C. (1992) Chromosomal complexes in tea (aneuploids and polyploids). In: *Proceedings of the National Symposium on Tea Culture, Processing and Marketing*. Hlrf-Upasi, Coonor, India.

- Chen, B., Li, J., Zhang, J., Fan, H., Wu, L. and Li, Q. (2016) Improvement of the tissue culture technique for *Melaleuca alternifolia*. Journal of Forestry Research 27: 1265-1269.
- Chen, L. L. and Gao, Sh. L. (2007) In vitro tetraploid induction and generation of tetraploids from mixoploids in *Astragalus memberanaceus*. Scientia Horticulture 112: 339-344.
- Das, S. K., Sabhapondit, S., Ahmed, G. and Das, S. (2013) Biochemical evaluation of triploid progenies of diploid× tetraploid breeding populations of *Camellia* for genotypes rich in catechin and caffeine. Biochemical Genetics 51: 358-376.
- Dhawan, O. P. and Lavania, U. C. (1996) Enhancing the productivity of secondary metabolites via induced polyploidy: A review. Euphytica 87: 81-89.
- Dheer, M., Sharma, R. A., Gupta, V. P. and Punia, S. S. (2014) Cytomorphological investigations in colchicine-induced polyploids of *Lablab purpureus* (L.) Sweet. Indian Journal of Biotechnology 13: 347-355.
- Escandon, A. S., Alderete, L. M. and Hagiwara, J. C. (2007) In vitro polyploidization of *Mecardonia tenella*, a native plant from South America. Scientia Horticulturae 115: 56-61.
- Fasano, C., Diretto, G., Aversano, R., D'Agostino, N., Di Matteo, A., Frusciant, L. and Carputo, D. (2016) Transcriptome and metabolome of synthetic Solanum autotetraploids reveal key genomic stress events following polyploidization. New Phytologist 210: 1382-1394.
- Ghani, A., Neamati, S. H., Azizi, M., Saharkhiz, M. J. and Farsi, M. (2014) Artificial autotetraploidy induction possibility of two Iranian endemic mint (*Mentha mozaffarianii*) ecotypes. Notulae Scientia Biologicae 6: 185-191.
- Ghotbi Ravandi, E., Rezanejad, F., Zolala, J. and Dehghan, E. (2013) The effects of chromosome-doubling on selected morphological and phytochemical characteristics of *Cichorium intybus* L. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 88: 701-709.
- Goswami, L. C. and Sharma, P. C. (1979) Colchicine-induced autotetraploids of tea (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze). Current Science.
- Griesbach, R. J. and Kamo, K. K. (1996) The effect of induced polyploidy on the flavonols of Petunia 'Mitchell'. Phytochemistry 42: 361-363.
- Gunasekera, M. T. K. and Ranatunga, M. A. B. (2003) Polyploidy in tea (*camellia sinensis* L.) and its application in tea breeding: A review. Tea Science 68: 14-26.
- Hara, Y. (2001) Green Tea: Health Benefits and Applications. CRC Press, New York.
- Hassanzadeh, F., Zakaria, R. A. and Azad, N. H. (2020) Polyploidy induction in *Salvia officinalis* L. and its effects on some morphological and physiological characteristics. Cytologia 85: 157-162.
- Heo, J. Y., Jeong, S. H., Choi, H. R. and Park, S. M. (2016) Polyploid production in *Lilium leichtlinii* var. Maximowiczii using colchicine. JAPS: Journal of Animal and Plant Sciences 26.
- Jayasuriya, P. and Govindarajulu, V. (1975) Chromosome Numbers in Some Tea Clones. Planters' Chronicle.
- Jesus-Gonzalez, D. and Weathers, P. J. (2003) Tetraploid *Artemisia annua* hairy roots produce more artemisinin than diploids. Plant Cell Reports 21: 809-813.
- Jones, J. R., Ranney, T. G. and Eaker, T. A. (2008) A Novel Method for Inducing Polyploidy in *Rhododendron* Seedlings. North Carolina State University, Fletcher, North Carolina.
- Kaensaksiri, T., Soontornchainaksaeng, P., Soonthornchareonnon, N. and Prathanurug, S. (2011) In vitro induction of polyploidy in *Centella asiatica* (L.) Urban. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 107: 187-194.
- Kong, D., Li, Y., Bai, M., Deng, Y., Liang, G. and Wu, H. (2017) A comparative study of the dynamic accumulation of polyphenol components and the changes in their antioxidant activities in diploid and tetraploid *Lonicera japonica*. Plant Physiology and Biochemistry 112: 87-96.
- Labbe, D. and Bazinet, L. (2006) Effect of membrane type on cation migration during green tea electromigration and equivalent mass transported calculation. Journal of Membrane Science 275: 220-228.
- Lakin, A. (1989) Food Analysis. Practical Handout. Reading University, UK.
- Lavania, U. C. (1998) Enhanced productivity of the essential oil in the artificial autotetraploid of Vetiver (*Vetiveria zizanioides* L. Nash). Euphytica 38: 271-276.
- Lv, Z., Zhang, C., Shao, C., Liu, B., Liu, E., Yuan, D. and Shen, C. (2021) Research progress on the response of tea catechins to drought stress. Journal of the Science of Food and Agriculture 101: 5305-5313.
- Madani, H., Escrich, A., Hosseini, B., Sanchez-Munoz, R., Khojasteh, A. and Palazon, J. (2021) Effect of polyploidy induction on natural metabolite production in medicinal plants. Biomolecules 11: 899.
- Madani, H., Hosseini, B., Dehghan, E. and Rezaei-chiyaneh, E. (2015) Enhanced production of scopolamine in induced autotetraploid plants of *Hyoscyamus reticulatus* L. Acta Physiologiae Plantarum 37: 1-11.
- Madani, S. H., Hosseini, B., Karimzadeh, Gh. and Rahimi, A. (2019) Effects of polyploidy induction on antioxidant capacity and some phytochemical and morphological characteristics of Iranian poppy (*Papaver bracteatum* Lindl.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 35: 170-181.
- Malekzade Shafarodi, S., Ghani, A. and Habibi, M. (2010) The study of induction of polyploidy in basil (*Ocimum basilicum*) plant. Journal of Horticulture 25: 469-461.

- Malekzadeh Shafaroodi, S., Gani, A., Habibi, M. and Amiri, A. (2011) The possibility polyploidy induction in basil (*Ocimum basilicum* L.) using colchicine. *Journal of Horticultural Science* 25: 461-469.
- Mathura, S., Fossey, A. and Beck, S. L. (2006) Comparative study of chlorophyll content in diploid and tetraploid black wattle (*Acacia mearsii*). *Forestry* 79: 381-388.
- Miller, M., Zhang, C. and Chen, Z. J. (2012) Ploidy and hybridity effects on growth vigor and gene expression in *Arabidopsis thaliana* hybrids and their parents. *G3: Genes| Genomes| Genetics* 2: 505-513.
- Nagymihaly, M., Veluchamy, A., Gyorgypal, Z., Ariel, F., Jegu, T., Benhamed, M. and Kondorosi, E. (2017) Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114: 4543-4548.
- Nasirvand, S., Zakaria, R. A., Zare, N. and Esmaeilpoor, B. (2018) Polyploidy induction in parsley (*Petroselinum crispum* L.) by colchicine treatment. *Cytologia* 83: 393-396.
- Ng'etich, W. K. and Wachira, F. N. (1992) Use of a non-destructive method of leaf area estimation in triploid and diploid tea plants (*Camellia sinensis*). *Tea* 13: 11-17.
- Niazian, M. and Nalousi, A. M. (2020) Artificial polyploidy induction for improvement of ornamental and medicinal plants. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)* 142: 447-469.
- Omidbaigi, R., Mirzaee, M., Hassani, M. E. and Sedghi Moghadam, M. (2010a) Induction and identification of polyploidy in basil (*Ocimum basilicum* L.) medicinal plant by colchicine treatment. *International Journal of Plant Production* 4: 87-98.
- Omidbaigi, R., Yavari, S., Hassani, M. E. and Yavari, S. (2010) Induction of autotetraploidy in dragonhead (*Dracocephalum moldavica* L.) by colchicine treatment. *Journal of Fruit and Ornamental Plant Research* 18: 23-35.
- Ovrebø, J. I. and Edgar, B. A. (2018) Polyploidy in tissue homeostasis and regeneration. *Development* 145: dev156034.
- Pradhan, S. K., Gupta, R. C. and Goel, R. K. (2018) Differential content of secondary metabolites in diploid and tetraploid cytotypes of *Siegesbeckia orientalis* L. *Natural Product Research* 32: 2476-2482.
- Price, A. H. and Hendry, G. A. F. (1991) Iron-catalysed oxygen radical formation and its possible contribution to drought damage in nine native grasses and three cereals. *Plant, Cell and Environment* 14: 477-484.
- Pripdeevech, P. and Machan, T. (2011) Fingerprint of volatile flavor constituents and antioxidant activities of teas from Thailand. *Food Chemistry* 125: 797-802.
- Ravandi, E. G., Dehghan, E., Estaji, A. R. and Badi, H. N. (2014) Increasing the production of valuable phytopharmaceutical compounds by chromosome manipulation: Perspectives and techniques of induction and selection of polyploid plants. *Journal of Medicinal Plants* 13: 11-26.
- Sadat Noori, S. A., Norouzi, M., Karimzadeh, G., Shirkoob, K. and Niazian, M. (2017) Effect of colchicine-induced polyploidy on morphological characteristics and essential oil composition of ajowan (*Trachyspermum ammi* L.). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 130: 543-551.
- Sajjad, Y. A. S. A. R., Jaskani, M. J., Mehmood, A., Ahmad, I. and Abbas, H. A. I. D. E. R. (2013) Effect of colchicine on in vitro polyploidy induction in African marigold (*Tagetes erecta*). *Pakistan Journal of Botany* 45: 1255-1258.
- Salma, U., Kundu, S. and Mandal, N. (2017) Artificial polyploidy in medicinal plants: Advancement in the last two decades and impending prospects. *Journal of Crop Science and Biotechnology* 20: 9-19.
- Sarathum, S., Hegele, M., Tantivivat, S. and Nanakorn, M. (2010) Effect of concentration and duration of colchicine treatment on polyploidy induction in *Dendrobium scabrilingue* L. *European Journal of Horticultural Science* 75: 123-127.
- SAS-Institute-Inc. (2014) *Base SAS 9.4 Procedures Guide: Statistical Procedures*. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
- Sebasthiampillai, A. R. (1976) A simple technique for the induction of polyploids in tea. *Tea Quarterly* 46: 12-15.
- Sharma, V. S. and Ranganathan, V. (1986) Present status and future needs of tea research. *Plantation Crops* 2: 37-50.
- Shiga, I., Uno, Y., Kanechi, M. and Inagaki, N. (2009) Identification of polyploidy of in vitro anther-derived shoots of *Asparagus officinalis* L. by flow cytometric analysis and measurement of stomatal length. *Journal of the Japanese Society for Horticultural Science* 78: 103-108.
- Shiyan, C. and Depeng, Y. (1989) Relation between the chloroplast number in each guard cell and the ploidy of tea. *Journal of Tea Science (China)*.
- Silva, P. A. K. X. D. M., Callegari-Jacques, S. and Bodanese-Zanettini, M. H. (2000) Induction and identification of polyploids in *Cattleya intermedia* Lindl. (Orchidaceae) by in vitro techniques. *Ciencia Rural* 30: 105-111.
- Simura, T. and Osone, K. I. (1956) Studies on the fertilization of tea plant. *Japanese Journal of Breeding* 6: 111-114.
- Sinija, V. R. and Mishra, H. N. (2009) FT-NIR spectroscopy for caffeine estimation in instant green tea powder and granules. *LWT- Food Science and Technology* 42: 998-1002.
- Smith, S., Weyers, J. D. B. and Berry, W. G. (1989) Variation in stomatal characteristics over the lower surface of *Commelina communis* leaves. *Plant, Cell and Environment* 12: 653-659.
- Tan, F. Q., Tu, H., Wang, R., Wu, X. M., Xie, K. D., Chen, J. J. and Guo, W. W. (2017) Metabolic adaptation following genome doubling in citrus doubled diploids revealed by non-targeted metabolomics. *Metabolomics* 13: 1-12.

- Wachira, F. N. (1994) Triploidy in tea (*Camellia sinensis*): Effect on yield and yield attributes. *Journal of Horticultural Science* 69: 53-60.
- Widoretno, W. (2016) In vitro induction and characterization of tetraploid Patchouli (*Pogostemon cablin* Benth.) plant. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 125: 261-267.
- Zhang, Z., Dai, H., Xiao, M. and Liu, X. (2008) In vitro induction of tetraploids in *Phlox subulata* L. *Euphytica* 159: 59-65.

Effect of colchicine treatment and polyploidy induction on some morphological, physiological and phytochemical characteristics of *Camellia sinensis* cv. Kashef

Sanam Safaei Chaeikar* and Korosh Falakro

Tea Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran

(Received: 12/06/2022, Accepted: 13/09/2022)

Abstract

Tea (*Camellia sinensis* L. O. Kuntze) belongs to the Theaceae family and as one of the most important economic plants in the world, it has many medicinal properties and is consumed as a fun drink. Induction of polyploidy using mutagenic chemicals is one of the methods of breeding medicinal plants in order to increase the ability to produce secondary metabolites. In order to investigate the effect of colchicine treatment on the induction of polyploidy and to compare the changes of different traits in tetraploid and diploid plants (control) of Kashef cultivar, an experiment was carried out as a factorial in the form of a completely randomized design with two factors contains different concentrations of colchicine (0, 0.2, 0.5 and 1%) and duration times (3 and 6 consecutive days) with three replications. Morphological, microscopic and chromosomal counts were used to determine the ploidy level. The number of chromosomes in diploid and tetraploid plants was recorded as 30 ($2n=2x=30$) and 60 ($2n=4x=60$), respectively. The results showed that the concentration of 0.5 % colchicine in a period of 6 consecutive days with an efficiency of 12.82 % is the most suitable treatment for the production of tetraploid plants. Induction of polyploidy caused significant changes in the leaf size, chlorophyll and carotenoid contents and increased phytochemical compounds such as polyphenol, caffeine and antioxidant activity in tetraploid shoots compared to diploid. Based on the results of this experiment, increasing the ploidy level caused an increase in antioxidant compounds and some phytochemical compounds in tea medical plant.

Keywords: Antioxidant, Caffeine, Polyphenol, Tea, Tetraploid

Corresponding author, Email: safaei.sanam@gmail.com; s.safaie@areeo.ac.ir