

## اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری (*Dianthus caryophyllus L.*)

\*مهناز کریمی\*

گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰)

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن بر عمر گل‌جایی، میزان اتیلن تولیدی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان به اجرا در آمد. گل‌های تیمار شده با آمینو اکسی استیک اسید، بنزیل آدنین و ۱-متیل سیکلو پروپان در دو دمای ۲ و ۴ درجه سانتی گراد انبار گردیدند. بعد از گذشت ده روز انبارداری خشک گل‌ها به داخل آب مقطر منتقل شدند. طبق نتایج بدست آمده متوسط عمر گل‌جایی در دمای ۲ و ۴ درجه سانتی گراد بعد از ده روز انبارداری خشک به ترتیب ۱۵ و ۱۱/۵ روز بود. گل‌های پیش تیمار شده با ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر (۶ ساعت) MCP-1 در هر دو دما بیشترین عمر گل‌جایی را نشان دادند. شرایط دمایی تاثیر معنی‌داری بر کاهش تولید اتیلن در گل‌های بریدنی میخک مینیاتوری داشت. به طوری که میانگین تولید اتیلن در دو دمای ۲ و ۴ درجه سانتی گراد به ترتیب ۲/۳۵ و ۴/۱۱ نانو لیتر بر گرم وزن تر در ساعت بود. کمترین اتیلن تولیدی در گل‌های پیش تیمار شده با ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر (۶ ساعت) MCP-1 مشاهده گردید. حداکثر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی مربوط به دمای ۴ درجه سانتی گراد بود. فعالیت هر سه آنزیم سوپراکسیدیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز روند افزایشی نشان داد و در روز سوم بیشتر از روز اول نمونه‌برداری بود. افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در گل‌های تیمار شده با ۱-متیل سیکلو پروپان مشاهده شد.

کلمات کلیدی: آمینو اکسی استیک اسید، بنزیل آدنین، پراکسید دیسموتاز، کاتالاز، ۱-متیل سیکلو پروپان، عمر گل‌جایی

اتیلن بوده و از فعالیت آنزیم ACC (۱-آمینو سیکلو پروپان ۱-کربوکسیلیک اسید) ستار ممانعت می‌کند (Khan, 2006). AOA برای جلوگیری از تولید اتیلن درون زا مؤثر می‌باشد و پژمردگی گل‌ها را به تأخیر می‌اندازد (Paliyath *et al.*, 2008) Ketsa و Lerslerwong (۲۰۰۸) گزارش کردند، تیمار کوتاه مدت ۵ میلی مولار AOA عمر گل‌جایی ارکیده را افزایش داد. تیمار گل‌های بریدنی آنتوریم با BA (بنزیل آدنین) به غلاظت ۲۰ میلی گرم در لیتر، باعث کاهش حساسیت به سرمآزادگی و

مقدمه:

پیری گل‌ها با تخریب و زوال مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی همراه است. اتیلن نقش مهمی در تنظیم پیری گل‌ها داشته و با پیری گل‌ها میزان تولید آن افزایش می‌یابد (Ketsa and Rugkong, 2000) اتیلن باعث پژمردگی زودتر، از بین رنگ گل‌ها، ریزش گلبرگ‌ها و زرد شدن برگ‌ها می‌شود (Cameron and Reid, 2001) در میان بازدارنده‌های بیوسنتر اتیلن AOA (آمینو اکسی استیک اسید) بازدارنده ستر

**مواد و روش‌ها:**

در این پژوهش گل‌های میخک مینیاتوری رقم‌های Aragon و Erueka جهت مطالعه از گالخانه‌ای تجاری تهیه شدند. گل‌ها در مرحله‌ای که حداقل اولین گل از ۶ تا ۸ غنچه موجود روی ساقه باز بود، برداشت شدند و سریعاً به آزمایشگاه منتقل گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو رقم (Aragon و Aragon)، دو دما (۲۰ و ۴ درجه سانتی‌گراد)، ۱۳ تیمار (تیمار شاهد و غلطات‌های مختلف بتزیل آدنین (BA)، آمینو اکسی استیک اسید (AOA) و ۱-متیل سیکلو پروپان (MCP-1) و با ۴ تکرار به اجرا در آمد.

جهت انجام آزمایش ساقه‌ی گل‌های بریدنی بعد از توزین به مدت ۱۲ ساعت در داخل محلول‌های AOA (در سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر)، BA (در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر) و تیمار شاهد (آب مقطر) قرار گرفتند. تیمار ۱-MCP (۳ سطح ۰/۴۸، ۰/۷۲ و ۰/۹۶ میکرو لیتر در لیتر و مدت زمان ۳ و ۶ ساعت) به صورت گازی اعمال گردید. بعد از انجام پیش‌تیمارهای ذکر شده گل‌های بریدنی در داخل کيسه‌های پلاستیکی بسته بندی شده و در دو دمای ۲ و ۴ درجه سانتی‌گراد در داخل انکوباتور به مدت ده روز نگهداری شدند. بعد از گذشت ده روز گل‌ها در داخل آب مقطر و در آزمایشگاه با دمای  $22\pm2^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد، رطوبت ۷۵٪ و شدت نوری معادل ۱۵ میکرو مول بر متر مکعب بر ثانیه قرار گرفتند. عمر گل‌جایی، تولید اتیلن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت.

**سنجهش فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT، EC 1.11.1.6):**

۲/۰ گرم نمونه منجمد در ۳ میلی‌لیتر بافر سدیم فسفات ۲۵ میلی‌مولار ( $\text{pH}=6/8$ ) عصاره‌گیری گردید. عمل همگن کردن به مدت ۱۵ دقیقه و با دور ۱۵۰۰۰ در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد صورت گرفت. سپس محلول روئی برای سنجهش فعالیت آنزیم کاتالاز استفاده گردید. تجزیه آب اکسیژنه با کاهش در جذب در طول موج ۲۴۰ نانومتر به وسیله‌ی دستگاه اسپکتروفتومتری (مدل UV/ Vis, Jenway 6405) ساخت انگلستان) بررسی شد. فعالیت آنزیمی به صورت نانومول بر دقیقه بر میلی‌گرم پروتئین بیان شد. برای سنجهش پروتئین از

افزايش عمر گل‌جایی گردید. ۱-متیل سیکلو پروپان) و دیگر سیکلو پروپان‌ها از اثر اتیلن بروزنزاد در گل‌ها از جمله افتادن گل و جوانه، ریزش برگ و پیری گل ممانعت می‌کنند، لذا برای کنترل پیری در گل‌ها کاربرد دارند (Serek *et al.*, 1996).

در مطالعه Darras و همکاران (۲۰۱۰) غلظت ۱۰ نانو لیتر در لیتر MCP-1 باعث افزایش عمر گل‌جایی و کاهش نسبت تنفس گل‌های بریدنی شب بو گردید. Chutichudet و همکاران (۲۰۱۰) اثر مثبت تیمار ۱-MCP را در افزایش کیفیت پس از برداشت گل‌های بریدنی لاله با تاثیر این ماده در ممانعت از اثر اتیلن نشان دادند. دمای محیط مهمترین عامل موثری در کیفیت پس از برداشت گل‌های بریدنی می‌باشد (Ranwala and Miller, 2005). در دمای پایین نسبت تنفس، مصرف کربوهیدرات‌ها و سایر مواد ذخیره‌ای در بافت گیاه کاهش می‌یابد (Ranwala and Miller, 2005). گل‌ها اتیلن کمتری تولید کرده و حساسیت به حضور اتیلن در اتمسفر محیط کاهش می‌یابد (Song and Peng, 2004). دمای پایین همچنین از دست دادن آب و گسترش میکروارگانیسم‌ها را کند می‌کند (Song and Peng, 2004). دمای مناسب برای نگهداری گل‌های بریدنی بر اساس نوع، گونه گیاهی، مرحله نموی و روش انبارداری متفاوت می‌باشد (Vieira and Brigida; 2009).

نگهداری گل‌های بریدنی مناطق حاره در دمای خیلی پایین ممکن است باعث رنگزدایی و ناتوانایی غنچه‌ها برای باز شدن پس از انبار و ایجاد لکه‌های نکروتیک روی برگ‌ها و گلبرگ‌ها شود (Vieira and Brigida; 2009). نتایج بررسی Zencirkiran (۲۰۰۲) نشان داد که گل‌های فریزیا (Freesia refracta) می‌تواند به صورت مرطوب در دمای ۰-۵ درجه سانتی‌گراد برای ۱۴ روز و شرایط خشک برای ۲۱ روز نگهداری شوند. نگهداری طولانی‌تر از مدت مذکور منتج به کاهش در عمر گل‌دانی و نامرغوب شدن و کاهش کیفیت گل‌ها گردید (Zencirkiran, 2002). نقش انبارداری خشک بر ماندگاری گل‌ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است (Vieira *et al.*, 2012). هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تیمارهای مختلف شیمیایی و دمایی در حفظ کیفیت و ماندگاری گل‌های میخک مینیاتوری می‌باشد.

نانومتر قرائت شد. فعالیت آنزیمی به صورت نانومول بر دقيقه بر میلی‌گرم پروتئین بیان گردید (Ghanati *et al.*, 2002). برای محاسبه فعالیت آنزیم از ضریب خاموشی  $26/6$  لیتر در میکرومول در سانتی متر استفاده گردید.

**اندازه‌گیری میزان تولید اتیلن:** برای این منظور گل مربوط به هر تیمار از ساقه جدا شد و بعد از وزن کردن در داخل شیشه‌های  $250$  میلی‌لیتری قرار گرفت (درپ‌های پلاستیکی شیشه‌های مذکور قبل از انجام آزمایش سوراخ شده و سرپوش‌های پلاستیکی در محل سوراخ‌ها قرار گرفت). شیشه‌های حاوی نمونه به مدت  $2$  ساعت در دمای  $22$  درجه سانتی-گراد به منظور تولید اتیلن نگهداری شدند. در نهایت میزان اتیلن تولید شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) مدل شیماتزو (Shimatzu) ژاپن قرائت شد.

**تجزیه‌ی آماری داده‌ها:** داده‌های حاصل برای فاکتورهای مختلف در طول آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD (حداقل تفاوت معنی‌دار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

به‌منظور جلوگیری از تکرار مطالب و تسهیل در امر تجزیه و تحلیل به هنگام ارائه مطالب تیمارهای مورد استفاده (در شکل‌ها) با علائم اختصاری نشان داده شده‌اند که عبارتند از: AOA150: آمینو اکسی استیک اسید  $150$  میلی‌گرم در لیتر MCP0.48,6h: متیل سیکلو پروپان  $0/48$  میکرو لیتر در لیتر به- مدت  $6$  ساعت

MCP0.72,6h: متیل سیکلو پروپان  $0/72$  میکرو لیتر در لیتر به-

مدت  $6$  ساعت

MCP0.96,3h: متیل سیکلو پروپان  $0/96$  میکرو لیتر در لیتر به-

مدت  $3$  ساعت

### نتایج و بحث:

با توجه به کثرت تیمارهای اعمال شده و در برخی مواقع عدم تفاوت معنی دار آن‌ها نسبت به هم‌دیگر نتایج حاصل از میانگین اثرات این تیمارها برای صفت عمر گلچایی (جدول ۱) با استفاده از تجزیه خوش بر اساس روشی وارد مورد بررسی قرار

روش بردفورو استفاده شد (Bradford, 1976). میزان  $\text{H}_2\text{O}_2$  موجود در مخلوط واکنش با استفاده از ضریب خاموشی ( $\epsilon = 0.28 \text{ mMol}^{-1}\text{cm}^{-1}$ ) محاسبه گردید (Cakmak and Horst, 1991).


**سنجهش فعالیت آنزیم سوپراکسیدیسموتاز (SOD, EC 1.15.1.1):** نمونه بافت در داخل یک هاون و در حضور نیتروژن مایع آسیاب شد و به دمای  $80 - 0/5$  میلی‌لیتر بافر منتقل گردید.  $0/2$  گرم نمونه منجمد با  $0/5$  میلی‌لیتر بافر فسفات پتاویم،  $0/1$  گرم پلی‌وینیل پولی پیرولیدین (PVPP) و pH  $7$  رقیق شد. همگن‌های حاصل در دور  $15000$  دور در دقیقه به مدت  $15$  دقیقه در دمای  $4$  درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شده و بخش روئی برای سنجهش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز مورد استفاده قرار گرفت (Giannopolitis and Ries, 1997). محلول واکنش شامل، بافر فسفات  $50$  میلی‌مolar،  $0/1$  EDTA میلی‌مolar، کربنات سدیم  $50$  میلی‌مolar با  $pH 10/2$ ، متیوبین  $13$  میلی‌مolar، نیتروبلوتورازولیوم (NBT)  $75$  میکرومolar و ریبوفلافین  $2$  میکرومolar و  $10$  میکرولیتر عصاره آنزیمی بود. میزان جذب در طول موج  $560$  نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر قرائت شد. یک واحد فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به عنوان مقدار آنزیمی در نظر گرفته شد که منجر به مهار  $50\%$  احیای نوری نیتروبلوتورازولیوم می‌گردد. فعالیت این آنزیم به صورت واحد آنزیم بر میلی‌گرم پروتئین به شرح زیر محاسبه شد.

**سنجهش فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD, EC 1.11.1.7):**  $0/2$  گرم از بافت تازه گلبرگ در نیتروژن مایع آسیاب شد و در بافر پتاویم فسفات  $0/02$  مولار با  $pH 6/8$  در دمای  $4$  درجه سانتی‌گراد عصاره گیری گردید. سپس همگن حاصل در  $12000$  دور در دمای  $2-4$  درجه سانتی‌گراد به مدت  $15$  دقیقه سانتریفیوژ شد. محلول روئی جهت اندازه‌گیری فعالیت پراکسیداز مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت آنزیم پراکسیداز با افزودن مقادیر مناسب از عصاره آنزیمی، بافر فسفات، محلول گایاکول و پراکسید با غلاظت نهائی  $28$  میلی‌مolar و پراکسید هیدروژن با غلاظت نهائی  $5$  میلی‌مolar در طول موج  $470$

## جدول ۱- تغییر در عمر گلजایی پس از اعمال تیمارهای شیمیایی و اتمام دوره انبارداری خشک

تیمارهای شیمیایی	شاهد	ساعت
عمر گلجایی (روز)		
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۴۸ میکرو لیتر در لیتر	۵/۰۰ <sup>h*</sup>	
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر	۱۰/۰۰ <sup>e</sup>	
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۹۶ میکرو لیتر در لیتر	۱۳/۰۰ <sup>c</sup>	۳ ساعت
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۴۸ میکرو لیتر در لیتر	۱۳/۲۵ <sup>bc</sup>	
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر	۱۴/۲۵ <sup>b</sup>	
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۹۶ میکرو لیتر در لیتر	۱۷/۰۰ <sup>a</sup>	
۱- متیل سیکلو پروپان ۰/۹۶ میکرو لیتر در لیتر	۱۲/۰۰ <sup>d</sup>	
آمینوакسی استیک اسید ۵۰ میلی گرم در لیتر	۶/۵۰ <sup>g</sup>	
آمینوакسی استیک اسید ۱۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۱/۰۰ <sup>d</sup>	
آمینوакسی استیک اسید ۱۵۰ میلی گرم در لیتر	۱۲/۵۰ <sup>bc</sup>	۶ ساعت
بنزیل آدنین ۱۰ میلی گرم در لیتر	۵/۵۰ <sup>g</sup>	
بنزیل آدنین ۲۰ میلی گرم در لیتر	۷/۵۰ <sup>f</sup>	
بنزیل آدنین ۳۰ میلی گرم در لیتر	۹/۰۰ <sup>e</sup>	


در هر ستون میانگین‌های دارای حروف متفاوت در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی‌داری با هم دارند



شکل ۱- خوشبندی میانگین تیمارهای اعمال شده برای صفت عمر گلجایی

خوشه سوم و چهارم تیمارهای AOA 150 mg/L 1-MCP؛ AOA 150 mg/L 1-MCP 0.96 µL/L-6h و 1-MCP 0.48 µL/L-6h از خوشه سوم و تیمار 1-MCP 0.72 µL/L-6h از خوشه چهارم، انتخاب و

گرفت. نتایج حاصل در ۴ خوشه به شرح زیر (شکل ۱) مشخص گردید، بر این اساس علاوه بر شاهد، بهترین سطوح در مجموع تیمارهای مورد بررسی (از نظر عمر گلجایی) از




شکل ۲- تأثیر تیمارهای شیمیایی در دمای ۲۰°C (□) و ۴۰°C (■) بر عمر گل‌جایی. حروف مشترک یانگر عدم اختلاف معنی‌دار می‌باشد.

Nowak and Rudnicki, 1990; Zencirkiran, 2002; Sanino, ) 2004; Vieira *et al.*, 2012). در بررسی حاضر دمای ۲ درجه سانتی‌گراد بهتر از دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در به تاخیر انداختن پیری گل‌های بریدنی میخک مینیاتوری عمل نمود. در پژوهش کریمی و حسن‌پور (۱۳۸۷) نگهداری گل‌های بریدنی لیبیوم در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد باعث افزایش عمر گل‌جایی گردید. در گزارشی دیگر دمای ۱/۵ درجه‌سانتی‌گراد بهترین دما برای نگهداری گل‌های بریدنی داودی شناخته شد (Vieira and Brigida; 2009). در بررسی ویت‌هاکا و همکاران (2001) گل‌های بریدنی مریم در داخل ورقه‌های پلی‌اتیلنی بسته بندی شده و به مدت ۴، ۸ و ۱۶ روز در دماهای صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ قرار گرفتند. این محققین گزارش کردند دمای صفر و ۵ درجه سانتی‌گراد تأثیر معنی‌داری در افزایش ماندگاری گل‌ها داشته است. در بررسی مذکور انبارداری خشک موثرتر از انبارداری مرطوب در افزایش عمر گل‌جایی گل‌های بریدنی مریم عمل نمود. دلیل این پدیده افزایش میزان تنفس در انبارداری مرطوب ذکر گردید. بررسی‌های زنسیرکران (Zencirkiran, 2002) نشان داد گل‌های فرزیا می‌توانند به صورت مرطوب در دمای ۰/۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۴ روز و در شرایط خشک ۲۱ روز نگهداری شوند. بر اساس شکل ۲ پیش‌تیمار گل‌های بریدنی قبل از انتقال به دمای پایین تأثیر معنی‌داری در افزایش ماندگاری گل‌ها داشت. بطوريکه تیمار ۶ ساعت، ۰/۷۲ میکرو

برای بررسی تأثیر آن‌ها روی مجموع صفات مورد بررسی در این بخش از آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.

**عمر گل‌جایی:** عمر گل‌جایی در هر رقم و بسته به نوع تیمار در هر دو دما متفاوت بود. دمای ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به طور معنی‌داری در افزایش طول عمر گل‌های میخک مینیاتوری موثر بوده است. در شکل ۲ میانگین‌های دو فاكتور دما و تیمارهای شیمیایی بر ماندگاری گل‌ها نشان داده شده است. باتوجه به شکل اعمال تیمارهای شیمیایی در دمای ۲ درجه‌سانتی‌گراد افزایش طول عمر بیشتری نسبت به دمای ۴ درجه‌سانتی‌گراد گردید. تیمار ۶ ساعت، ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP در هر دو دما بیشترین عمر گل‌جایی (در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد ۱۸ روز و در دمای ۴ درجه‌سانتی‌گراد ۱۵/۵۰ روز) را باعث شد (شکل ۲). کمترین عمر گل‌جایی مربوط به شاهد بود. در بین دو رقم مورد بررسی متوسط عمر گل‌جایی در 'Aragon' و 'Erueka' به ترتیب ۱۱ و ۱۳ روز بود.

عمر گل‌جایی گل‌های بریدنی پس از جدا شدن از گیاه مادری بسیار محدود خواهد بود. این پدیده به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی این گیاهان می‌باشد. دمای پایین در برخی از گل‌ها یکی از بهترین تیمارها جهت کاهش فعالیت‌های فیزیولوژیکی و تخربی‌های پاتولوژیکی می‌باشد. دمای کم میزان تنفس، تولید اتیلن، تجزیه برخی از آنزیمهای و از دست دادن آب بافت‌ها را کاهش می‌دهد




شکل ۳- اثر تیمارهای شیمیایی و دما (۲ (□) و ۴ (■) درجه سانتی گراد) بر میزان تولید اتیلن (a). اثر تیمارهای شیمیایی و رقم (Aragon) و Erueka (b) بر میزان تولید اتیلن (b). حروف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنی دار اساس آزمون LSD می باشد.

۰/۹۶ ساعت) میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP مشاهده نشد (شکل ۳). در بررسی Song و Peng (۲۰۰۴) روی گل های بریدنی لیلیوم، در دمای پایین، گل ها اتیلن کمتری تولید کردند و حساسیت به حضور اتیلن در اتمسفر محیط، کاهش یافت. در مطالعه حاضر پیش تیمار گل های بریدنی میخک مینیاتوری قبل از انتقال به دمای پایین تاثیر معنی داری در افزایش ماندگاری گل ها داشت. تیمارهای ۱-MCP و AOA به عنوان بازدارنده از عمل و تولید اتیلن نقش موثری در کاهش اتیلن تولیدی داشتند. حسن و حافظ (Hassan and Mahfouz, 2012) نیز نتایج مشابهی مبنی بر کاهش تولید اتیلن در دمای پایین و تحت پیش تیمار ۱-MCP گزارش کردند.

**فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD):** میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در روزهای اول (بلافاصله بعد از اتمام دوره انبارداری خشک) و سوم بعد از انبارداری مورد اندازه گیری قرار گرفت. در بیشتر پیش تیمارهای اعمال شده میانگین فعالیت آنزیم در 'Erueka' بیشتر از 'Aragon' بود. حداقل فعالیت در روز اول نمونه برداری (بعد از اتمام دوره انبارداری) با ۱۱/۵ (Erueka) و ۱۰ (Aragon) نانو مول بر دقیقه بر میلی گرم پروتئین مربوط به تیمار ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP بود. تفاوت معنی داری بین تیمارهای مورد بررسی در میزان فعالیت آنزیم POD در هر دو دمای مورد بررسی وجود داشت.

لیتر در لیتر ۱-MCP در هر دو دما بیشترین عمر گلچایی را باعث شد. در بررسی سجلی و همکاران (Seglie *et al.*, 2011) تیمار ۰/۵ میلی گرم در لیتر ۱-MCP باعث افزایش عمر گلچایی میخک گردید. نتایج مشابهی توسط چاتیجادت و همکاران (Chutichudet *et al.*, 2010) مبنی بر به تأخیر افتادن پیرسی در گل های لاله توسط تیمار ۱-MCP گزارش شده است. تیمار مذکور ماندگاری گل های استکانی را نیز افزایش داد (Serek *et al.*, 1996).

**تولید اتیلن:** میزان تولید اتیلن بلا فاصله بعد از اتمام دوره انبارداری خشک مورد اندازه گیری قرار گرفت. اتیلن تولیدی در هر دو دما و تحت تاثیر تیمارهای مورد استفاده کاهش چشم گیری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (شکل ۳). در بین دو رقم مورد بررسی 'Erueka' اتیلن کمتری نسبت به 'Aragon' تولید کرد. شرایط دمایی تاثیر معنی داری بر کاهش تولید اتیلن در گل های بریدنی میخک مینیاتوری داشت. بطوریکه میانگین تولید اتیلن در دمای ۲ و ۴ درجه سانتی گراد به ترتیب ۲/۳۵ و ۴/۱۱ نانو لیتر بر گرم وزن تر در ساعت بود. در بین پیش تیمارهای اعمال شده ۶ ساعت و با غلط نتایج در ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP تاثیر بیشتری در مقایسه با تیمار شاهد در کاهش اتیلن تولیدی داشت. تفاوت معنی داری بین سه تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر AOA، ۰/۴۸ (۶ ساعت) و




شکل ۴- تاثیر تیمارهای شیمیایی و دمای ۲ (□) و ۴ (■) درجه سانتی گراد بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز اول (a) و سوم (b) تاثیر تیمارهای شیمیایی و رقم (□ Aragon و ■ Erueka) بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز اول (c) و سوم (d) بعد از اتمام دوره انبارداری خشک. حروف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنی دار بر اساس آزمون LSD می باشد.

مخالف نشان داده شده است. با توجه به این شکل می توان اظهار داشت بیشترین فعالیت در همه پیش تیمارهای اعمال شده مربوط به دمای ۴ درجه سانتی گراد بود. در این دما حداکثر و حداقل فعالیت آنزیم با ۱/۸ و ۰/۹۲ نانو لیتر بر دقیقه بر میگردد و پرتوئین به ترتیب در تیمارهای ۰/۷۲ و ۰/۴۸ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP و شاهد مشاهده شد. در بین دو رقم مورد بررسی فعالیت آنزیم در 'آریکا' بیشتر از 'Aragon' در همه تیمارها بود (شکل ۵ و ۶).

آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD): فعالیت همانند آنزیم های CAT و POD روند افزایشی نشان داد و در،

حداکثر فعالیت آنزیم مربوط به پیش تیمار ۶ ساعت، ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP در دمای ۴ درجه سانتی گراد بود (شکل ۴، a و b). تفاوت معنی داری بین سه تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر AOA و ۰/۹۶ و ۰/۴۸ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP در روزهای اول و سوم نمونه برداری مشاهده نشد. اثر متقابل تیمار و رقم نیز بر میزان فعالیت آنزیم معنی دار بود (شکل ۴، c و d). در روز سوم، فعالیت آنزیم در هر دو رقم مورد بررسی افزایش نشان داد.


فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT): در شکل (۵ a و b) مقایسه میانگین های اثرات متقابل دو فاکتور دما و تیمارهای



شکل ۵- تاثیر تیمارهای شیمیابی و دمای ۲ (□) و ۴ (■) درجه سانتی گراد بر فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) در روز اول (a) و سوم (b) تاثیر تیمارهای شیمیابی و رقم (□ Aragon و ■ Erueka) بر فعالیت آنزیم کاتالاز در روز اول (c) و سوم (d) بعد از اتمام دوره انبارداری خشک. حروف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنی دار بر اساس آزمون LSD می باشد.

در مطالعه حاضر میزان فعالیت آنزیم های POD، SOD و CAT در دمای ۲ درجه سانتی گراد و در روز اول بعد از انبارداری خشک کمتر از دمای ۴ درجه سانتی گراد و روز سوم اندازه گیری بود. این نتیجه می تواند به دلیل تولید کمتر رادیکال های آزاد در دمای پایین و یا کلا متابولیسم کمتر در دمای پایین باشد (Pennycooke *et al.*, 2005). با کاربرد تیمار دمایی و بررسی اثر آن بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گل اطلسی مشاهده شد که فعالیت در دماهای کمتر کاهش می یابد فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در دماهای پایین گزارش شده است (Hassan and Mahfouz, 2012). در مطالعه حاضر، هر سه آنزیم مورد بررسی در گل های بریدنی تیمار شده با

روز سوم بیشتر از روز اول نمونه برداری بود. حداکثر فعالیت آنزیم در دمای ۴ درجه سانتی گراد و مربوط به تیمار ۶ ساعت ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP-1 بود. لیکن تفاوت معنی داری بین سه تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر AOA و ۰/۹۶ و ۰/۴۸ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP در روزهای اول و سوم نمونه برداری مشاهده نشد (شکل ۶، a و b). مقایسه میانگین داده های فعالیت SOD در دو رقم از گل های بریدنی می خواهد مینیاتوری نشان داد که در 'Erueka' این میزان بیشتر از 'Aragon' است (شکل ۶، c و d). در هر دو رقم مورد بررسی حداکثر فعالیت با ۱۷/۹ (Erueka) و ۱۶ (Aragon) واحد بر میلی گرم پروتئین مربوط به تیمار ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر ۱-MCP در روز سوم نمونه برداری بود.



شکل ۶- تاثیر تیمارهای شیمیابی و دمای ۲ (□) و ۴ (■) درجه سانتی گراد بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در روز اول (a) و سوم (b) تاثیر تیمارهای شیمیابی و رقم (□ Aragon و ■ Erueka) بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در روز اول (c) و سوم (d) بعد از اتمام دوره انبارداری خشک. حروف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنی دار بر اساس آزمون LSD می باشد.

انبارداری خشک گل‌های بریدنی میخک مینیاتوری در دماهای پایین نقش موثری در حفظ کیفیت و افزایش عمر گل‌جایی دارد و امکان صادرات گل‌ها به مناطق دور دست را امکان‌پذیر می‌کند. دمای ۲ موثرتر از ۴ درجه سانتی گراد در حفظ کیفیت گل‌ها در هر دو رقم و همه پیش‌تیمارهای بکار رفته بود. بیشترین عمر گل‌جایی در گل‌هایی مشاهده گردید که قبل از نگهداری در دمای پایین به مدت ۶ ساعت با غلظت ۰/۷۲ میکرو لیتر در لیتر 1-MCP تیمار شده بودند. در دماهای پایین (۲ و ۴ درجه سانتی گراد) میزان تولید اتیلن به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش نشان داد. در دمای ۲ درجه سانتی گراد فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (POD، CAT و SOD) کمتر از دمای ۴ درجه سانتی گراد بود.

1-MCP فعالیت بیشتری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. لارجیا دیر و همکاران (Larrigaudiere *et al.*, 2004) گزارش کردند، افزایش فعالیت پراکسیداز و کاتالاز در گیاهان تیمار شده با 1-MCP ممکن است به دلیل کاهش تولید اتیلن و افزایش تجزیه  $O_2^-$  و  $H_2O_2$  باشد. مکلین و همکاران (MacLean *et al.*, 2003) اظهار داشتند افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان توسط 1-MCP ممکن است به دلیل توانایی این ماده در ممانعت از تولید رادیکال‌های آزاد سلوالی باشد.

#### نتیجه‌گیری کلی:

به طور خلاصه، نتایج کاربردی این پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد:

## منابع:

- of Horticultural Sciences and Biotechnology 75: 149-153.
- Khan, N. A. (2006) Ethylene Action in Plants. Springer 206 P.
- Paliyath, G., Murr, D. P. Handa, A. K. and Lurie, S. (2008) Postharvest Biology and Technology of Fruits, Vegetable and Flowers. Wiley Black Well Publishing, 482p.
- Pennycooke, J. C., Cox, S. and Stushnoff, C. (2005) Relationship of cold acclimation, total phenolic content and antioxidant capacity with chilling tolerance in petunia (*Petunia* x hybrid). Environmental and Experimental Botany 53:225-232.
- Rudnicki, R. M., Nowak, J. and Goszczynska, D. M. (1991) Cold storage and transpiration conditions for cut flowers, cutting and potted plants. Acta Horticulturae 298:225-231.
- Ranwala, A. P. and Miller, W. B. (2005) Effect of cold storage on postharvest leaf and flower quality of potted Oriental, Asiatic and LA- hybrid lily cultivars. Scientia Horticulturae 105: 383- 392.
- Sanino, A. (2004) Conservação de tomate (*Lycopersicum esculentum*) 'Debora', submetido a diferentes condições de resfriamento e aquecimento intermitente. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual de Campinas, p. 63.
- Seglie, L., Martina, K., Devecchi, M. C., Roggero, F., Trotta and Scariot, V. (2011) The effects of 1-MCP in cyclodextrin-based nanosponges to improve the vase life of *Dianthus caryophyllus* cut flowers. Postharvest Biology and Technology 59: 200-205.
- Serek, M., Sisler, E. and Reid, M. (1996) Ethylene and the post harvest performance of minature rose. Acta Horticulturae 424: 145-149.
- Song, L. L. and Peng, Y. H. (2004) Effect of cold storage on sensitivity of cut lily to ethylene. Journal of Horticulture Science and Biotechnology 79: 723-728.
- Vieira, M. R. S. and Brigida, S. (2009) Storage of cut chrysanthemums at different cutting temperatures. Pesquisa Agropecuaria Tropical 4:356-359.
- Vieira, M. R. S., Medeiros, D. S., Costa P. N., Santos, C.M.G., Paes, R.L., Fernandez, L.M.S., Oliveira, N.G., Allan, A. and Silva, F. (2012) Effect of refrigeration on post-harvest flowers. African Journal of Biotechnology 11: 13065-13068.
- Waithaka, K., Reid M. S. and Dodge, L. L. (2001) Cold storage and flower keeping quality of cut tuberose (*Polianthes tuberosa* L.). Journal of Horticultural Science and Biotechnology 76: 271-275.
- Yee, D. A. and Tissue, D. T. (2005) Relationships between Non-structural Carbohydrate Concentration and Flowering in a Subtropical Herb, *Heliconia caribaea* (Heliconiaceae). Caribbean Journal of Science 41: 243-249.
- Zencirkiran, M. (2002) Cold storage of *freesia refracta "cordula"*. New Zealand Journal of crop and Horticultural Science 30: 171- 174.
- کریمی. م، و حسنپور اصلیل. م. (۱۳۸۷) اثر تیمارهای شیمیایی و دمایی بر طول عمر گل بریدنی سوسن ( *Lilium longiflorum* L.). دانش کشاورزی ۱۸: ۶۹-۸۲.
- Bradford, M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Annual Review Biochemistry 72:248-254.
- Cameron, A. C. and Reid, M. S. (2001) 1-MCP blocks ethylene-induced petal abscission of *Pelargonium peltatum* but the effect is transient. Postharvest Biology and Technology 22:169-177.
- Cakmak, I. and Horst, W. (1991) Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase and peroxidase activities in root tip of soybean (*Glysin max*). Plant Phisiolog 83:463-468.
- Chutichudet, P., Chutichudet, B. and Boontiang, K. (2010) Effect of 1-MCP fumigation on vase life and other postharvest qualities of Siam Tulip (*Curcuma aeruqinosa Roxb*) cv. Laddawan. International Journal Agriculture Research 5: 1- 10.
- Darras, A. I., Ioannidou, A. A. and Pompadakis, N. E. (2010) Evaluation and improvement of post-harvest performance of cut Viburnum tinus inflorescence. Scientia Horticulturae 124: 376-380.
- Ghanati, F, Morita, A. and Yokota, H. (2002) Induction of suberin and increase of lignin content by excess Boron in *Tabacco* cell. Soil Science and Plant Nutrition 48: 357-364.
- Giannopolitis, C. and Ries, S. (1997) Superoxid desmutase. I. Occurrence in higher plant. Plant Physiology 59: 309-314.
- Hassan, F. A. S. and Mahfouz, S. A. (2012) Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on the postharvest senescence of coriander leaves during storage and its relation to antioxidant enzyme activity. Scientia Horticulturae 141: 69-75.
- Larrigaudiere, C., Vilaplana, R., Soria, Y. and Recasens, I. (2004) Oxidative behaviour of Blanquilla pears treated with 1-methylcyclopropene during cold storage. Journal of the Science of Food and Agriculture 84: 1871-1877.
- Lerslerwong, L. and Ketsa, S. (2008) Autocatalytic ethylene production by *Dendrobium* flowers during senescence induced by exogenous ethylene. Thai Journal of Agricultural Science 41: 91-99.
- MacLean, D. D., Murr, D. P. and DeEll, J. R. (2003) A modified total oxyradical scavenging capacity assay for antioxidants in plant tissues. Postharvest Biology and Technology 29: 183-194.
- Nowak, J. and Rudnicki, R. M. (1990) Postharvest handling and storage of cut flowers, florist greens and potted plant. Portland, Timber Press, p. 210.
- Ketsa, S. and Rukpong, A. (2000) Ethylene production senescence and ethylene sensitivity *Dendrobium 'Pompadour'* flowers following pollination. Journal

