

تأثیر پوشش کیتوزان بر انبارمانی فلفل دلمه‌ای (*Capsicum annum L.*)

راضیه عمادی فر^۱، غلامرضا شریفی^{۲*}، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی^۳

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

r.emadifar65@gmail.com

۲* استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

sharifisirchi@yahoo.com sharifi@uk.ac.ir

۳ دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

dastgerdy1352@yahoo.com

چکیده

یکی از محدودیت‌های نگه‌داری، بازاریابی و صادرات فلفل دلمه‌ای (*Capsicum annum L.*)، رسیدن سریع آن پس از برداشت و فساد میکروبی می‌باشد که موجب کاهش خواص کیفی و فساد این محصول می‌شود. این چالش‌ها به طور موثر با استفاده از تکنیک‌های پس از برداشت کاهش یافته است. از تیمارهای پوشش‌های خوراکی می‌توان در پس از برداشت میوه‌های مختلف استفاده کرد. هدف از انجام این آزمایش استفاده از کیتوزان با چهار سطح (صفر، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در طی زمان (صفر، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) با چهار تکرار بر کیفیت پس از برداشت فلفل دلمه‌ای رقم کالیفرنیا و اندر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی می‌باشد. نتایج نشان داد که غلظت ۲ درصد کیتوزان از کاهش وزن در زمان ۲۸ روز جلوگیری کرد. در پایان آزمایش تیمار کیتوزان ۲ درصد نسبت به شاهد موجب کاهش TSS به میزان ۴۲/۲ درصد گردید. بیشترین میزان کلروفیل a در تیمار کیتوزان در مقایسه با شاهد در ۲۸ روز مشاهده شد. بیشترین افزایش معنی‌دار کلروفیل b در فلفل دلمه‌ای با غلظت ۲ درصد در زمان صفر به میزان ۱۱۳/۳۳ درصد نسبت به شاهد شد. میزان کاروتنوئید فلفل دلمه‌ای در زمان ۲۸ روز در شاهد به میزان ۹۷/۱۴ درصد نسبت به زمان صفر افزایش معنی‌داری را نشان داد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کیتوزان به ترتیب با غلظت ۰/۵، ۱ و ۲ در زمان ۲۸ روز سبب کاهش نشت یونی به ترتیب به میزان ۸/۵۶، ۹ و ۹/۵۷ نسبت به شاهد در زمان ۲۸ روز شد. نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف کیتوزان و به ویژه غلظت ۲٪ در مقایسه با شاهد باعث حفظ کیفیت پس از برداشت و تاخیر پیری میوه فلفل دلمه‌ای شده است. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از این پوشش خوراکی به عنوان یک برنامه کاربردی جهت افزایش ماندگاری فلفل دلمه‌ای توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: کاهش وزن، کلروفیل، کیفیت، نشت یونی

فلفل دلمه‌ای (*Capsicum annuum* L.) یکی از مهم‌ترین محصولات باغی می‌باشد که از نظر اقتصادی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان کشت می‌شود (Tsegay *et al.*, 2013). استفاده و تقاضای آن در سال‌های اخیر در نتیجه رشد چشمگیر جمعیت و استفاده از آن در وعده‌های غذایی مختلف افزایش یافته است (Marín Fernández *et al.*, 2004). تمایل به مصرف میوه فلفل به دلیل داشتن مواد حیاتی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی رو به افزایش است. فلفل دارای انواع ویتامین‌های A، B₁، B₂، نیاسین و C می‌باشد (Wahyuni *et al.*, 2013). با توجه به اینکه در مراحل پس از برداشت محصولات کشاورزی، همچنان فعالیت‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در میوه‌ها و سبزی‌ها ادامه دارد و ویژگی‌های کیفی از قبیل رطوبت، بافت، عطر و طعم این محصولات دچار افت می‌شود (Jianglian and Shaoying, 2013)، استفاده از تیمارهای پس از برداشت می‌تواند در افزایش مدت نگهداری این میوه موثر باشد. یکی از تیمارهای پس از برداشت که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است، استفاده از پوشش‌های خوراکی می‌باشد. بیشتر این ماکرومولکول‌ها قادر به تشکیل بیوفیلم بوده و به صورت پوشش‌های سطحی روی میوه‌ها به کار می‌روند تا میزان تنفس و تبخیر و تعرق از سطح میوه را کاهش دهند. این مواد همچنین قابلیت جابجایی فرآورده را بهبود بخشیده و به حفظ ثبات و پایداری آن حین جابجایی کمک می‌کنند (Sharma *et al.*, 2019). استفاده از پوشش کیتوزان به نتایج سودمندی از جمله کاهش وزن، تغییر رنگ محصولات باغبانی و به تعویق انداختن روند پیری و در نتیجه حفظ ظاهر میوه و کیفیت کلی میوه منجر می‌شود (Velickova *et al.*, 2013). در مطالعه‌ای نتایج نشان داد که استفاده از پوشش خوراکی کیتوزان منجر به کاهش درصد سرمازدگی، پوسیدگی و همچنین بهبود کیفیت فلفل شیرین پس از نگهداری طولانی مدت (در مدت ۳ هفته) در دمای ۱/۵ درجه سانتی‌گراد و سپس ۳ روز دیگر در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد شد (Kehila *et al.*, 2021). در پژوهشی نتایج نشان داد که ترکیب تیمار اسپرین ۱/۵ میلی‌مولار و کیتوزان ۱ درصد از کاهش وزن به میزان ۴۶/۷ درصد، نشت یونی ۶۳/۶ درصد در مقایسه با شاهد جلوگیری کرد (Sharma *et al.*, 2022). با توجه به اهمیتی که صادرات فلفل دلمه‌ای از نظر اقتصاد و ارزآوری دارد، لزوم اجرای پژوهش‌هایی در جهت افزایش انبارمانی فلفل دلمه‌ای و کاربرد بسته‌بندی‌های مناسب در این زمینه از موارد ضروری می‌باشد. برای بهبود زمان نگهداری فلفل دلمه‌ای می‌توان از روش‌هایی استفاده کرد که سرعت تنفس فلفل دلمه‌ای را کند نموده و باعث کاهش از دست‌دهی آب فلفل دلمه‌ای شوند. استفاده از ترکیبات شیمیایی برای افزایش عمر پس از برداشت محصولات کشاورزی کمتر به وسیله مصرف‌کننده پذیرفته می‌شود، زیرا این ترکیبات ممکن است آلاینده محیط زیست و همچنین برای سلامتی انسان مضر باشند (Tiamiyu *et al.*, 2023). امروزه برای گسترش کیفیت و عمر پس از برداشت محصولات باغبانی بیوتکنولوژی‌های جدید مانند استفاده از پوشش‌های خوراکی و بسته‌بندی مناسب به منظور حفظ کیفیت یا بهبود وضعیت ظاهری فرآورده‌ها مورد توجه واقع شده است. لذا هدف از این پژوهش نیز افزایش کیفیت و ماندگاری فلفل دلمه‌ای با استفاده از پوشش‌های خوراکی کیتوزان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

میوه‌های فلفل دلمه‌ای تازه رقم کالیفرنیا واندر (California wonder) از مجتمع گلخانه‌ای سرخون در شهرستان بندرعباس در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند و بلافاصله بعد از برداشت به آزمایشگاه جهت اعمال تیمارها منتقل شدند. سپس میوه‌های سالم و یکنواخت به منظور اعمال تیمارها انتخاب شدند.

اعمال تیمار

تیمارهای کیتوزان شامل غلظت‌های (صفر، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد وزنی - حجمی) در چهار تکرار بود. غلظت‌های مختلف این پوشش به وسیله حل کردن مقدار لازم از پودر کیتوزان (Chemsavers) در اسید استیک ۰/۵ درصد با کمی حرارت حل گردید و پس از تهیه

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

یک محلول یکنواخت، به مدت ۲۴ ساعت در یک فضای استریل نگهداری شد و جهت اعمال تیمارها مورد استفاده قرار گرفت (Xing *et al.*, 2011). میوه‌های فلفل دلمه‌ای در غلظت‌های (صفر، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) از کیتوزان به مدت ۲ دقیقه غوطه‌ور شدند. میوه‌ها پس از تیمار در دمای آزمایشگاه خشک شده و به مدت ۲۸ روز در انبار با شرایط دمایی ۱۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد نگهداری شدند. پس از فواصل زمانی ۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز، میوه‌ها از انبار خارج و به مدت ۴۸ ساعت در شرایط دمایی محیطی ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. سپس شاخص‌های کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی صفات

کاهش وزن و pH

کاهش وزن میوه‌ها به صورت اختلاف وزن میوه‌ها در زمان قبل از انبارمانی و پس از پایان انبارمانی بر حسب درصد به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۱ گرم محاسبه شد. pH با استفاده از دستگاه pH متر (Hanna, Italy, HI2211) اندازه‌گیری شد.

مواد جامد محلول (TSS) و اسید قابل تیتراسیون (TA)

TSS بر حسب درصد بریکس آب محصول با استفاده از رفرکتومتر دیجیتال (DBR 95, Taiwan) اندازه‌گیری شد. TA با روش تیتراسیون با سود ۰/۱ نرمال و بر حسب درصد اسید مالیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی رنگ میوه

شاخص رنگ با استفاده فاکتورهای مختلف رنگ میوه فلفل دلمه‌ای با استفاده از دستگاه رنگ‌سنج (Minolta CR-400, Japan) اندازه‌گیری شد. ارزیابی میوه‌ها، بر اساس اندازه‌گیری شاخص‌های رنگ L^* (روشنایی رنگ)، a^* (قرمزی رنگ)، b^* (زردی رنگ) و ΔE (شدت رنگ) تعیین شد.

محتوای کلروفیل

میزان ۰/۲ گرم از بافت میوه تازه با ۵ میلی‌لیتر از حلال استون ۸۰ درصد استخراج شد. سپس حجم آن با ۸۰ درصد استون به ده میلی‌لیتر و در ۸۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۸ دقیقه در ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس مایع شفاف حاوی کلروفیل با استخراج ناخالصی‌ها دور ریخته شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۴۵، ۶۶۳ و ۴۷۰ نانومتر خوانده شد. میزان کلروفیل a ، کلروفیل b و کاروتنوئید بر حسب میلی‌گرم بر گرم وزن تازه، از طریق روابط زیر محاسبه گردید (Arnon *et al.*, 1949).

$$\text{Chla} = (12.25\text{A}663 - 2.79\text{A}645)$$

$$\text{Chlb} = (21.21\text{A}645 - 5.1\text{A}663)$$

$$\text{Carotenoides} = 100(\text{A}470) - 3.27(\text{mg chl. a}) - 104(\text{mg chl. b})/227$$

نشت یونی

از قسمت‌های میانی میوه‌ها تعداد ۴ دیسک برداشته و در داخل لوله‌های آزمایش حاوی ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر قرار داده شد. پس از ۴ ساعت شیک با سرعت ۱۵۰ دور در دقیقه هدایت الکتریکی اولیه (EC_1) محلول توسط دستگاه EC متر (AD300) قرائت شد. نمونه‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در داخل حمام آب گرم با دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و پس از سرد شدن، هدایت الکتریکی (EC_2) نمونه‌ها اندازه‌گیری و با استفاده از فرمول زیر درصد نشت یونی محاسبه شد (Sakaldas *et al.*, 2016).

$$\text{EL} (\%) = (\text{EC}_1/\text{EC}_2) \times 100$$

آنالیز آماری

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار SAS نسخه ۹/۴ و آزمون LSD برای مقایسه میانگین داده‌ها در سطح احتمال $P < 0.05$ ارزیابی شد.


نتایج و بحث

کاهش وزن و pH

بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داده شد که اثر متقابل کیتوزان و زمان بر کاهش وزن و pH فلفل دلمه‌ای به ترتیب در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد معنی دار می‌باشد (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که شاهد در زمان ۲۸ روز بیشترین افزایش معنی دار را نسبت زمان صفر در کاهش وزن داشت. غلظت ۲ درصد کیتوزان از کاهش وزن فلفل دلمه‌ای در زمان ۲۸ روز جلوگیری کرد (شکل ۱ الف). کاهش وزن مربوط به کربوهیدرات‌های میوه و ذخایر اسیدهای آلی است (Lwin et al., 2022). کاهش وزن به نوبه خود با افزایش رادیکال‌های آزاد پیری را تسریع می‌کند (Treviño-Garza et al., 2015). میزان تنفس و مصرف قند توسط سلول منجر به از دست دادن آب بیشتر می‌شود که عامل مهمی در خراب شدن محصولات است (Dhakad et al., 2020). نقش کیتوزان در کاهش وزن میوه را می‌توان به خاصیت پلی‌کاتیونی آن نسبت داد. این پوشش پلی‌کاتیونی با شکسته شدن به قطعات پلی‌مری و تشکیل مجدد زنجیره پلی‌مری، باعث تشکیل فیلم پوششی سطحی با حالت ژله‌ای شد (Casariego et al., 2008). این پوشش منجر به لایه آب دوست در اطراف میوه شده که مانعی در برابر تبادلات گازی می‌باشد و بدین ترتیب تنفس را کاهش داده و از تعرق و کاهش رطوبت سطحی نیز جلوگیری می‌کند (Park, 1999). یکی از دلایل کاهش وزن میوه طی مدت نگهداری در سردخانه، آلودگی به عوامل بیماری‌زا است که با صدمه به بافت میوه می‌تواند میزان کاهش وزن میوه‌ها را افزایش دهد. بنابراین کیتوزان به دلیل خاصیت ضد میکروبی، با کاهش آلودگی‌های پس از برداشت از کاهش وزن میوه جلوگیری می‌کند (Casariego et al., 2008). کاهش از دست رفتن رطوبت با کاربرد پوشش کیتوزان در توت‌فرنگی (Hernández-Muñoz et al., 2008)، انار (Meighani et al., 2015) و گوجه‌فرنگی (Liu et al., 2007) نیز گزارش شده است. در نتیجه پوشش کیتوزان وزن میوه را به طور قابل توجهی حفظ می‌کند و این اثر با مطالعات قبلی روی میوه کنار (Dutta et al., 2016) و انگور (Sabir et al., 2019) مطابقت داشت. به طور کلی، پوشش کیتوزان می‌تواند به عنوان فیلم خوراکی تجاری مناسب برای حفظ وزن میوه در سردخانه در نظر گرفته شود (Kou et al., 2019). استفاده از پوشش کیتوزان می‌تواند به طور موثر به عنوان یک لایه نیمه نفوذ پذیر تجاری عمل کند که می‌تواند تبادل گازها و همچنین رطوبت را به طور قابل توجهی کاهش دهد. این به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی در میزان تنفس و از دست دادن آب در طول ذخیره‌سازی میوه‌ها پس از برداشت شود (Dutta et al., 2016; Xing et al., 2011). Bhowmick و همکاران (۲۰۱۸) گزارش کردند که میوه‌های بدون روکش با وزن ۲۴/۴۶ پس از ۱۲ روز انبارمانی وزن خود را ازدست دادند، در حالی که کاهش وزن برای نمونه‌های پوش داده شده با ۰/۵، ۱ و ۲ درصد کیتوزان ۱۴/۱۸، ۱۳/۳۸ و ۱۲/۴۸ درصد بود. گزارشات Camatari و همکاران (۲۰۱۷) همچنین نشان داد که انبه با سطح بالاتری از کیتوزان (۰/۵ درصد) باعث کاهش وزن کمتری در طی انبارمانی شده است. همچنین مقایسه میانگین نشان داد کیتوزان با غلظت ۱ درصد در زمان ۲۸ روز بیشترین اثر را بر pH نسبت به شاهد به میزان ۱/۰۷ درصد دارد (شکل ۱ ب). pH یک پارامتر مهم در حفظ کیفیت میوه است که ارتباط مستقیمی با غلظت اسیدهای آلی در نمونه‌ها دارد (Lara et al., 2006). در طی زمان انبارمانی، اسیدهای آلی برای تامین انرژی لازم فعالیت‌های عادی سلول‌ها توسط واکنش‌های تنفسی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Ali et al., 2011). با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر، مقدار اسید و سطح pH میوه آن مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که سطح pH در طول زمان روند صعودی را نشان می‌دهد. این را می‌توان به مصرف اسیدهای آلی در طول تنفس و همچنین تبدیل بعدی آن‌ها به قند نسبت داد (Flórez-Martínez et al., 2020). پوشش کیتوزان با محدود کردن تبادلات گازهای CO₂

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

و O₂، موجب کاهش سرعت تنفس و در نتیجه کاهش مصرف اسیدهای آلی و افزایش pH میوه می‌شود (Salvia-Trujillo *et al.*, 2015).



شکل ۱- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بر (a) کاهش وزن و (b) pH فلفل دلمه‌ای (میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند).

جدول ۱- تجزیه واریانس اثر متقابل تیمار کیتوزان با غلظت‌های (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز)

بر صفات کمی فلفل دلمه‌ای



ΔE	L*	b*	a*	میانگین مربعات			درجه آزادی	منابع تغییرات	
				TA	TSS	pH			
۴/۶۹**	۷/۹۱**	۴۲/۴۴**	۱۸/۳۴**	۰/۱۱**	۵/۶۶**	۰/۰۱۴**	۰/۰۱۲*	۳	کیتوزان
۱۲/۲۲**	۱۶/۰۹**	۴۱/۴۴**	۲۴/۲۸**	۰/۷۹**	۲/۳۸**	۰/۱۳**	۰/۱۱**	۴	زمان
۰/۳۲**	۰/۵۱**	۷/۱۸**	۳/۵۲**	۰/۰۹۶**	۰/۷۳**	۰/۰۲۱**	۰/۰۰۰۵۷*	۱۲	کیتوزان × زمان
۱۵/۴۴	۰/۰۹۴	۰/۴۰	۰/۲۲	۰/۰۲۷	۰/۰۲۱	۰/۰۰۰۳۷	۰/۰۰۳۰	۶۰	خطای آزمایش
۴/۲۶	۳/۵۹	۴/۷۷	۴/۰۸	۲/۷۸	۱۵/۱۹	۳/۸۶	۷/۲۷	-	ضریب تغییرات (%)

ns، * و ** به ترتیب بی‌معنی، معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

اسیدیته قابل تتراسیون (TA) و مواد جامد محلول (TSS)

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر متقابل کیتوزان و زمان بر شاخص TA و TSS فلفل دلمه‌ای در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار شد (جدول ۱). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین TA در زمان صفر نسبت به زمان ۲۸ روز بود (شکل ۲ الف). کاهش اسیدیته قابل تتراسیون در روز صفر انبارمانی به مصرف آن‌ها در چرخه کربس ارتباط دارد. کاهش میزان اسید میوه بیانگر رسیدن و زوال آن است. در این آزمایش اسیدیته قابل تتراسیون توسط تیمارهای کیتوزان در مقایسه با شاهد بهتر حفظ شد. پوشش نیمه تراوایی کیتوزان اتمسفر درونی میوه را تغییر داده و میزان اکسیژن را کم و دی‌اکسید کربن اطراف میوه را افزایش می‌دهد، بنابراین با ایجاد اتمسفر تغییر یافته سرعت تنفس، رسیدن و فرآیند پیری میوه را به تعویق می‌اندازد (Xing *et al.*, 2011). نتایج گزارش شده در مورد کیتوزان بر میزان TA طی مدت انبارمانی متفاوت است. در پژوهشی گزارش شد که پوشش کیتوزان در توت‌فرنگی طی مدت انبارمانی موجب افزایش TA در مقایسه با گروه‌های شاهد شد (Perdones *et al.*, 2012). نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین TSS در شاهد در زمان ۲۸ روز به میزان ۱/۵ برابر نسبت به شاهد در زمان صفر مشاهده شد و پس از ۲۸ روز انبارمانی تیمار کیتوزان ۲ درصد نسبت به شاهد موجب کاهش TSS به میزان ۴۲/۲ درصد گردید (شکل ۲ ب). با افزایش مدت انبارمانی میزان مواد جامد محلول افزایش یافت. میزان افزایش در میوه‌های پوشش داده شده با کیتوزان در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری کمتر بود. در تایید یافته‌های این پژوهش، میزان مواد جامد محلول در میوه‌های توت‌فرنگی رقم کارماروسا پوشش داده شده با کیتوزان و کلسیم طی مدت ۷ روز انبارمانی در دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت (Hernández-Muñoz *et al.*, 2008).



این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی

شکل ۲- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بر (a) اسیدیته قابل تیتراسیون و (b) مواد جامد محلول فلفل دلمه‌ای (میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند).

شاخص رنگ

یافته‌های حاصل از نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داده شد که اثر متقابل کیتوزان بر شاخص‌های رنگ L^* ، a^* ، b^* و ΔE در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کیتوزان با غلظت یک درصد کاهش معنی‌داری را نسبت به شاهد به میزان ۳۸/۹۹ درصد نسبت به روز هفتم در شاخص رنگ a^* (قرمزی) داشت (جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که شاهد افزایش معنی‌داری در روز هفتم به ترتیب در b^* (زردی)، L^* (روشنایی) و ΔE (تغییرات رنگ) به میزان ۳۷/۷۸، ۲۵/۹۸ و ۶۴/۶۷ درصد نسبت به روز ۲۸ نشان داد (جدول ۲). تاخیر در تغییرات رنگ میوه فلفل دلمه در پژوهش Hernandez- Munoz و همکاران (۲۰۰۸) گزارش شده است. استفاده از پوشش کیتوزان بهبود قابل توجهی را در تأثیر مفید بر روی هر دو ویژگی رنگ و بافت میوه توت‌فرنگی نشان داده است. علاوه بر این، مشاهده شده است که به‌طور موثر روند پیری میوه را به تاخیر می‌اندازد، بنابراین به حفظ ظاهر خارجی و کیفیت کلی آن کمک می‌کند (Velickova et al., 2013).

جدول ۲- مقایسه میانگین اثر متقابل تیمار کیتوزان با غلظت‌های (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بر شاخص رنگ فلفل دلمه‌ای

زمان (روز)	کیتوزان (درصد)			
	۰	۰/۵	۱	۲
۷	۱۰/۷۲ ^h	-۹/۴۳ ^{fg}	-۸/۴۵ ^{de}	-۹/۸۰ ^g
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۱۴	۹/۷۰ ^g	-۸/۲۰ ^d	-۸/۳۰ ^{de}	-۹/۴۲ ^{fg}
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۲۱	-۸/۶۶ ^e	-۸/۳۲ ^{de}	-۷/۳۹ ^{bc}	-۹/۲۳ ^f
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۲۸	-۷/۶۷ ^c	-۷/۱۷ ^b	-۶/۵۴ ^a	-۷/۵۲ ^{bc}
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
ΔE	۳۵/۶۸ ^a	۳۰/۴۶ ^b	۲۸/۲۸ ^{cd}	۳۰/۳۴ ^b
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
L^*	۳۰/۸۳ ^b	۲۸/۳۰ ^{cd}	۲۶/۴۹ ^{de}	۳۰/۷۲ ^b
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۷	۳۵/۶۸ ^a	۳۰/۴۶ ^b	۲۸/۲۸ ^{cd}	۳۰/۳۴ ^b
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۱۴	۳۰/۸۳ ^b	۲۸/۳۰ ^{cd}	۲۶/۴۹ ^{de}	۳۰/۷۲ ^b
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۲۱	۳۱/۴۴ ^b	۲۹/۶۷ ^{bc}	۲۷/۱۳ ^{de}	۳۰/۶۱ ^b
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e
۲۸	۲۶/۷۰ ^{de}	۲۸/۰۶ ^{cd}	۲۶/۱۱ ^{de}	۲۸/۳۲ ^{de}
	۱۳/۳۲ ^b	۱۱/۶۵ ^d	۱۰/۳۲ ^e	۱۳/۶۱ ^b
	۱۲/۶۱ ^c	۱۰/۶۴ ^e	۱۰/۶۹ ^e	۱۳/۶۹ ^b
	۹/۴۳ ^f	۱۰/۵۳ ^e	۸/۶۴	۱۰/۵۸ ^e

میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند

کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید

برطبق نتایج تجزیه واریانس داده‌ها اثر متقابل کیتوزان و زمان بر کلروفیل a، b و کاروتنوئید فلفل دلمه‌ای در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین میزان کلروفیل a در زمان صفر با غلظت‌های (صفر، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) مشاهده گردید (شکل ۳ الف). همچنین نتایج مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیش‌ترین افزایش معنی‌دار کلروفیل b در

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

مجله فرایند و کارکرد گیاهی


فلفل دلمه‌ای با غلظت ۲ درصد در زمان صفر به میزان ۱۱۳/۳۳ درصد نسبت به شاهد شد (شکل ۳ ب). میزان کاروتنوئید فلفل دلمه‌ای در زمان ۲۸ روز در شاهد به میزان ۹۷/۱۴ درصد نسبت به زمان صفر افزایش معنی‌داری را نشان داد (شکل ۳ ج). در تحقیقی نشان داده شد که پوشش کیتوزان نسبت به شاهد باعث افزایش کلروفیل و کاهش کاروتنوئید فلفل دلمه‌ای شده است (Fenny *et al.*, 2021). فعالیت کیتوزان مشابه یک تنظیم کننده رشد در چند گیاه زینتی گزارش شده است. به طوری که افزودن کیتوزان یک درصد در مقایسه با شاهد باعث افزایش وزن تر و خشک گیاهان زینتی شده است (Ohta *et al.*, 2004). در گیاه لوبیاسبز کیتوزان سبب افزایش ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی از جمله ارتفاع، تعداد شاخه‌ها، تعداد برگ‌ها، سطح برگ، وزن خشک، محتوای کلروفیل، فتوسنتز و نیترات ردوکتاز شده است (Rabbi *et al.*, 2016). القای کیتوزان در تاثیرگذاری روی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان قهوه، چیلی، گوجه‌فرنگی، خیار، ذرت، ارکیده، سویا و برنج نیز گزارش شده است (Jianglian and Shaoying, 2013).

جدول ۳. تجزیه واریانس اثر متقابل تیمار کیتوزان با غلظت‌های (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز)


بر صفات کیفی فلفل دلمه‌ای

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات		
		کلروفیل a	کلروفیل b	کاروتنوئید
کیتوزان	۳	۱۱/۷۴**	۰/۰۱۸ ^{ns}	۴۵۵۸/۶۴**
زمان	۴	۳۰/۶۹**	۰/۲۳**	۴۳۵۸۸/۸۷**
کیتوزان × زمان	۱۲	۶/۸۶۵**	۰/۰۰۹۲**	۲۵۳۹/۰۷**
خطای آزمایش	۶۰	۱/۰۰۸	۰/۰۰۷۱	۶/۸۷
ضریب تغییرات (%)	-	۶/۸۸	۳/۱۹	۹/۷۴

ns، * و ** به ترتیب بی‌معنی، معنی‌دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد




این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.



شکل ۳- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بر (a) کلروفیل a و (b) کلروفیل b (c) فلفل دلمه‌ای (میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند). نشأت یونی

برطبق نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر متقابل کیتوزان و زمان بر نشأت یونی فلفل دلمه‌ای ۵ درصد معنی‌دار شد (جدول ۳). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کیتوزان با غلظت ۰/۵، ۱ و ۲ در زمان ۲۸ روز سبب کاهش نشأت یونی به ترتیب به میزان ۸/۵۶ و ۹ و ۹/۵۷ نسبت به شاهد در زمان ۲۸ روز شد (شکل ۴). برخی از محققان نشان دادند کیتوزان به‌عنوان یک پوشش خوراکی با القای فعالیت آنزیم‌های مرتبط با کاهش میزان تنش در طول دوره انبارمانی باعث کاهش نشأت یونی میوه‌ها می‌شوند (Liu et al., 2007; Xing et al., 2011). بطور مشابه، Xing و همکاران (۲۰۱۱) دریافتند استفاده از تیمارهای پوششی در طول دوره انبارمانی با کاهش تنش منجر به کاهش نشأت یونی و حفظ بیشتر آنزیم کاتالاز و سایر ترکیبات آنتی‌اکسیدانی از جمله ویتامین ث، فنل کل در نتیجه افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی نسبت به شاهد می‌گردد (Xing et al., 2011). همچنین کاهش نشأت یونی در میوه‌های فلفل دلمه‌ای توسط پوشش خوراکی کیتوزان گزارش شده است (محمدی و همکاران، ۱۳۹۵).



شکل ۴- مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد) در زمان‌های متفاوت (۰، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز) بر نشت یونی فلفل دلمه‌ای (میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند).

نتیجه‌گیری کلی

میوه فلفل دلمه‌ای ارزش غذایی بالایی دارد و سرشار از انواع مواد معدنی و متابولیت‌های متنوع است. مصرف این میوه در رژیم غذایی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. ولی به دلیل کاهش سریع آب محصول دارای عمر پس از برداشت کوتاهی است. نتایج نشان داد که تیمار کیتوزان سبب افزایش کلروفیل a، b و کاروتنوئید و کاهش نشت یونی شده است. در این آزمایش استفاده از پوشش خوراکی کیتوزان با غلظت ۲ درصد به طور موثری کاهش کیفیت میوه‌ها را به خوبی حفظ نمود. بنابراین استفاده تجاری از این ترکیب می‌تواند عمر انبارمانی و بهره‌وری اقتصادی میوه فلفل دلمه‌ای را افزایش دهد.

منابع

- محمدی، میثم، خادمی؛ اورنگ، صیدی، مهدی، و بازگیر، مسعود (۱۳۹۵). حفظ کیفیت پس از برداشت و کنترل پوسیدگی فارچ فلفل دلمه‌ای (*Capsicum annum* L.) توسط پوشش خوراکی کیتوزان. *مجله فرایند و کارکرد گیاهی*، ۱۶، ۲۷-۱. DOR: 20.1001.1.23222727.1395.5.16.10.5
- Ali, A., Muhammad, M. T. M., Sijam, K. & Siddiqui, Y. (2011). Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (*Carica papaya* L.) fruit during cold storage. *Food chemistry*, 124, 620-626. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.085>.
- Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts polyphenol oxidase Beta Vulgaris. *Plant Physiology*, 24, 1-15. <https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1>.
- Bhowmick, N., Ghosh, A., Dutta, P. & Dey, K. (2015). Efficacy of edible coatings on the shelf life of ber (*Zizyphus mauritiana* Lamk.) fruits at ambient condition. *International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology*, 8, 601-608. <https://doi.org/10.5958/2230-732X.2015.00066.2>.
- Camatari, F. O. D. S., Santana, L. C. L. D. A., Carnellosi, M. A. G., Alexandre, A. P. S., Nunes, M. L., Goulatt, M. O. F., Narain, N. & Silva, M. A. A. P. D. (2017). Impact of edible coatings based on cassava starch and chitosan on the post-harvest shelf life of mango (*Mangifera indica*) 'Tommy Atkins' fruits. *Food Science and Technology*, 38, 86-95. <https://doi.org/10.1590/1678-457X.16417>.
- Casariago, A., Souza, B. W. S., Vicente, A. A., Teixeira, J. A., Cruz, L. & Díaz, R. (2008). Chitosan coating surface properties as affected by plasticizer, surfactant and polymer concentrations in relation to the surface properties of tomato and carrot. *Food Hydrocolloids*, 22, 1452-1459. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2007.09.010>.
- Dutta, P., Dey, K., Ghosh, A., Bhowmick, N. & Ghosh, A. (2016). Effect of edible coatings for enhancing shelf-life and quality in Ber (*Zizyphus mauritiana* Lamk.) fruits. *Journal of Applied and Natural Science*, 8, 1421-1426. <https://doi.org/10.31018/jans.v8i3.976>.

این مقاله نهایی نیست و پس از انتشار تغییراتی خواهد داشت.

- Fenny, M. D., Karlia, M., Kuswati, K., Rizkita, R. E. & Husn, N. (2021). Chitosan improving growth in chili (*Capsicum annuum* L.) plants and acting through distinct gene regulation between cultivars. *Research Journal of Biotechnology*, 16(2), 87-92. <https://www.researchgate.net/publication/349117597>.
- Flórez-Martínez, D. H., Contreras-Pedraza, C. A. & Rodríguez, J. (2020). A systematic analysis of non-centrifugal sugar cane processing: Research and new trends. *Trends in Food Science & Technology*, 107, 415-428. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.11.011>.
- Dhakad, A., Sonkar, P., Bepari, A. & Kumar, U. (2020). Effect of pre-harvest application of plant growth regulators and calcium salts on biochemical and shelf life of acid lime (*Citrus aurantifolia* Swingle). *Journal Pharmacognosy and Phytochemistry*, 9, 1983-1985. <https://doi.org/10.22271/phyto>.
- Hernández-Muñoz, P., Almenar, E., Ocio, M. J. & Gavara, R. (2006). Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (*Fragaria x ananassa*). *Postharvest Biology and Technology*, 39, 247-253. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2005.11.006>.
- Jianglian, D. & Shaoying, Z. (2013). Application of chitosan-based coating in fruit and vegetable preservation: a review. *Journal of Food Process Technology*, 4(5), 227-231. <https://doi.org/10.4172/2157-7110.1000227>.
- Kehila, Sh., Alkalai-Tuvia, Sh., Chalupowicz, D., Poverenov, E. & Fallik, E. (2021). Can Edible Coatings Maintain Sweet Pepper Quality after Prolonged Storage at Sub-Optimal Temperatures? *Horticulturae*, 7(10), 387-397. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7100387>.
- Kou, X., He, Y., Li, Y., Chen, X., Feng, Y. & Xue, Z. (2019). Effect of abscisic acid (ABA) and chitosan/nano-silica/sodium alginate composite film on the color development and quality of postharvest Chinese winter jujube (*Zizyphus jujuba* Mill. cv. Dongzao). *Food chemistry*, 270, 385-394. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.06.151>.
- Lara, I., García, P. & Vendrell, M. (2006). Post-harvest heat treatments modify cell wall composition of strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch.) fruit. *Scientia Horticulture*, 109, 48-53. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2006.03.001>.
- Liu, J., Tian, S., Meng, X. & Xu, Y. (2007). Effects of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit. *Postharvest Biology and Technology*, 44, 300-306. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2006.12.019>.
- Lwin, H.P., Lee, J. & Lee, J. (2022). Perforated modified atmosphere packaging differentially affects the fruit quality attributes and targeted major metabolites in bell pepper cultivars stored at ambient temperature. *Scientia Horticulturae*, 301, p.111-131. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111131>.
- Marín Fernández, A., Ferreres, F., Tomás Barberán, F. & Gil Muñoz, M. (2004). Characterization and Quantitation of Antioxidant Constituents of Sweet Pepper (*Capsicum annuum* L.). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 52(12), 3861-3869. <http://dx.doi.org/10.1021/jf0497915>.
- Meighani, H., Ghasemnezhad, M. & Bakhshi, D. (2015). Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (*Punica granatum* L.) fruits. *Journal of Food Science and Technology*, 52, 4507-4514. <https://doi.org/10.1007/s13197-014-1484-6>.
- Ohta, K., Morishita, S., Suda, K., Kobayashi, N. & Hosoki, T. (2004). Effects of chitosan soil mixture treatment in the seedling stage on the growth and flowering of several ornamental plants. *Journal of the Japanese Society for Horticultural Science*, 73(1), 66-68. <https://doi.org/10.2503/jjshs.73.66>.
- Park, H. J. (1999). Development of advanced edible coatings for fruits. *Trends in Food Science & Technology*, 10, 254-260. [https://doi.org/10.1016/S0924-2244\(00\)00003-0](https://doi.org/10.1016/S0924-2244(00)00003-0).
- Perdones, A., Sánchez-González, L., Chiralt, A. & Vargas, M. (2012). Effect of chitosan–lemon essential oil coatings on storage-keeping quality of strawberry. *Postharvest Biology and Technology*, 70, 32-41. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2012.04.002>.
- Rabbi, S. F., Rahman, M., Mondal, M. M. A., Bhowal, S. K. & Haque, A. (2016). Effect of chitosan application on plant characters, yield attributes and yield of mungbean. *Research Journal of Agriculture Environmental Management*, 5, 95-100. <https://www.researchgate.net/publication/318645904>.
- Sabir, F. K., Sabir, A., Unal, S., Taytak, M., Kucukbasmaci, A. & Bilgin, O.F. (2019). Postharvest quality extension of minimally processed table grapes by chitosan coating. *International Journal of Fruit Science*, 19, 347-358. <https://doi.org/10.1080/15538362.2018.1506961>.
- Sakaldas, M., Gundogdu, M.A. & Gur, E. (2016). The effects of preharvest 1-methylcyclopropene (Harvista) treatments on harvest maturity of 'Santa Maria' pear cultivar. In *III International Symposium on Horticulture in Europe-SHE*, 1242, 287-294. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1242.40>.

- Salvia-Trujillo, L., Rojas-Graü, M. A., Soliva-Fortuny, R. and Martín-Belloso, O. (2015). Use of antimicrobial nanoemulsions as edible coatings: Impact on safety and quality attributes of fresh-cut Fuji apples. *Postharvest Biology and Technology*, 105, 8-16. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.03.009>.
- Sharma, P., Kehinde, B. A., Kaur, S. & Vyas, P. (2019). Application of edible coatings on fresh and minimally processed fruits: A review. *Nutrition Food Science*, 49, 713–738. <https://doi.org/10.1108/NFS-08-2018-0246>.
- Sharma, S., Krishna, H., Barman, K., Kole, B., Singh, S.K. & Behera, T.K. (2022). Synergistic effect of polyamine treatment and chitosan coating on postharvest senescence and enzyme activity of bell pepper (*Capsicum annuum L.*) fruit. *South African Journal of Botany*, 151, 175-184. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13170>.
- Tiamiyu, Q.O., Adebayo, S.E. & Ibrahim, N. (2023). Recent advances on postharvest technologies of bell pepper: A review. *Heliyon*. 9(4), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15302>.
- Treviño-Garza, M.Z., García, S., del Socorro Flores-González, M. & Arévalo-Niño, K. (2015). Edible active coatings based on pectin, pullulan, and chitosan increase quality and shelf life of strawberries (*Fragaria ananassa*). *Journal of food science*, 8, M1823-M1830. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.12938>.
- Tsegay, D., Tesfaye, B., Mohammed, A., Yirga, H. & Bayleyegn, A. (2013). Effects of harvesting stage and storage duration on postharvest quality and shelf life of sweet bell pepper (*Capsicum annuum L.*) varieties under passive refrigeration system. *International Journal for Biotechnology and Molecular Biology Research*, 4, 98-104. <https://doi.org/10.5897/IJBMBR2013.0154>.
- Velickova, E., Winkelhausen, E., Kuzmanova, S., Alves, V.D. & Moldão-Martins, M. (2013). Impact of chitosan-beeswax edible coatings on the quality of fresh strawberries (*Fragaria ananassa cv Camarosa*) under commercial storage conditions. *LWT-Food Science and Technology*, 52, 80-92. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.02.004>.
- Wahyuni, Y., Ballester, A. R., Sudarmonowati, E., Bino, R. J. & Bovy, A.G. (2013). Secondary metabolites of *Capsicum* species and their importance in the human diet. *Journal of Natural Products*, 76, 783–793. <https://doi.org/10.1021/np300898z>.
- Xing, Y., Li, X., Xu, Q., Yun, J., Lu, Y. & Tang, Y. (2011). Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (*Capsicum annuum L.*). *Food Chemistry*, 124, 1443-1450. <https://doi.org/10.1155/2015/835151>.



The Effect of Chitosan Coating on the Storage of Bell Pepper (*Capsicum annum* L.)

Emadifar¹, R., Sharifi^{2*}, G.R., Mirzaalian-Dastjerdi³, A.M.

1 M.SC. student, Department of Horticultural Science, College of Agriculture, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran.

r.emadifar65@gmail.com

2- Professor, Department of Agricultural Biotechnology, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

sharifi@uk.ac.ir sharifisirchi@yahoo.com

3- Associate Professor, Department of Horticultural Science, College of Agriculture, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran.

dastgerdy1352@yahoo.com

Abstract

One of the limitations of keeping, marketing, and exporting capsicum (*Capsicum annum* L.) is its rapid ripening after harvesting and microbial spoilage, which reduces the quality properties and spoilage of this product. These challenges have been effectively mitigated by using post-harvest techniques. Edible coating treatments can be used after harvesting different fruits. The purpose of this experiment is to use chitosan at four levels (zero, 0.5, 1, and 2%) over time (zero, 7, 14, 21, and 28 days) with four repetitions on the quality after harvesting bell peppers. The variety of California Wonder is a factorial experiment in the form of a completely randomized design. The results showed that a 2% concentration of chitosan prevented weight loss in 28 days. At the end of the experiment, a 2% chitosan treatment compared to the control caused a decrease in TSS by 42.2%. The highest amount of chlorophyll a was observed in the chitosan treatment compared to the control in 28 days. The most significant increase in chlorophyll b in sweet pepper, with a concentration of 2% at zero time, was 113.33% compared to the control. The carotenoid content of sweet pepper showed a significant increase of 97.14% compared to time 0 in the control at the time of 28 days. The results of the average comparison showed that chitosan with a concentration of 0.5, 1, and 2, respectively, in 28 days caused a decrease in ion leakage by 8.56, 9, and 9.57, respectively, compared to the control in 28 days. The results showed that different concentrations of Chitosan and especially the concentration of 2% compared to the control, maintained the quality after harvesting and delayed the aging of bell pepper fruit. According to the results of this research, it is recommended to use this edible coating as an application to increase the shelf life of bell peppers.

Keywords: Weight loss, Chlorophyll, Quality, Ion Leakage